



TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

**TRABZON İLİ ERİŞKİN YAŞ GRUPLARINDA  
ANTİ NÜKLEER ANTİKOR  
SEROPREVALANSININ BELİRLENMESİ**

Dr. Altan AKINEDEN

UZMANLIK TEZİ

Doç. Dr. Neşe KAKLIKKAYA

TRABZON-2012



TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

**TRABZON İLİ ERİŞKİN YAŞ GRUPLARINDA  
ANTİ NÜKLEER ANTİKOR  
SEROPREVALANSININ BELİRLENMESİ**

Dr. Altan AKINEDEN

UZMANLIK TEZİ

Doç. Dr. Neşe KAKLIKKAYA

TRABZON-2012

## TEŞEKKÜR

Uzmanlık eğitimim ve tez çalışmam süresince bilgi ve deneyimlerinden faydalandığım tez danışmanım Doç. Dr. Neşe KAKLIKKAYA'ya, bölüm başkanımız Prof. Dr. Faruk AYDIN'a, bölüm hocalarım Prof. Dr. Murat ERTÜRK'e, Doç. Dr. İlknur TOSUN, Doç. Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU'na, Yrd. Doç. Dr. C. Kurtuluş BURUK'a emekleri ve özverileri için teşekkür ederim.

Tez çalışmamdaki yardım ve katkılarından dolayı KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze ÇAN ve Arş. Gör. Bekir BULUT'a teşekkür ederim.

Tez çalışmamı 2010.114.0001.13 nolu proje ile destekleyen KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'ne teşekkür ederim.

Anabilim dalımızda yüksek lisans, doktora, uzmanlık eğitimi alan arkadaşlarıma Tıbbi Mikrobiyoloji Rutin Laboratuvarı çalışanlarına ve yardımlarından dolayı Halime AKTAŞ'a teşekkür ederim.

Tez çalışmalarım boyunca tüm bilgi ve birikimlerini benimle paylaşan canım ağabeyim Dr. Ömer AKINEDEN'e teşekkür ederim.

Desteğini, sevgisini sürekli hissettiğim, hayatımın vazgeçilmez parçaları olan değerli annem Gülay AKINEDEN, bitanecik eşim Asuman'a, yaşam kaynağım canım kızım Ceren'e ve sevgili ağabeyim Mustafa AKINEDEN'e teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

Onurlu, dürüst ve mertçe nasıl yaşanabileceğini öğrendiğim ve bu dünyada kendisine doyamadığım canım ağabeyim Selçuk AKINEDEN'i rahmetle anıyorum ve üzerimdeki emeklerinden dolayı minnetlerimi sunuyorum.

Dr. Altan AKINEDEN

---

## İÇİNDEKİLER

Sayfa

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>İÇİNDEKİLER</b> .....                                            | I   |
| <b>TABLolar DİZİNİ</b> .....                                        | IV  |
| <b>ŞEKİLLER ve RESİMLER DİZİNİ</b> .....                            | VI  |
| <b>KISALTMALAR SİMGELER ve FORMÜLLER DİZİNİ</b> .....               | VII |
| <b>1. ÖZET</b> .....                                                | 1   |
| <b>2. SUMMARY</b> .....                                             | 3   |
| <b>3. GİRİŞ ve AMAÇ</b> .....                                       | 5   |
| <b>4. GENEL BİLGİLER</b> .....                                      | 6   |
| 4.1 Otoimmünite .....                                               | 6   |
| 4.1.1 Otoimmün hastalıklar ve epidemiyolojisi .....                 | 6   |
| 4.1.2 Otoimmün hastalıkların oluş mekanizmaları .....               | 7   |
| 4.1.2.1 T hücre toleransı .....                                     | 8   |
| 4.1.2.1.1 Self antijenlere tolerans ve anerji .....                 | 9   |
| 4.1.2.1.2 T hücre olgunlaşma faktörleri .....                       | 10  |
| 4.1.2.1.3 Sitotoksik T lenfosit ile ilişkili antijen (CTLA-4) ..... | 10  |
| 4.1.2.2 B hücre toleransı .....                                     | 11  |
| 4.1.2.2.1 B hücresinin merkezi toleransı .....                      | 12  |
| 4.1.2.2.2 B hücresinin periferik toleransı .....                    | 12  |
| 4.1.2.3. Genetik yatkınlık .....                                    | 13  |
| 4.1.2.4 Diğer faktörler .....                                       | 14  |

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2 Anti nükleer antikor .....                                                                  | 16        |
| 4.2.1 Anti nükleer antikorların en önemli alt tipleri .....                                     | 17        |
| 4.2.1.1 DNA ve histon proteinlerine karşı gelişen ANA'lar .....                                 | 17        |
| 4.2.1.2 Diğer nükleer antijenlere karşı oluşan ANA'lar .....                                    | 18        |
| 4.3 Anti nükleer antikorların laboratuvar tanısı .....                                          | 19        |
| 4.3.1 Anti nükleer antikorun immünfloresan (IF) yöntem ile tespiti .....                        | 19        |
| 4.3.1.1 İmmünfloresan boyanma paternleri .....                                                  | 20        |
| 4.3.1.2 Kullanılan substratlar .....                                                            | 22        |
| 4.3.1.3 Anti nükleer antikor titresi .....                                                      | 22        |
| 4.3.2 Enzim Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemi ile ANA tanısı .....                     | 23        |
| 4.4 Ekstrakte edilebilir nükleer antijenlere karşı gelişen antikorların tespit yöntemleri ..... | 23        |
| 4.4.1 Western (immüno) blot testi .....                                                         | 23        |
| <b>5. GEREÇ VE YÖNTEM .....</b>                                                                 | <b>25</b> |
| 5.1 Gereç .....                                                                                 | 25        |
| 5.1.1 Örneklem büyüklüğünün hesaplaması .....                                                   | 25        |
| 5.1.2 Örneklem seçimi .....                                                                     | 25        |
| 5.1.3 Verilerin toplanması .....                                                                | 25        |
| 5.1.4 Kan örneği alınması .....                                                                 | 26        |
| 5.2 Yöntem .....                                                                                | 26        |
| 5.2.1 ANA varlığının tespiti .....                                                              | 26        |
| 5.2.2 Anti-ENA antikorları varlığının tespiti .....                                             | 28        |
| 5.2.3 İstatistiksel yöntem .....                                                                | 30        |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. BULGULAR .....</b>                                        | <b>31</b> |
| 6.1 ANA seropozitiflikleri ve dağılımları.....                  | 31        |
| 6.2 Anti-ENA antikorları ve görülen bantların dağılımları ..... | 40        |
| <b>7. TARTIŞMA ve SONUÇ .....</b>                               | <b>43</b> |
| <b>8. KAYNAKLAR .....</b>                                       | <b>48</b> |

**TABLOLAR DİZİNİ**

|                                                                                                            | Sayfa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Tablo 1.</b> Otoimmün hastalıkların sınıflandırılması .....                                             | 7     |
| <b>Tablo 2.</b> HLA gen allelleri ve ilişkili olduğu otoimmün hastalıklar .....                            | 14    |
| <b>Tablo 3.</b> Anti nükleer antikorlar ve görüldüğü hastalıklar .....                                     | 18    |
| <b>Tablo 4.</b> Anti nükleer antikorlar ve kollejen doku hastalıkları arasındaki ilişki .....              | 19    |
| <b>Tablo 5.</b> IF yöntemiyle anti nükleer antikor boyanma paternleri ve ilişkili olduğu hastalıklar ..... | 21    |
| <b>Tablo 6.</b> ANA boyanma paternleri ve Hep-2 hücreleri üzerindeki boyanma bölgeleri .                   | 22    |
| <b>Tablo 7.</b> ANA IF test kit içeriği .....                                                              | 27    |
| <b>Tablo 8.</b> ENA profile Plus1 (IgG) kit içeriği ve içerdiği antijen veya miktarı .....                 | 29    |
| <b>Tablo 9.</b> Toplanan serum örneklerinin yerleşim yerleri ve cinsiyete göre dağılımları ..              | 31    |
| <b>Tablo 10.</b> ANA pozitif örneklerin IF boyanma paternlerine göre dağılımları .....                     | 34    |
| <b>Tablo 11.</b> ANA pozitifliğinin yerleşim yerlerine göre dağılımı. ....                                 | 35    |
| <b>Tablo 12.</b> ANA pozitif örneklerin merkez ve ilçeler arasındaki dağılımı.....                         | 35    |
| <b>Tablo 13.</b> ANA pozitifliklerinin cinsiyetlere göre dağılımı. ....                                    | 36    |
| <b>Tablo 14.</b> ANA pozitifliğinin yaş gruplarına göre dağılımları .....                                  | 37    |
| <b>Tablo 15.</b> ANA pozitifliğinin sigara kullanımına göre dağılımı .....                                 | 37    |
| <b>Tablo 16.</b> Gelir durumu ve ANA pozitifliği dağılımı .....                                            | 38    |
| <b>Tablo 17.</b> Medeni duruma göre ANA pozitifliği dağılımları .....                                      | 38    |
| <b>Tablo 18.</b> Eğitim durumuna göre ANA pozitiflik dağılımları .....                                     | 39    |
| <b>Tablo 19.</b> Beden kitle indeksine göre ANA pozitifliğinin dağılımları.....                            | 39    |

**Tablo 20.** Anti-ENA antikorlarının ANA pozitiflik derecelerine göre dağılımları ..... 41

**Tablo 21.** ENA antijenleri ve prevalansı..... 42



## ŞEKİLLER ve RESİMLER DİZİNİ

Sayfa

### ŞEKİLLER DİZİNİ

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Şekil 1. T hücresi merkezi ve periferik tolerans mekanizmaları ..... | 9  |
| Şekil 2. CTLA-4 molekülü ve etkileri .....                           | 11 |
| Şekil 3. B hücre merkezi toleransı .....                             | 12 |
| Şekil 4. B hücre periferik toleransı .....                           | 13 |
| Şekil 5. Enfeksiyon ajanlarının otoimmünite ile ilişkisi .....       | 15 |

### RESİMLER DİZİNİ

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Resim 1. Western (immüno) blot test stripleri ..... | 24 |
| Resim 2. Benekli boyanma paterni.....               | 32 |
| Resim 3. Sitoplazmik boyanma paterni.....           | 32 |
| Resim 4. Nükleoler boyanma paterni .....            | 33 |

## KISALTMALAR SİMGELER VE FORMÜLLER DİZİNİ

### Kısaltmalar

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ANA    | Anti nükleer antikor                                           |
| SLE    | Sistemik lupus eritematozus                                    |
| HLA    | Human lenfosit antijen                                         |
| MHC    | Major doku uygunluk kompleksi                                  |
| ASH    | Antijen sunan hücreler                                         |
| IL-2   | İnterlökin 2                                                   |
| Th-1   | T helper 1                                                     |
| CTLA-4 | Sitotoksik T lenfosit ile ilişkili antijen                     |
| AIRE   | Otoimmün düzenleyici gen                                       |
| Treg   | Regülatör T hücreleri                                          |
| CREST  | Kalsinozis-Raynaud fenomeni özefagial dismotilite telenjektazi |
| PM-DM  | Polimiyozit dermatomiyozit                                     |
| ss-DNA | Tek zincirli deoksiribonükleik asit                            |
| ds-DNA | Çift zincirli deoksiribonükleik asit                           |
| ENA    | Ekstrakte edilebilir nükleer antijenler                        |
| RNP    | Ribonükleoprotein                                              |
| Sm     | Smith                                                          |
| IF     | İndirek immünfloresan                                          |
| ELISA  | Enzim linked immunosorbent assay                               |
| BKİ    | Beden kitle indeksi                                            |
| MCTD   | Karışık bağ dokusu hastalığı                                   |

## 1. ÖZET

### **Trabzon İli Erişkin Yaş Gruplarında Anti Nükleer Antikor Seroprevalansının Belirlenmesi**

Anti nükleer antikor (ANA) deoksiribonükleik asit (DNA), histon komplekslerine ya da nükleer ve sitoplazmik ribonükleer proteinlere karşı gelişen otoantikorlara verilen genel isimdir. Serumda ANA varlığının belirlenmesi birçok sistemik otoimmün hastalığın tanısının konulmasında, hastalıkların evrelendirilmesinde ve prognozunun belirlenmesinde en önemli laboratuvar bulgusudur. Görülme sıklığı değişken olmakla birlikte, farklı toplumlarda ANA seroprevalansı %5–15 arasında bildirilmiştir. Toplumdaki ANA seroprevalansının araştırılması o toplumda bulunan otoimmün hastalıkların belirlenmesinin yanı sıra, hastalık öncesi subklinik durumların ortaya çıkarılmasında, erken tedavi ve izlemde, ayrıca bu hastalıklar için risk faktörlerinin belirlenmesinde önemlidir.

Çalışmamızda Trabzon’da yaşayan erişkin yaş grubunda ANA seroprevalansının belirlenmesi ve bu otoantikorların varlığı ile bireylerin sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Çalışmaya Trabzon ili ve dokuz ilçesinde yaşayan, 20 yaş ve üzeri bireylerden elde edilen toplam 884 serum örneği dahil edilmiştir. Örneklerde ANA belirlenmesi amacıyla Antibodies against cell nuclei (IgG) (Euroimmun, Lübeck, Almanya) kitleri kullanılmıştır. İndirekt immünflouresan (IF) yöntemi ile 1:80 ve üzerindeki dilüsyonlardaki ANA pozitiflikleri ve boyanma paternleri belirlenmiştir. Benekli boyanma paterni gösteren 53 örnekte ekstrakte edilebilir nükleer antijen (anti-ENA) antikorları varlığı Anti-ENA profile Plus1 (IgG) (Euroimmun, Lübeck, Almanya) kitleri kullanılarak araştırılmıştır. Elde edilen veriler ki kare testi ile karşılaştırılmıştır.

Çalışmaya alınan 884 bireyin 132’sinde (%14.93) 1:80 ve üzerindeki dilüsyonlarda ANA pozitifliği belirlenmiştir. En sık görülen boyanma paterni 53 örnekte (%6.00) belirlenen benekli boyanma paternidir. ANA pozitifliği ile yerleşim yeri, cinsiyet, sigara kullanımı, gelir düzeyi, medeni durum, eğitim düzeyi beden kitle indeksi ve yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (sırasıyla p=0,987, p=0,312, p=0,054, p=0,887, p=0,826, p=0,787, p=1,000, p=0,980).

Bu bulgular Trabzon ilinde ANA seroprevalansının oldukça yüksek düzeylerde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle özellikle klinik bulguları olan bireylerde ANA tarama testlerinin yapılması gerektiği düşünülmüştür.

**Anahtar kelimeler;** Anti nükleer antikor, Trabzon, seroprevalans.

## 2. SUMMARY

### **Determination of antinuclear antibody seroprevalence in adult age groups of Trabzon province**

Anti-nuclear antibody (ANA) is the common name of autoantibodies directed against deoxyribonucleic acid (DNA), histone complexes or nuclear and cytoplasmic ribonuclear proteins. Determination of the ANA in blood serum is the most significant laboratory findings in diagnostic, staging and prognosis of several systemic autoimmune diseases. Whereat the frequency is varying, ANA seroprevalence has been reported between 5 to 15 % in different populations around the world. Analysis of ANA seroprevalence in a population may not only help to determine autoimmune diseases emerging in the population but also paves the way for premorbid subclinical situations, early clinical treatment and observation possibilities, besides it is important to specify risk factors for this kind of diseases.

The aim of the study was to determinate the ANA seroprevalence within the adults living in Trabzon and to relate the presence of the autoantibodies and sociodemographic features of the individuals possessing them.

This study included 884 sera samples drawn by individuals 20 years old or older who live in Trabzon province and nine different districts of the province. In order to determine ANA in samples, antibodies against cell nuclei (IgG) (Euroimmun, Lübeck, Germany) kits were used. By means of Indirect Immunofluorescence (IF) method, ANA positivity and fluorescence patterns in dilutions 1/80 and higher were detected. In 53 samples showing speckled pattern, antibodies of extractable nuclear antigen (anti-ENA) were detected by using Anti-ENA profile Plus1 (IgG) (Euroimmun, Lübeck, Germany) kits. Obtained data were compared by chi square test.

In this study, 132 (%14,93) out of 884 participated individuals were ANA positive, detected in 1:80 and higher dilutions. Most frequently fluorescence pattern was the speckled pattern which has been detected in 53 samples (%6,00). No statistically significant relation between ANA positivity and residential area, gender, smoking, level of income, marital status, education level, body-mass index and age was

determined ( $p=0,987$ ,  $p=0.312$ ,  $p=0,054$ ,  $p=0,766$ ,  $p=0,887$ ,  $p=0,826$ ,  $p=0,787$ ,  $p=1,000$ ,  $p=980$ , respectively).

These findings showed that the level of ANA seroprevalence in Trabzon province is quite high. Therefore to conclude that, ANA screening tests should be performed on especially individuals with clinical outcomes.

**Keywords:** Antinuclear antibody, Trabzon, seroprevelance.

### 3. GİRİŞ ve AMAÇ

Otoimmün hastalıklar; B ve T hücrelerinin seleksiyonunda, regülasyonunda veya apoptozis aşamalarının herhangi birinde oluşan bozukluk sonucunda bireyin kendi öz antijenlerine karşı oluşturduğu immünolojik cevaptır. Otoimmünitinin en önemli laboratuvar bulgusu serumda otoantikörlerin tespit edilmesidir (1).

Anti nükleer antikör (ANA) deoksiribonükleik asit (DNA) histon kompleksine, nükleer ya da sitoplazmik ribonükleer proteinlere (RNP) karşı gelişmiş otoantikörlere verilen genel isimdir. Serumda ANA varlığının belirlenmesi sistemik lupus eritematozus (SLE), romatoid artrit (RA), sjögren sendromu, skleroderma, sistemik skleroz, kalsinozis-Raynaud fenomeni-özefagial dismotilite-telenjektazi (CREST) sendromu, polimiyozit-dermatomiyozit (PM-DM) ve karışık bağ doku hastalığı (MCTD) gibi birçok sistemik otoimmün hastalığın tanısının konulmasında, hastalıkların evrelendirilmesinde ve prognozunun belirlenmesinde önemlidir (2-4).

Anti nükleer antikör seroprevalansı ülkeler ve aynı ülke içindeki bölgeler arasında farklılıklar gösterebilmektedir. Toplumdaki ANA seroprevalansının araştırılması o toplumda bulunan otoimmün hastalıkların belirlenmesinin yanı sıra, hastalık öncesi subklinik durumların ortaya çıkarılmasında, erken tedavi ve izlemede, ayrıca bu hastalıklar için risk faktörlerinin belirlenmesinde önemlidir. Görülme sıklığı değişken olmakla beraber farklı toplumlarda ANA seroprevalansı %5-15 arasında bildirilmiştir (2).

Ülkemizde ANA seroprevalansın belirlenmesine yönelik olarak yapılmış çalışmalar oldukça az sayıdadır. ANA pozitifliği ile bireylerin sosyodemografik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığı konusunda da yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmamızda Trabzon'da yaşayan erişkin yaş grubunda ANA seroprevalansının belirlenmesi ve bu otoantikörlerin varlığı ile bireylerin yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, sigara kullanımı, guatr hastalığı varlığı, gelir düzeyi, medeni durum, eğitim düzeyi beden kitle indeksi gibi özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

## 4. GENEL BİLGİLER

### 4.1 Otoimmünite

Vücudumuzdaki immüniteye ait hücrelerin kendi öz antijenlerine yönelik verdiği immün yanıtların tümüne birden otoimmünite denir. Oluşan bütün otoimmün yanıtlar her zaman klinik semptomlarla seyreden otoimmün hastalıklara dönüşmeyebilir. Örneğin; özellikle yaşlı insanlarda hiç bir otoimmün hastalık belirtisi olmadan anti nükleer antikorlar (ANA) tespit edilebilmektedir. Eğer oluşan otoimmünite klinik olarak gözlenen semptomlarla seyreden hastalık haline dönüşmüş ise otoimmün hastalık meydana gelmiş demektir (5). Otoimmün hastalıkların oluşması için oluşan otoantikorların çeşitli semptomlarla seyreden ve klinik olarak gözlenebilen tablolara yol açması gerekmektedir (6).

#### 4.1.1 Otoimmün hastalıklar ve epidemiyolojisi

Otoimmün hastalıkların sınıflandırmasında çeşitli sistemler kullanılmaktadır. En yaygın kullanılan sınıflandırma biçimlerinden birisi sistemik tutulumlu otoimmün hastalıklar ve organ tutulumlu otoimmün hastalıklar biçiminde olanıdır (1, 7). Bu hastalıklar Tablo 1’de özetlenmiştir (2).

Otoimmün hastalıklar; B ve T hücrelerinin seleksiyonunda, regülasyonunda veya apoptozis aşamalarının herhangi birinde oluşan bozukluk veya bozukluklar sonucunda kendi öz antijenlerine karşı oluşturduğu immünolojik cevabın değişikliğe uğramasıyla oluşan klinik durumları ifade etmektedir (1, 7). Otoimmün hastalıklar, otoimmün tiroidit ve romatoid artrit haricinde, oldukça nadir görülen hastalıklardır. Amerika ve Avrupalı ülkelerde halkın yüzde 5’ine yakın bir bölümünde otoimmün hastalıkların görülebildiği belirtilmiştir (1, 8, 9). Ayrıca Amerika’da her 5 yılda tahmini olarak 1,186,015 yeni otoimmün hastalık görüleceği öngörülmektedir (8).



**Tablo 1.** Otoimmün hastalıkların sınıflandırılması (2)

| <b>ORGAN SPESİFİK<br/>HASTALIKLAR</b> | <b>SİSTEMİK<br/>HASTALIKLAR</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Graves hastalığı                      | Sistemik lupus eritematozus     |
| Hasimoto tiroiditi                    | Romatoid artrit                 |
| Otoimmün poliglandüler sendrom        | Sistemik nekrotizan vaskülit    |
| Tip 1 diabetes mellitus               | Wegener granülomatozusu         |
| Otoimmün adisyon hastalığı            | Antifosfolipid antikor sendromu |
| Pemfigus vulgaris                     | Sjögren sendromu                |
| Dermatitis herpetiformis              |                                 |
| Otoimmün alopesi                      |                                 |
| Vitiligo                              |                                 |
| Multipl skleroz                       |                                 |

#### 4.1.2 Otoimmün hastalıkların oluş mekanizmaları

Otoimmün hastalıkların oluşmasına nelerin sebep olduğu ve hangi mekanizmaların rol aldığı tam olarak aydınlatılabilmemiş değildir, ancak tüm bu oluş mekanizmalarını açıklamak için bir dizi tartışma konusu güncel olarak devam etmektedir (6).


Otoimmün hastalığın oluşmasında ilk basamaklardan birisi vücudun kendi öz antijenlerine karşı gösterdiği immün toleransın kaybolmasıdır. İmmün toleransın kaybolmasına ve otoimmünitenin oluşmasına sebep olan en önemli etkenler, geçirilmiş enfeksiyonlar gibi çevresel etmenler ve immün toleransı olumsuz yönde etkileyen kalıtsal durumlar olarak sıralanabilir (1).

Otoimmün hastalıklarda ortaya çıkan immünolojik aksaklıkların hangi yolları kullanarak otoimmün hastalıklara yol açtığı konusunda giderek artan bilgilere rağmen henüz hiçbir otoimmün hastalığın nedeni tam olarak açıklanamamıştır. Bunun nedeni otoimmün hastalıkların heterojen olması ve birçok etmene bağlı olarak gelişmesidir (10).

#### 4.1.2.1 T hücre toleransı

T hücre toleransı temel olarak organizmanın kendi öz antijenlerine yönelik oto-reaktif ve olgunlaşmamış T hücre kopyalarının kemik iliğinden timusa göçüp, burada büyük çoğunlukla elimine edilmeleri ile meydana gelir (1, 7). Timusta henüz olgunlaşmamış T hücreleri eğer vücudun öz antijenlerini yüksek avidite ile tanırorsa bu T hücresi apoptozise uğrar. Bu işlemde major doku uygunluk kompleksi (MHC) ile sunulan vücudun öz antijenlerine kuvvetli yanıtlar veren T hücreleri bilinmeyen bir mekanizmayla apoptozis sinyalini oluşturur ve elimine edilir. Buna negatif seleksiyon denmektedir. T hücrelerini apoptozise yönlendiren sinyallerin neler olduğu tam olarak aydınlatılabilmiş değildir (10).

Normal immün sistem fonksiyonlarının devamı için düşük düzeyde oto-reaktif T hücrelerinin varlığı gerekli ve fizyolojiktir (1, 7). T hücre tolerans mekanizmaları Şekil 1'de şematize edilmiştir.



**Şekil 1.** T hücresi merkezi ve periferik tolerans mekanizmaları (10)

#### 4.1.2.1.1 Öz antijenlere tolerans ve anerji

İmmün reaksiyonların oluşması için eş uyaran (ko-stimülatör) moleküllerinin varlığı çok önemli bir yere sahiptir. Eş uyaran moleküllerinin yokluğunda immün reaksiyonlar oluşamaz. Antijen sunan hücreler (ASH) vücudun kendi öz antijenlerini T hücrelerine sunarlar. ASH üzerinde B7 gibi eş uyaran moleküllerinin olmadığı durumlarda T hücrelerinde anerji meydana gelir ve immünolojik tolerans oluşur (3). İmmün reaksiyonların oluşmasında en önemli basamaklardan biri de antijenle T


hücrelerinin temasının olmasıdır, bu temas olmadığı müddetçe immün reaksiyonlar yine oluşamaz. İmmün reaksiyonun oluşabilmesinde diğer bir faktör antijenin miktarıdır. Az miktarda antijenin olduğu durumlarda immün reaksiyonlar oluşmayabilir (11).

#### **4.1.2.1.2 T hücre olgunlaşma faktörleri**

T hücrelerinin olgunlaşması veya yıkılması için gerekli olan faktörlerin eksikliği durumlarında otoimmünite oluşabilir. T hücreleri normalde eş uyaran ve interlökin 2 (IL-2) varlığında yardımcı T hücresine (Th-1) dönüşüp hücrel immün yanıtı başlatmaktadır. Bu gibi faktörlerin yokluğu veya bozukluğunda otoimmün yanıtlar meydana gelmektedir. Sonuç olarak otoimmün hastalıklara zemin oluşmaktadır (11).

#### **4.1.2.1.3 Sitotoksik T lenfosit ile ilişkili antijen (CTLA-4)**

CTLA-4 immün düzenleyici bir moleküldür. T hücresi tarafından eksprese edilir. CTLA-4 molekülleri eş uyaran molekülleri olan ve B7 tarafından eksprese edilen B7-1 ve B7-2 reseptörlerine yüksek derecede afinite gösterirler. Bu reseptörlere bağlanan CTLA-4 molekülleri immün reaksiyonların başlamasını ve dolayısıyla oluşmasını baskırlar. Bu şekilde baskılanan T hücrelerine anerjik T hücreleri denir (1). CTLA-4 molekülleri ile oluşan T hücre anerjisi Şekil 2’de gösterilmiştir.



Şekil 2. CTLA-4 molekülü ve etkileri (10)

#### 4.1.2.2 B hücre toleransı


Serum içerisinde tespit edilen antikorlar bir çok otoimmün hastalık için karakteristiktir. Bazı antikorlar otoimmün hastalıkların klinik oluşumlarında önemli bir role sahiptir. Oto-reaktif B hücrelerinin eliminasyonu için birçok mekanizma bulunmaktadır. Oto-reaktif B hücreleri kemik iliğinde, dalakta ve lenf bezlerinde elimine edilirler.

T hücre yardımı olmadan vücudun kendi öz antijenlerinin B hücreleri yüzey immünglobülinlerine bağlanması durumunda, T hücre yardımından yoksun B hücreleri anerjik hale gelebilmektedir (12-15).

##### 4.1.2.2.1 B hücresinin merkezi toleransı

Olgunlaşmamış B hücreleri kemik iliğinde vücudun kendi öz antijenleriyle kuvvetli bir şekilde immün reaksiyona girerse ya apoptozise uğrar ya da antijen

bağlayan reseptörlerinde yeni bir düzenlemeye gidilerek merkezi tolerans sağlanmış olur (12-14). Şekil 3’de B hücre merkezi toleransı gösterilmiştir.




Şekil 3. B hücre merkezi toleransı (10)

#### 4.1.2.2.2 B hücrenin periferik toleransı

Kemik iliğinden periferik dokulara geçen olgunlaşmış B hücreleri eğer yüksek miktarlarda vücudun kendi öz antijenleriyle karşılaşılırsa, bu antijenlere karşı anerjik yani yanıtsız hale dönüşürler. Burada herhangi bir immün yanıtın oluşması için T hücresinin yardımı gereklidir. Eğer T hücre yardımı yoksa B hücreleri yine anerjik hale gelecektir. Bu tür B hücreleri lenfoid dokulardan dışlanırlar ve herhangi bir uyarana alamadığından eliminasyona uğrarlar (12-15). Şekil 4’de B hücresi periferik tolerans mekanizması gösterilmiştir.





Şekil 4. B hücresi periferik tolerans mekanizması (10)

#### 4.1.2.3. Genetik Yatkınlık

Epidemiyolojik çalışmalar, genetik faktörlerin otoimmün hastalıkların oluşum basamaklarında çok büyük bir rol oynadığını göstermiştir. Ailesel bir otoimmün hastalığın tek yumurta ikizlerinde görülme oranının çift yumurta ikizlerine oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (1, 16-18).

Bazı otoimmün hastalıkların nedeni sadece tek bir genin mutasyonu sonucunda olabilmektedir, örneğin otoimmün regülatör (AIRE) genindeki otozomal resesif bir mutasyonun oluşması sonucunda poliendokrin otoimmün sendrom tip-1 (mukokutanöz kandidiazis, hipoparatiroidizm, addison hastalığı) ortaya çıkabilmektedir (19-21). Başka genlerde oluşabilecek mutasyonlar da otoimmün hastalıkların oluşmasına sebep olabilir. Ancak bu durum gen mutasyonlarını taşıyan her kişinin hasta olacağı anlamına gelmemektedir. Otoimmün hastalıkların büyük bir kesiminin oluşması için birden fazla gen mutasyonunun varlığına gereksinim vardır. Özellikle HLA sisteminde oluşacak

mutasyonların varlığında otoimmün hastalıkların ortaya çıkma ihtimali diğer sistemlerde oluşan gen mutasyonlarına oranla daha fazladır. Bu duruma ankilozan spondilitde HLA-B27, pernisiyöz anemide HLA-Dw5, diabetes mellitus tip-1’de HLA-DQ1\*0301 ve HLA-DQ1\*0302 gen alleli pozitiflikleri örnek olarak gösterilebilir (17, 22, 23). Otoimmün hastalıkların oluşması sadece HLA sistemdeki genetik bozukluklara bağlı da değildir. Bunun yanısıra Sitokinler, eş uyaranlar vb. molekülleri kodlayan genlerdeki mutasyonların varlığı da otoimmün hastalıkların oluşmasına sebep olabilir (1). Tablo 2’de HLA gen allelleri ve ilişkili olduğu otoimmün hastalıklar özetlenmiştir.

**Tablo 2.** HLA gen allelleri ve ilişkili olduğu otoimmün hastalıklar

| OTOİMMÜN HASTALIK           | HLA GEN ALLELİ |
|-----------------------------|----------------|
| Romatoit Artrit             | DR4            |
| Juvenil İdiopatik Artirit   | DR5            |
| Sistemik Lupus eritamatozus | DR3, DR4       |
| Ankilozan Spondilit         | B27            |
| Reiter Hastalığı            | B27            |
| Behçet Hastalığı            | B51            |
| Psöriyatik Artrit           | B27            |
| Diabetes Mellitus Tip 1     | DR3, DR4       |
| Çölyak Hastalığı            | DR3            |
| Myastenia Gravis            | DR3            |


#### 4.1.2.4 Diğer faktörler

Belirli bazı çevresel faktörlerin otoimmün hastalıkların oluşmasında önemli rol oynadığı bildirilmektedir. Örneğin bir popülasyonda görülen diabetes mellitus tip 1 ve multiple skleroz insidansının, popülasyon üyelerinin başka bir yere göç etmeleri durumunda yükseliş gösterdiği belirlenmiştir (24, 25).

Enfeksiyonlar otoimmün hastalıklara yol açabilen diğer bir grup etkindir. Bunun gerçekleşmesi için antijen spesifik veya non-spesifik mekanizmalar önemli rol oynarlar. Bu duruma organizmanın kendi öz antijenleriyle moleküler benzerlik (molecular mimicry) gösteren enfeksiyon ajanlarının antijenleri sebep olurlar. Enfeksiyon ajanlarının antijenlerine karşı gelişen immün yanıtın, oluşacak olan çarpaz reaksiyonlar



ile öz antijenlere karşı da oluşmasıyla otoimmünite meydana gelir (1). Buna en iyi örnek olarak romatojenik streptokok suşlarının M5 peptidi ile kardiak miyozin hücreleri antijenleri arasındaki çapraz reaksiyonlar verilebilir (26-28). Şekil 5’de enfeksiyonlar ve oluşan immüitenin moleküler benzerlikle otoimmüniteye dönüşmesi şematize edilmiştir.



**Şekil 5.** Enfeksiyon ajanlarının otoimmünite ile ilişkisi (10)

Kullandığımız birçok ilaç da otoimmün hastalık oluşumuna sebep olabilmektedir. Bunlardan en önemlileri penisilinler, sefalosporinler, prokainamid ve interferon-alfadır (29).

Otoimmün hastalıkların oluşumuna sebep olan bazı gıda maddeleri uzun yıllardır gündemdedir ve bunlara en iyi örnek olarak gliadin verilebilir. Gliadin buğdayda bulunan gluten isimli proteinin bir parçasıdır. Glutene karşı oluşan hipersensitivite reaksiyonu sonucunda barsak villuslarına karşı otoimmün reaksiyonlar gelişebilmekte ve otoimmün hastalıklar oluşabilmektedir (30).

Stresin otoimmün hastalık oluşmasında önemli birçok farklı etkileri olduğu gösterilmiştir. Akut stres durumunda daha çok immünsüpresif etki ön plandayken, kronik stres durumunda verilen immün cevaplar daha da güçlenmektedir (31).

#### **4.2 Anti nükleer antikor**

Anti nükleer antikor (ANA) DNA histon kompleksine, nükleer ya da sitoplazmik ribonükleer proteinlere (RNP) karşı gelişmiş otoantikorlara verilen genel bir isimdir (11). Otoimmün hastalıkların tanısında ve takibinde önemli bir parametredir (8, 11). Farklı toplumlarda görülme sıklığı değişken olmakla birlikte %5-15 arasında değiştiği ve bu oranın yaşla birlikte arttığı düşünülmektedir. Birçok çalışmada kadınlarda erkeklere göre görülme sıklığının daha yüksek olduğu gösterilmiştir (8).

ANA'lar sistemik otoimmün hastalıklarla beraber bazı organ spesifik otoimmün hastalıklarda ve çeşitli sistemik hastalıklarda tespit edilebilirler. Çeşitli infeksiyonlarda, malign hastalıklarda ve çeşitli ilaçların yan etkisi olarak ANA pozitiflikleri oluşabilir (11).

Sitoplazma içerisinde bulunan ribozom ve mitokondri gibi hücre çekirdeği yapısı dışındaki yapılara karşı da ANA gelişebilmektedir. ANA'lar elli yılı aşkın süredir otoimmün hastalık tanısında kullanılmaktadır. ANA'ların yüksek titrelerde tespit edilmesi daha çok bağ dokusu hastalıkları olarak bilinen sistemik lupus eritematozus (SLE), romatoid artrit (RA), sjögren sendromu, skleroderma, sistemik skleroz, kalsinozis-Raynaud fenomeni-özefagial dismotilite-telenjektazi sendromu (CREST), polimiyozit-dermatomiyozit (PM-DM), karışık bağ dokusu hastalığı (MCTD) gibi hastalıkların varlığını düşündürmektedir. Bu anlatılanlara rağmen sadece ANA pozitifliğinin klinik bulgular olmadan tanısal değeri düşüktür. Bu nedenlerden dolayı ANA'ların tespiti otoimmün hastalık şüphesi klinik bulgularla destelenen olgularda, hastalığın tanısında en önemli laboratuvar belirteçleri arasında sayılmaktadır (4). ANA'lar IgG, IgM, IgE, IgA ve IgD tipinde olabilir ancak en çok IgG tipi ANA'lar oluşmaktadır (32).

#### 4.2.1 Anti nükleer antikorların en önemli alt tipleri

ANA'lar bazı otoimmün hastalıklarla yakın ilişki halindedir. Tablo 3'de ANA'ların karakteristikleri ve görülme sıklıkları verilmiştir. ANA'ların hedef antijenik yapıları tam olarak belirlenmiştir buna rağmen, bu antikorların hastalık oluşum patogenezindeki rolleri yeteri kadar açıklanabilmiş değildir (33).

ANA'lar hedef komponentleri farklılığına göre ikiye ayrılırlar:

1. DNA ve histon proteinlerine karşı gelişen ANA'lar
2. Diğer nükleer antijenlere karşı oluşan ANA'lar

##### 4.2.1.1 DNA ve histon proteinlerine karşı gelişen ANA'lar

- a) Anti-dsDNA, anti-ssDNA antikorları
- b) Anti-histon antikorlar

Bu antikorlar, SLE hastalığının tanısında önemli parametredirler. Tek ve çift sarmal içeren DNA'lara (ss-DNA= tek zincirli DNA ve ds-DNA= çift zincirli DNA) karşı oluşan antikorlar genellikle ilaçlarla oluşmuş, lupus benzeri tablolara yol açan anti-histon antikorlarına verilen isimlerdir (33).

Histonlar hücre nükleusunda bulunan ve miktarı en fazla olan proteini ifade etmektedir. Histon proteinleri DNA ile kromatin denen kompleksleri oluştururlar. Kromatinler ise nükleozom denen alt birimlerin bütünüdür. Histon proteinleri; H-1, H-2A, H-2B H-3 ve H-4 şeklinde isimlendirilirler. Bunlardan H-2A, H-2B H-3 ve H-4 bir histon molekülünü oluştururken H-1 ise 60 bazlık DNA molekülleriyle nükleozoma yapışma görevini üstlenen moleküllerdir.

Anti-histon antikorlar SLE hastalığında oldukça spesifik antikorlardır ve bu özelliklerinden dolayı SLE tanısında önemli bir yer tutmuştur. Anti-ssDNA ve anti-histon antikorlar genellikle anti-dsDNA antikor pozitif serumlarda tespit edilirler. Anti-histon antikorlar direk olarak DNA'nın nükleozom içerisine paketlenmesinde rol alan hücre çekirdeği proteinlerinden olan histonlara yönelik oluşurlar. Anti-histon antikorların ayrıca ilaca bağlı oluşan lupusta oldukça sık oluştuğu bilinmektedir (33).

#### 4.2.1.2 Diğer nükleer antijenlere karşı oluşan ANA'lar

Bu grup antikorlar aynı zamanda ekstrakte edilebilir nükleer antijenler (ENA) olarak da bilinen nükleer yapılara karşı oluşan antikorlardır. Bu zamana kadar bu grup içerisinde tespit edilen antikorlardan en iyi bilinenleri; anti-Sm (smith), anti-U1-RNP (ribonükleoprotein), anti-SSA/Ro, anti-SSB/La, anti-Scl-70, anti-Jo-1 ve M1'dir (34). İlk anti-ENA antikoru 1996 yılında bulunan anti-Sm antikorudur. Yapılan araştırmalarla bu antikoru SLE hastalığının tanısında oldukça spesifik bir belirteç olduğu tespit edilmiştir (33). En sık görülen ANA'lar ve sıklıkla görüldüğü otoimmün hastalıklar Tablo 3 ve Tablo 4'de gösterilmiştir.

**Tablo 3.** Anti nükleer antikorlar ve görüldüğü hastalıklar

| OTOANTİKOR                          | FONKSİYONU                                                       | EN SIK GÖRÜLDÜĞÜ<br>OTOİMMÜN HASTALIK |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Anti-dsDNA                          | Genetik kodlama                                                  | SLE                                   |
| Anti-histon (H1, H2A, H2B . H3, H4) | DNA paketlenmesi                                                 | SLE                                   |
| Anti-Sm                             | RNA'ların splicing olması                                        | SLE                                   |
| Anti-Ku                             | T-hücre reseptörleri regülasyonu                                 | SLE                                   |
| Anti-topoizomerez I (Scl-70)        | DNA- süpersarmal yapının gevşemesi                               | Skleroderma                           |
| Anti-SS-B/La                        | RNA-polimeraz-I enzim regülasyonu                                | Sjögren sendromu, SLE                 |
| Anti-SS-A/Ro                        | Fonksiyonu bilinmiyor<br>Y1-Y5 RNA'lar ile kompleksler oluşturma | Sjögren sendromu, SLE*                |
| Anti-U1-RNP                         | RNA'ların splicing olması                                        | MCTD*                                 |
| Anti-sentromer                      | Hücre bölünmesi                                                  | Progresif sistemik sklerozis          |

\* MCTD= Karışık bağ dokusu hastalığı

\* SLE= Sistemik lupus eritematozus

**Tablo 4.** Bazı anti nükleer antikorlar ve kollejen doku hastalıkları arasındaki ilişki

| ANA ÇEŞİTLERİ       | GÖRÜLME SIKLIĞI                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anti-dsDNA          | SLE’de %30-70                                                                                                 |
| Anti-Sm             | SLE’de %15-30                                                                                                 |
| Anti-histon H2A,H2B | SLE’de %50-70                                                                                                 |
| Anti- SS-A/Ro       | ilaçla oluşmuş SLE’de > %95<br>SLE’de %24-26                                                                  |
| Anti- SS-B/La       | Sjögren sendromunda %88-96 PM-DM’de % 18, PSS’de % 5, RA’de %5<br>SLE’de % 9-34<br>Sjögren sendromunda %71-87 |
| Anti-U1-RNP         | SLE’de %30-40                                                                                                 |
| Anti-Scl-70         | Neredeyse bütün MCTD’li hastalarda tespit edilir<br>Diffüz sistemik skleroderma                               |
| Anti-Jo-1           | Polimiyozit-dermatomiyozit                                                                                    |

#### 4.3 Anti nükleer antikorların laboratuvar tanısı

ANA’ların tespitinde altın standart yöntem indirek immünfloresan (IF) yöntem olarak kabul edilmektedir. Geçen zaman içerisinde yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahip metodlar geliştirilmiştir. Bunun haricinde enzim linked immünosorbent assay (ELISA) immünblot gibi yöntemler de yaygın olarak kullanılmaktadır (35).

##### 4.3.1 Anti nükleer antikorların immünfloresan (IF) yöntem ile tespiti

İmmünfloresan yöntemi ile ANA tespiti ilk olarak 1957 yılında George Friou tarafından geliştirilmiş ve günümüzde kullanılan en yaygın test yöntemidir. Bu test yöntemi oldukça ucuzdur ve diğer metodlara göre yapılması daha kolaydır. Bu nedenle rutin tanı testleri içinde kendisine yer bulmuştur (36). ANA bir reaktif ile bağlanarak değişik otoimmün hastalıklarla bağlantılı olabilen otoantikorlara ait floresan ışımlarla karakterize mikroskobik motifler oluşturur. Direkt ve indirek olmak üzere iki farklı IF test yöntemi vardır. Direkt IF test yönteminde; floresan ile bağlanmış antikor test edilecek örnek içindeki antijen ile bağlanarak kompleks oluşturur ve floresan ışık yayar. Yöntem bu ışığın floresan mikroskopta incelenmesi esasına dayanır. İndirek yöntemde ise aynı şekilde antijenler ile antikor kompleksi oluşur ancak burada antijen-antikor


kompleksi floresan ile bağlanmış anti-antikor ile muamele edilir, oluşan floresan ışımalar yine floresan mikroskopta incelenir (37).

Anti nükleer antikor belirlenmesinde IF testinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için üç parametrenin değerlendirilmesi gereklidir (38).

1. İmmünfloresan boyanma paterni
2. Kullanılan substrat
3. ANA titresi

##### **4.3.1.1 İmmünfloresan boyanma paternleri**

Farklı ANA IF boyanma paternleri vardır; genel olarak sitoplazmik boyanma paterni (benekli, mitokondriyal, ribozomal, golgi aygıtı vb.) ve nükleer boyanma paterni (homojen, periferik membran, benekli, nükleoller, sentromer, mid body, sentriol) diye gruplandırılabilir (34, 38). ANA boyanma paternleri ve en sık ilişkili olduğu hastalıklar Tablo 5’de gösterilmiştir.



**Tablo 5.** IFA yöntemiyle ANA boyanma paternleri ve en sık ilişkili olduğu hastalıklar (38)

#### 4.3.1.2 Kullanılan Substratlar

ANA ile bağlanma özelliği olan birçok substratla denemeler yapılmıştır; sıçan karaciğer doku kesitleri, sıçan böbrekleri ve fare midesi kullanılmıştır. 1975 yılında ilk kez Hep-2 hücreleri; skuamöz laringeal karsinoma hücrelerinden kültüre edilmiştir ve daha sonra hemen hemen bütün dünyada laboratuvarlarda substrat olarak kullanıma girmiştir. Hep-2 hücreleri IF ANA testlerinin hassasiyetlerini daha da artırmıştır. İnsan Hep-2 hücrelerinin kullanıldığı testlerle oldukça iyi sonuçlar alınmıştır. Bazı SLE hastalarında hayvan substratları kullanıldığında negatif sonuçlar alınırken Hep-2 hücreleri kullanılıp tekrarlandığında testlerin pozitive döndüğü görülmüştür (39-42). ANA boyanma paternlerinin Hep-2 hücreleri kullanıldığında floresan ışığa yayan bölgeleri ve ilişkili olduğu antijenler Tablo 6’da gösterilmiştir.

**Tablo 6.** ANA boyanma paternleri ve Hep-2 hücreleri üzerindeki boyanma bölgeleri (38)

| ANA BOYANMA PATERNİ | HEP-2 HÜCRELERİ FLORESAN BOYANA ALAN BÖLGELER                                           | İLİŞKİLİ OLDUĞU ANTİJENLER                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Homojen             | Metafaz pozitif, nükleer homojen veya nükleer ince benekli floresan boyanma             | dsDNA, histon proteinleri, nükleozomlar          |
| İnce granüler       | Metafaz negatif, nükleer ince benekli floresan boyanma                                  | SSA/Ro, SSB/La, Ku, Mi-2                         |
| Kaba granüler       | Nükleolus negatif, nükleer floresan boyanma                                             | U1-RNP, Sm                                       |
| Nükleolar           | Nükleoluslar floresan boyanma                                                           | Scl-70, RNA polimeraz I-III, U3-RNP, fibrillarin |
| Sentromer           | İnterfazda kromozomlar nokta şeklinde floresan boyanma                                  | CENP A-E                                         |
| Nükleer nokta       | Metafaz negatif, nükleer alanda çoğunlukla 13 ile 25 arası nokta tarzı floresan boyanma | Sp 100                                           |
| Pleomorfik          | İnterfazda, heterojen nükleer floresan boyanma                                          | PCNA                                             |
| Sitoplazmik         | Sitoplazmik alanın floresan boyanması                                                   | AMA-M2, Rib-P, Jo-1, Actin                       |



#### **4.3.1.3 Anti nükleer antikor titresi**

ANA titresinin yüksekliği doğrudan IF-ANA testinin sonucunun doğruluğunun göstergesi sayılabilir; titre ne kadar yüksekse otoimmün hastalık oluşma riski o kadar yüksektir. Düşük titrelerdeki ANA pozitiflikleri her zaman otoimmün hastalığı işaret etmeyebilir. Bir çok laboratuvar 1:160 ve üzeri değerleri kronik konnektif doku hastalıkları lehine değerlendirmektedir (43, 44).

#### **4.3.2 Enzim Linked Immünosorbent Assay (ELISA) yöntemi ile ANA tanısı**

ELISA metodu temelinde bir enzimatik renk reaksiyonu bazında geliştirilmiş bir testtir (45).

Antijen spesifik olan bu metod uygulanması kolay, ucuz bir yöntemdir. Bu nedenlerden dolayı ELISA yöntemi dünyada ANA tespitinde bazı laboratuvarlarda tercih edilmektedir. Sadece rutin tarama testi şeklinde olmayıp aynı zamanda spesifik ANA'ların tespitinde de yaygın olarak kullanılmaktadır (34). ELISA testinin güvenilirliği birçok araştırma ile test edilmiştir, farklı sonuçların yanında yanlış pozitif sonuçlar da elde edilmiştir (46).

#### **4.4 Ekstrakte edilebilir nükleer antijenlere (ENA) karşı gelişen antikorların tespit yöntemleri**

Anti-ENA antikorlarını tespit edebilmek için değişik metodlar geliştirilmiştir. Hemaglutinasyon metodu çok yaygın olarak kullanılmış ancak yerini daha hassas ve modern metodlara bırakmıştır. Bu yeni metodlar arasında western (immüno) blot, dot blot, line blot, multiplex immüno assay ve antijen-mikroarray sayılabilmektedir (47, 48).

##### **4.4.1 Western (immüno) blot testi**

Western blot testinde araştırılacak proteinler poliakrilamid jel elektroferez işlemine tabi tutulur ve molekül ağırlıklarına göre ayrıştırılır. Ayrıştırılan proteinler nitroselüloz kağıt membranlara emdirilerek stripler elde edilir. Hasta serumuyla muamele edilen stripler belirli bir prosedürü takiben belirli bantlar oluşturup

oluşturmamasına göre değerlendirme yapılır (49). Resim 1’de western (immüno) blot test stripleri görülmektedir

| Lot                | Membran      |
|--------------------|--------------|
| D100601AC<br>62-46 | ENA-1/ 62-46 |
| D100601AC<br>91-78 | ENA-1/ 91-78 |
| D100601AC<br>91-77 | ENA-1/ 91-77 |
| D100601AC<br>91-76 | ENA-1/ 91-76 |
| D100601AC<br>91-75 | ENA-1/ 91-75 |
| D100601AC<br>91-74 | ENA-1/ 91-74 |
| D100601AC<br>91-73 | ENA-1/ 91-73 |
| D100601AC<br>91-71 | ENA-1/ 91-71 |
| D100601AC<br>91-70 | ENA-1/ 91-70 |
| D100601AC<br>91-69 | ENA-1/ 91-69 |
| D100601AC<br>91-68 | ENA-1/ 91-68 |
| D100601AC<br>91-67 | ENA-1/ 91-67 |

**Resim 1.** Western (immüno) blot test stripleri

## 5. GEREÇ VE YÖNTEM

### 5.1 GEREÇ

Trabzon ili erişkin yaş grubundaki ANA seroprevalansını araştırmak amacıyla, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Dahiliye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından yapılan "Trabzon İli 20 Yaş Üzeri Erişkinlerde Guatr Prevalansı ve İlişkili Risk Faktörleri" isimli çalışmada, KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yapılan "Trabzon İli 20-49 Yaş ve Üzeri Erişkinlerde Herpes Simpleks Tip-2 Seroprevalansı" ve "Trabzon İlinde 40 Yaş ve Üzeri Erişkinlerin Tetanoz Antitoksin Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler" isimli çalışmalar için toplanan ve alikotlanarak -20 °C’de saklanan serumlar çalışmaya alındı.

#### 5.1.1 Örneklem büyüklüğünün hesaplaması

Çalışmada Trabzon ilinden toplanan serumlarda ANA serolojisi IF yöntemi ile araştırıldı. Örneklem büyüklüğü beklenen en yüksek prevalans %99 güvenle %15 olacağı ön görüşü eşliğinde, %3 sapmayla  $n = Z^2 \cdot 1 - \alpha / 2 \cdot X [p(1-p)/d^2]$  formülü kullanılarak 884 kişi olarak hesaplandı.

#### 5.1.2 Örneklem seçimi

Çalışmada çok aşamalı örnekleme yöntemi kullanıldı. Birinci aşamada Trabzon iline bağlı 17 ilçeden ilin coğrafi özellikleri göz önüne alınarak kurayla 9 tanesi seçildi. İkinci aşamada her yerleşim bölgesinde sağlık ocağı bölgelerinden yararlanılarak 20 yaş ve üzeri erişkinler, yaş gruplarına, cinsiyete (Tablo 13-14) ve diğer sosyodemografik özelliklerine göre tabakalandırıldı.

#### 5.1.3 Verilerin toplanması

Çalışmaya alınan tüm kişilere ait bilgileri elde edebilmek için araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket formu kullanıldı. Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, aylık gelir düzeyi ve tetanoza karşı aşılama durumlarının sorgulandığı anket formu, konu hakkında eğitim verilmiş olan Tıp Fakültesi Dönem 2 ve Dönem 5 öğrencileri tarafından yüzyüze görüşme tekniğiyle dolduruldu.

#### **5.1.4 Kan örneği alınması**

Anketi yapılan kişiler, ertesi gün sağlık ocağına davet edilerek brakial venden 7-8 ml kadar venöz kan antikoagülansız vakumlu tüplere, özel iğneler kullanılarak, hava ile temas etmeyecek şekilde alındı. Alınan bu kanlardan 3000 rpm’de 8 dk’lık santrifüjü takiben serum örnekleri elde edildi; örnekler Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı’na ulaştırıldı. Laboratuvarda, serumlar 1 mL’lik santrifüj tüplerine bölünerek serolojik analizleri yapılana kadar -20 °C’de saklandı.

### **5.2 YÖNTEM**

#### **5.2.1 ANA varlığının tespiti**

ANA varlığı ve boyanma paterni IF yöntemiyle Antibodies against cell nuclei (IgG) (EUROIMMUN, Lübeck, Almanya) kitleri kullanılarak belirlendi. Kitler üretici firmanın talimatlarına uygun olarak kullanılıncaya kadar +2 ile +8 °C’de muhafaza edildi. ANA IF test kit içeriği Tablo 7’de gösterilmiştir.

Çalışmaya başlamadan önce kullanılan tüm malzemeler oda sıcaklığına getirildi. Serum dilüsyonları 1:80 olacak şekilde dilüe edildi. Çalışmaya 884 serum örneği dahil edildi. Testler üretici firmanın önerileri doğrultusunda gerçekleştirildi. Floresans mikroskop kullanılmak şartıyla birbirinden bağımsız iki farklı kişi tarafından slaytlar floresan boyanma şiddetine göre +1, +2, +3, +4 olarak derecelere ayrıldı ve boyanma paternleri belirlendi.

**Tablo 7.** ANA IF test kit içeriği

| <b>ANA IF test kit içeriği</b>                  | <b>Hazırlanması</b>                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Her alanda 2 BIOCHIP slayt                      | Her bir slayt Hep-20-10 hücreleri/maymun karaciğeri kaplıdır, kullanıma hazır                                  |
| 1,5 mL floresan (FITC*) işaretli anti-human IgG | Kullanıma hazır                                                                                                |
| 0,1 mL pozitif kontrol                          | Kullanıma hazır                                                                                                |
| 2 paket fosfat tamponu (PBS)                    | Her paket 1Lt distile su çözülerek hazırlanır (PBS)                                                            |
| 2 adet 2 mL Tween 20                            | Bir litre distile su içerisine çözülerek hazırlanan PBS içine 2mL tween 20 katılmasıyla hazırlanır (PBS-Tween) |
| 3 mL kapatma medyum                             | Kullanıma hazır                                                                                                |
| Kapatma lamelleri                               | Kullanıma hazır                                                                                                |
| İnkübasyon tepsisi                              | Kullanıma hazır                                                                                                |

\*FITC floresein izotiyosiyonat

### **Testin yapılışı**

- Serum örnekleri 1/80 olacak şekilde 12,5 µL serum 987,5 µL fosfat tampon (PBS)-Tween solüsyonu içinde seyreltilerek hazırlandı.
- Hazırlanan dilüsyonlar inkübasyon tepsisi üzerine ilgili alanlara 25 µL olacak şekilde aktarıldı ve üzerleri slaytlar ile kapatıldı, oda sıcaklığında 30 dak inkübe edildi.
- İnkübasyon sonrası slaytlar kaldırıldı ve üzerlerine PBS-Tween çözeltisi döküldü, ardından slaytlar PBS-Tween çözeltisi ile dolu yıkama küvetinde en az 5 dak olacak şekilde bekletildi.
- İnkübasyon tepsisi üzerine ilgili alanlara 20 µL floresan işaretli anti-human IgG konjugat aktarıldı. Bunun üzerine yıkama süresi dolan slaytlar arka yüzleri kurulandıktan sonra hemen kapatıldı. Oda ısısında 30 dak inkübe edildi.

- e. İnkübasyon sonrası slaytlar kaldırıldı. Üzerlerine PBS-Tween solüsyonu döküldü. Ardından slaytlar PBS-Tween solüsyonu ile dolu yıkama küvetinde en az 5 dak olacak şekilde bekletildi.
- f. İnkübasyon tepsisi üzerine lameller konuldu ve ilgili yerlere kapatma medyumunu her bir alana 10 µL olacak şekilde aktarıldı, bunun üzerine yıkama süresi dolan slaytlar arka yüzleri kurulandıktan sonra hemen kapatıldı.
- g. Slaytlar floresan mikroskopta incelenmeye alındı.
- h. Hazırlanan tüm slaytlar farklı iki kişi tarafından değerlendirildi.
- i. Sonuçlar +1, +2, +3, +4 olarak değerlendirildi.
  - +1; 1/80 dilüsyon
  - +2; 1/160 dilüsyon
  - +3; 1/320 dilüsyon
  - +4; 1/640 dilüsyon olarak değerlendirildi.

### **5.2.2 Anti-ENA varlığının tespiti**

ANA antikorları IF yöntemiyle pozitif bulunan ve benekli şekilde boyanan serum örnekleri anti-ENA antikorlarının varlığı açısından araştırıldı. Çalışmada Anti-ENA profile Plus1 (IgG) (EUROIMMUN, Lübeck, Almanya) test kiti kullanıldı. Çalışmada yapılan bütün işlemler firma önerileri doğrultusunda gerçekleştirildi. ENA profile Plus1 (IgG) test içeriği Tablo 8’de gösterilmiştir.

**Tablo 8.** ENA profile Plus1 (IgG) test içeriği ve içerdiği antijen veya içerik miktarı

| <b>Anti-ENA profile plus 1 (IgG) test içeriği</b>    | <b>İçerdiği antijen veya içerik miktarı</b>        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Antijen kaplı stripler                               | nRNP/Sm, Sm, SS-A/Ro, Ro-52, SS-B/La, Scl-70, Jo-1 |
| Pozitif kontrol (IgG, insan) 100X konsantre          | 1 x 0,02 mL                                        |
| Enzim konjugat (anti-human IgG, keçi), 10X konsantre | 1 x 3 mL                                           |
| Numune tamponu kullanıma hazır                       | 1 x 100 mL                                         |
| Yıkama tamponu 10X konsantre                         | 1 x 50 mL                                          |
| Substrat çözeltisi (NBT/BCIP*) kullanıma hazır       | 1 x 30 mL                                          |
| İnkübasyon tepsisi                                   |                                                    |
| Test talimatı                                        |                                                    |

\* NBT/BCIP= Nitro blue tetrazolium chloride/5-Bromo-4-chloro -3-indolylphosphate

### **Testin yapılışı:**

- Serum örnekleri ve pozitif kontrol 1:101 oranında numune tamponuyla seyreltildi.
- Antijen kaplı stripler kilitli ambalajından çıkarılıp inkübasyon tepsisi kanalları içine yerleştirildi ve üzerlerine 1500 µL numune tamponu eklenerek çalkalayıcı üzerinde 5 dak oda ısısında inkübe edildi. Sürenin dolmasıyla kanallardaki sıvı stripler içinde kalacak şekilde ortamdan uzaklaştırıldı.
- Her kanaldaki strip üzerine 1500 µL seyreltilmiş serum örneği ve pozitif kontrol eklenerek çalkalayıcı üzerinde 30 dak oda ısısında inkübe edildi. Sürenin dolmasıyla kanallardaki sıvı, stripler içinde kalacak şekilde ortamdan uzaklaştırıldı.
- 1/10 oranında yıkama tamponu ile distile su temiz bir kap içinde karıştırılarak yıkama çözeltisi elde edildi.
- Hazırlanan yıkama çözeltisinden her kanala 1500 µL aktarıldı. Çalkalayıcı üzerinde 5 dak oda ısısında bekletildi. Ardından sıvı ortamdan uzaklaştırıldı. Bu işlem 3 kez tekrar edildi.

- f. Enzim konjugat ile numune tamponu 1/10 oranında seyreltildi. Hazırlanan dilüsyonlardan her kanaldaki strip üzerine 1500 µL seyreltilmiş enzim konjugat eklenerek çalkalayıcı üzerinde 30 dak oda ısısında inkübe edildi. Sürenin dolmasıyla kanallardaki sıvı stripler içinde kalacak şekilde ortamdan uzaklaştırıldı.
- g. Hazırlanan yıkama çözeltisinden her kanala 1500 µL aktarıldı. Çalkalayıcı üzerinde 5 dak oda ısısında bekletildi. Ardından sıvı ortamdan uzaklaştırıldı. Bu işlem 3 kez tekrar edildi.
- h. Kullanıma hazır şekilde bulunan substrat çözeltisinden her kanala 1500 µL aktarıldı. Çalkalayıcı üzerinde 10 dak oda ısısında bekletildi. Sürenin dolmasıyla kanallardaki sıvı stripler içinde kalacak şekilde ortamdan uzaklaştırıldı.
- i. Distile su ile her kanala 1500 µL aktarıldı. Çalkalayıcı üzerinde 1 dak oda ısısında bekletildi, ardından sıvı ortamdan uzaklaştırıldı. Bu işlem 3 kez tekrar edildi.
- j. Sonuçlar EUROLinescan programı kullanılarak değerlendirildi.

### 5.2.3 İstatistiksel yöntem

Sonuçların istatistiksel değerlendirmesinde SPSS 13.0 programı kullanıldı. ANA pozitifliğine etki eden faktörleri belirlemek amacıyla sonuçlar yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, sigara kullanımı, guatr olma, medeni durum, eğitim düzeyi ve gelir düzeyi durumuna göre analiz edildi. Değerlendirmede ki-kare testi (Pearson ki-kare testi) kullanıldı. Anlamlılık düzeyi  $p < 0,05$  olarak alındı.



## 6. BULGULAR


Trabzon ili erişkin yaş gruplarında ANA ve anti-CCP seropozitifliğinin araştırılması amacıyla Trabzon merkez ve 9 ilçesinden toplam 884 kişiden elde edilen serum örnekleri çalışmaya alındı. Toplanan serum örneklerinin cinsiyet ve yerleşim yerlerine göre dağılımı Tablo 9’da gösterilmiştir.

**Tablo 9.** Toplanan serum örneklerinin yerleşim yerleri ve cinsiyete göre dağılımları


| YERLEŞİM<br>YERİ | KADIN      | ERKEK      | TOPLAM     | YÜZDE<br>(%) |
|------------------|------------|------------|------------|--------------|
| Merkez           | 275        | 266        | 541        | 61,2         |
| Akçaabat         | 50         | 45         | 95         | 10,7         |
| Araklı           | 26         | 23         | 49         | 5,5          |
| Çaykara          | 3          | 3          | 6          | 0,7          |
| Düzköy           | 6          | 6          | 12         | 1,4          |
| Maçka            | 10         | 12         | 22         | 2,5          |
| Of               | 25         | 23         | 48         | 5,4          |
| Sürmene          | 19         | 18         | 37         | 4,2          |
| Vakfikebir       | 24         | 20         | 44         | 5,0          |
| Yomra            | 15         | 15         | 30         | 3,4          |
| <b>Toplam</b>    | <b>453</b> | <b>431</b> | <b>884</b> | <b>100</b>   |

### 6.1 ANA seropozitiflikleri ve dağılımları


Çalışmaya alınan 884 serum örneğinin 132’sinde (%14,93) ANA testi 1:80 ya da daha üzeri dilüsyonlarda pozitif olarak tespit edildi. En sık görülen boyanma paterni benekli patern (53 örnek, %5,99) olarak belirlendi. Benekli patern Resim 2’de gösterilmiştir. İkinci en sık görülen boyanma paterni sitoplazmik patern (36 örnek, %4,07) olarak belirlendi. Sitoplazmik patern Resim 3’de gösterilmiştir. Üçüncü sıklıkta nükleoler patern (26 örnek, %2,94) olarak belirlendi. Nükleoler patern Resim 4’de gösterilmiştir. ANA pozitiflikleri ve boyanma paternleri Tablo 10’da gösterilmiştir.



**Resim 2.** Benekli boyanma paterni



**Resim 3.** Sitoplazmik boyanma paterni



**Resim 4.** N kleoler boyanma paterni

**Tablo 10.** ANA pozitifliklerinin IF boyanma paternlerine göre dağılımları

| IF BOYANMA PATERNİ         | ANA POZİTİFLİK DERECEŚİ   |                           |                          |                          | SAYI<br>(n=884) | YÜZD<br>E (%) |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
|                            | 1:80                      | 1:160                     | 1:320                    | 1:640                    |                 |               |
| Benekli                    | 3                         |                           |                          |                          | 3               | 0,33          |
| Benekli+ mid body          | 2                         |                           |                          |                          | 2               | 0,22          |
| Benekli+ nükleoler         | 1                         |                           |                          |                          | 1               | 0,11          |
| Kaba benekli               | 1                         | 2                         |                          |                          | 3               | 0,33          |
| Kaba benekli, ince benekli | 2                         |                           |                          |                          | 2               | 0,22          |
| İnce benekli               | 22                        | 5                         | 2                        |                          | 29              | 3,28          |
| Homojen+benekli            |                           | 4                         |                          | 1                        | 5               | 0,56          |
| Homojen+ ince benekli      | 2                         | 5                         | 1                        |                          | 8               | 0,90          |
| Homojen                    | 3                         | 1                         |                          | 1                        | 5               | 0,56          |
| Mid-body                   | 3                         | 2                         |                          |                          | 5               | 0,56          |
| Nükleer noktalı            | 1                         | 2                         |                          |                          | 3               | 0,33          |
| Nükleoler                  | 18                        | 6                         | 2                        |                          | 26              | 2,94          |
| Sentriol                   | 1                         |                           |                          |                          | 1               | 0,11          |
| Sentromer                  |                           |                           |                          | 2                        | 2               | 0,22          |
| Spindle fibres             | 1                         |                           |                          |                          | 1               | 0,11          |
| Sitoplazma filamentöz      | 11                        | 5                         | 2                        |                          | 18              | 2,03          |
| Sitoplazma benekli         | 13                        | 5                         |                          |                          | 18              | 2,03          |
| <b>Toplam</b>              | <b>84</b><br><b>%9,50</b> | <b>37</b><br><b>%4,18</b> | <b>7</b><br><b>%0,56</b> | <b>4</b><br><b>%0,45</b> | <b>132</b>      | <b>%14,93</b> |

Çalışmada Trabzon il merkezindeki 541 örnekten 81'i (%14,9), ilçelerden alınan 343 örnekten 51'i (%14,86) ANA pozitif bulundu. En yüksek pozitiflik oranı Araklı ilçesinde görüldü. Araklı'dan alınan 49 örnekten 11'i (%22,4) ANA pozitif. İl merkezi ve ilçelerdeki ANA pozitifliklerinin dağılımları Tablo 11 ve Tablo 12'de gösterilmiştir. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p=0,987).

**Tablo 11.** ANA pozitifliklerinin yerleşim yerlerine göre dağılımı.

| <b>YERLEŞİM<br/>YERİNE GÖRE</b> | <b>KİŞİ<br/>SAYISI</b> | <b>ANA<br/>POZİTİFLİĞİ<br/>(n)</b> | <b>YÜZDE<br/>(%)</b> |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Merkez                          | 541                    | 81                                 | 14,97                |
| Akçaabat                        | 95                     | 16                                 | 16,84                |
| Araklı                          | 49                     | 11                                 | 22,44                |
| Çaykara                         | 6                      | 1                                  | 16,66                |
| Düzköy                          | 12                     | 0                                  | 0                    |
| Maçka                           | 22                     | 3                                  | 13,63                |
| Of                              | 48                     | 4                                  | 8,33                 |
| Sürmene                         | 37                     | 5                                  | 13,51                |
| Vakfikebir                      | 44                     | 8                                  | 18,18                |
| Yomra                           | 30                     | 3                                  | 10,00                |
| <b>Toplam</b>                   | <b>884</b>             | <b>132</b>                         | <b>14,93</b>         |

**Tablo 12.** ANA pozitifliğinin merkez ve ilçeler arasındaki dağılımı.

|               | <b>KİŞİ<br/>SAYI</b> | <b>ANA<br/>POZİTİFLİĞİ (n)</b> | <b>YÜZDE<br/>(%)</b> |
|---------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Merkez        | 541                  | 81                             | 14,97                |
| İlçeler       | 343                  | 51                             | 14,86                |
| <b>Toplam</b> | <b>884</b>           | <b>132</b>                     | <b>14,93</b>         |

ANA pozitifliklerinin cinsiyetlere göre dağılımları değerlendirildi; 453 kadının serum örneğinin 73'ü (%16,1) ANA pozitif olarak tespit edildi, 431 erkeğin serum örneğinin 59'u (%13,6) ANA pozitif olarak saptandı. ANA pozitiflik sayı ve oranlarının cinsiyetlere göre dağılımları Tablo 13'de belirtilmiştir.

ANA pozitifliklerinin cinsiyetlere göre dağılımları değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı ( $p=0,312$ ).

**Tablo 13.** ANA pozitifliklerinin cinsiyetlere göre dağılımı.

| CİNSİYET | KİŞİ<br>SAYISI | ANA<br>POZİTİFLİĞİ (n) | YÜZDE<br>(%) |
|----------|----------------|------------------------|--------------|
| Kadın    | 453            | 73                     | 16,11        |
| Erkek    | 431            | 59                     | 13,68        |
| Toplam   | 884            | 132                    | 14,93        |

ANA pozitifliklerinde yaşa göre dağılımlara bakıldığında 30-39 yaş grubunda 262 örneğin 37'sinde (%14,12), 50-59 yaş grubunda 122 örneğin 19'unda (%15,5) ve 60-69 yaş grubunda 69 örneğin 11'inde (%15,9) ANA pozitifliği tespit edildi. 30-39, 50-59 ve 60-69 yaş gruplarında daha yüksek oranlar tespit edilirken 70 yaş ve üzerindeki 55 örneğin sadece 7'si (%12,72) ANA pozitif olarak saptandı. Tüm yaş gruplarında en az oranda pozitiflik 70 yaş ve üzerindeki grupta tespit edildi. ANA pozitifliğinin yaş gruplarına göre dağılımları Tablo 14'de gösterilmiştir.

ANA pozitifliğinin yaşa göre dağılımlarına bakıldığında istatistiksel olarak gruplar arasında anlamlı fark bulunamadı ( $p=0,980$ ).

**Tablo 14.** ANA pozitif örneklerin yaş gruplarına göre dağılımları

| YAŞ           | KİŞİ       | ANA             | YÜZDE        |
|---------------|------------|-----------------|--------------|
| GRUBU         | SAYISI     | POZİTİFLİĞİ (n) | (%)          |
| 20-29         | 262        | 37              | 14,12        |
| 30-39         | 203        | 33              | 16,25        |
| 40-49         | 173        | 25              | 14,45        |
| 50-59         | 122        | 19              | 15,57        |
| 60-69         | 69         | 11              | 15,94        |
| 70+           | 55         | 7               | 12,72        |
| <b>Toplam</b> | <b>884</b> | <b>132</b>      | <b>14,93</b> |

ANA pozitifliğinin sigara kullanımı ile bağlantısına bakıldığında sigara kullanan 308 kişinin serum örneklerinden 35'i (%11,36) ANA pozitif olarak tespit edildi. Sigara kullanmayan 484 kişinin serum örneklerinden 82'si (%16,84) ANA pozitif olarak tespit edildi. Sigara kullanmış bırakmış olan 92 kişinin serum örneklerinden 15'i (%16,3) ANA pozitif olarak tespit edildi. Sigara kullanımı ile ANA pozitifliği dağılımları Tablo 15'de gösterilmiştir.

ANA pozitifliğinin sigara kullanımına göre dağılımlarına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı ( $p=0,054$ ).

**Tablo 15.** ANA pozitifliğinin sigara kullanımına göre dağılımı

| SİGARA KULLANIMI   | KİŞİ SAYISI | ANA POZİTİFLİĞİ (n) | YÜZDE (%)    |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Kullanıyor         | 308         | 35                  | 11,36        |
| Kullanmıyor        | 484         | 82                  | 16,94        |
| Kullanmış bırakmış | 92          | 15                  | 16,30        |
| <b>Toplam</b>      | <b>884</b>  | <b>132</b>          | <b>14,93</b> |

Gelir durumuna göre ANA pozitifliğinin dağılımına bakıldığında 1000 Türk lirası (TL) ve altında gelire sahip 656 kişinin serum örneğinin 97'sinde (%14,78) ANA pozitif tespit edildi. Gelir durumu 1000 Türk lirası üzerindeki 228 kişinin serum örneğinin 35'inde (%15,35) ANA pozitif tespit edildi. Gelir durumu ve ANA pozitifliği dağılımı Tablo 16'de gösterilmiştir.

Gelir düzeyine göre karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı ( $p=0,887$ ).

**Tablo 16.** Gelir durumu ve ANA pozitifliği dağılımı

| <b>GELİR DÜZEYİ</b> | <b>KİŞİ SAYISI</b> | <b>ANA POZİTİFLİĞİ (n)</b> | <b>YÜZDE (%)</b> |
|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| 1000 TL ve altı     | 656                | 97                         | 14,78            |
| >1000 TL            | 228                | 35                         | 15,35            |
| <b>Toplam</b>       | <b>884</b>         | <b>132</b>                 | <b>14,93</b>     |

Medeni durum ile ANA pozitifliğinin dağılımlarına bakıldığında evli olan 650 kişinin serum örneğinden 98'inde (%15,07) ANA pozitif olarak tespit edildi. Bekar olan 182 kişinin serum örneğinden 29'unda (%15,93) ANA pozitif tespit edildi. Medeni duruma göre ANA pozitiflik dağılımları Tablo 17'da gösterildi. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı ( $p=0,826$ ).

**Tablo 17.** Medeni duruma göre ANA pozitifliği dağılımları

| <b>MEDENİ DURUMU</b> | <b>KİŞİ SAYISI</b> | <b>ANA POZİTİFLİĞİ (n)</b> | <b>YÜZDE (%)</b> |
|----------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| Evli                 | 650                | 98                         | 15,07            |
| Bekar                | 182                | 29                         | 15,93            |
| Diğer                | 52                 | 5                          | 9,61             |
| <b>Toplam</b>        | <b>884</b>         | <b>132</b>                 | <b>14,93</b>     |

Eğitim durumu ile ANA pozitifliği dağılımlarına bakıldığında örgün eğitim alamayan 89 kişinin serum örneğinden 14'ünde (%15,73) ANA pozitif tespit edildi. İlk öğretim mezunu 406 kişinin serum örneğinden 54'ünde (%13,30) ANA pozitif tespit edildi. Lise ve üstü eğitim düzeyine sahip 386 kişinin serum örneğinden 64'ünde



(%16,58) ANA pozitifliği tespit edildi. İstatistiksel olarak gruplar arasında anlamlı fark bulunamadı ( $p=0,787$ ). Eğitim durumuna göre ANA pozitiflik dağılımları Tablo 18’de gösterilmiştir.

**Tablo 18.** Eğitim durumuna göre ANA pozitiflik dağılımları

| EĞİTİM DURUMU           | KİŞİ SAYI  | ANA POZİTİFLİĞİ (n) | YÜZDE (%)    |
|-------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Örgün eğitim almayanlar | 89         | 14                  | 15,73        |
| İlköğretim mezunu       | 406        | 54                  | 13,30        |
| Lise ve üstü mezunu     | 386        | 64                  | 16,58        |
| <b>Toplam</b>           | <b>881</b> | <b>132</b>          | <b>14,93</b> |

Beden kitle indeksi (BKİ) kişinin kilosunun boy uzunluğunun karesine bölme işlemi yapılmasıyla elde edildi. BKİ 25 ve üzeri olanlar ile 25’in altı olanlarda ANA pozitifliğine göre dağılımlar incelendiğinde; BKİ 25 ve üzeri hesaplanan 23 kişiden 3’ünde (%13,04) ANA pozitif tespit edildi. BKİ 25’in altında hesaplanan 861 kişiden 129’unda (%14,98) ANA pozitif olarak tespit edildi. Dağılımlar Tablo 19’da gösterilmiştir. İstatistik olarak iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamadı ( $p=1,000$ ).

**Tablo 19.** Beden kitle indeksine göre ANA pozitifliğinin dağılımları

| BEDEN KİTLE İNDEKSİ (BKİ) | KİŞİ SAYI  | ANA POZİTİFLİĞİ (n) | YÜZDE (%)    |
|---------------------------|------------|---------------------|--------------|
| 25 ve üzeri               | 23         | 3                   | 13,04        |
| <25                       | 861        | 129                 | 14,98        |
| <b>Toplam</b>             | <b>884</b> | <b>132</b>          | <b>14,93</b> |

## **6.2 Anti-ENA antikorları ve görülen bantların dağılımları**

ANA pozitif olarak saptanan ve benekli boyanma özelliği gösteren 53 serum örneği anti-ENA antikorlarını belirlemek amacıyla çalışmaya alındı. Bu amaçla immünblot testleri uygulanarak anti-ENA antikorları belirlendi. Anti-ENA antikorlarının ANA pozitiflik derecelerine göre dağılımları Tablo 20’de gösterilmiştir.

**Tablo 20.** Anti-ENA antikorlarının ANA pozitiflik derecelerine göre dağılımları

| ANA<br>POZİTİFLİĞİ            | nRNP/Sm |      |    |    | Sm |       |    |    | SS-A/Ro |    |    |    | SS-B/La |    |    |    | Scl-70 |    |    |    | Jo-1 |    |    |    | Ro52  |    |    |     | Toplam |
|-------------------------------|---------|------|----|----|----|-------|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|----|----|----|------|----|----|----|-------|----|----|-----|--------|
|                               | 1+      | 2+   | 3+ | 4+ | 1+ | 2+    | 3+ | 4+ | 1+      | 2+ | 3+ | 4+ | 1+      | 2+ | 3+ | 4+ | 1+     | 2+ | 3+ | 4+ | 1+   | 2+ | 3+ | 4+ | 1+    | 2+ | 3+ | 4+  |        |
| Benekli                       |         |      |    |    |    |       |    |    |         |    |    |    | 1       |    |    |    | 1      |    |    |    |      |    |    |    | 2     |    |    |     | 4      |
| Benekli<br>+mid body          |         |      |    |    |    |       |    |    |         |    |    |    | 1       |    |    |    | 1      |    |    |    | 1    |    |    |    | 1     |    |    |     | 4      |
| Benekli<br>+nükleoler         |         |      |    |    |    |       |    |    | 1       |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    | 1     |    |    |     | 2      |
| Homojen+<br>benekli           |         | 1    |    |    |    |       |    |    |         | 1  |    |    |         |    |    |    |        |    |    |    | 1    |    |    |    |       |    | 1  |     | 4      |
| Homojen<br>+ince benekli      | 1       | 2    |    |    |    | 4     | 1  |    |         | 2  | 1  |    |         | 1  | 1  |    | 1      | 1  |    |    | 1    |    |    |    | 1     | 3  |    |     | 20     |
| İnce benekli                  | 2       | 1    | 2  |    | 6  | 1     | 1  |    | 8       | 3  | 1  |    | 5       | 1  |    |    | 6      | 1  |    |    | 3    | 1  |    |    | 7     | 3  | 1  |     | 53     |
| Kaba benekli<br>+ince benekli |         |      |    |    |    |       |    |    | 1       |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    | 1  |      |    |    |    | 1     |    |    |     | 3      |
| Kaba benekli                  |         |      |    |    |    | 1     |    |    |         | 1  |    |    | 1       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    | 1     | 1  |    |     | 5      |
| Toplam                        | 3       | 4    | 2  |    | 6  | 6     | 2  |    | 10      | 7  | 2  |    | 8       | 2  | 1  |    | 9      | 2  |    |    | 6    | 2  |    |    | 14    | 7  | 1  | 1   | 95     |
| Yüzde                         |         | 9,47 |    |    |    | 14,73 |    |    | 20      |    |    |    | 11,57   |    |    |    | 11,57  |    |    |    | 8,42 |    |    |    | 24,21 |    |    | 100 |        |

Serum örneklerinden 3'ünde herhangi bir anti-ENA antikoru tespit edilemedi, diğer 50 örnekte anti-ENA antikorlarına ait bantlar elde edildi. 1:160 dilüsyonda homojen granüler boyanma paterni gösteren bir örnekte sadece anti-Jo-1 bantında pozitiflik saptandı. Diğer tüm örneklerde beklendiği gibi nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B antijenlerine ait antikör bantları tespit edildi. Scl-70 bantının tespit edildiği tüm örneklerde SS-A, SS-B, nRNP/Sm bantlarından en az biri tespit edildi.

Çalışılan serum örneklerinde toplam 95 anti-ENA antikorlarına ait bant tespit edildi. Bunlardan 23'ü Ro52 antijenine ait banta karşı oluştu. Bunları sırayla SS-A'ya karşı oluşan 19 bant, Sm'ye karşı oluşan 14 bant takip etti.

Tüm örnekler arasındaki seroprevalanslarına bakıldığında, Ro52'ye ait prevalans %2,60 olarak tespit edildi. ENA antijenlerine karşı oluşan bant sayıları Tablo 21'de gösterildi.

**Tablo 21.** ENA antijenleri ve prevalansı

| ENA ANTİJENLERİ | OLUŞAN BANT SAYISI (n=95) | PREVALANS (%) (n=884) |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| nRNP/Sm         | 9                         | 1,01                  |
| Sm              | 14                        | 1,58                  |
| SS-A/Ro         | 19                        | 2,14                  |
| SS-B/La         | 11                        | 1,24                  |
| Scl-70          | 11                        | 1,24                  |
| Jo-1            | 8                         | 0,90                  |
| Ro52            | 23                        | 2,60                  |

## 7. TARTIŞMA ve SONUÇ

Hücre içi self antijenlere karşı gelişen otoantikörler kollajen doku hastalıklarıyla yakından ilişkilidir. Otoimmünite ve sonucunda gelişen otoantikörler SLE, sistemik skleroz, sjögren sendromu gibi sistemik hastalıkların yanında PM-DM gibi birçok organ tutulumlu hastalıklarla beraber bulunurlar (50). ANA'lar birçok otoimmün ve enfeksiyon hastalıklarında tespit edilebilmektedir. ANA tespiti bu hastalıklar için çok özgül bir parametre olmamasına rağmen, SLE gibi bazı hastalarda %98've varan bir oranda bulunabilmektedir. ANA'lar tanısal olmasa bile tarama amaçlı olarak araştırılması yararlıdır (51). ANA tespiti için en yaygın ve altın standart test IF testidir. Bu amaçla substrat olarak Hep-2 hücreleri en fazla kullanılan substrattır (52). ANA'ların tespiti otoimmün hastalıkların tanısında önemli bir basamağı oluştururken, bu hastalıkların tedavi planlamalarında ve takiplerinde önemli yere sahiptir (50).

Normalde sağlıklı insanlarda, kronik hepatit, neoplastik hastalıklar, tüberküloz, malarya ve çeşitli bakteriyel enfeksiyonlarda otoantikörler düşük titrelerde tespit edilebilmektedir (50). Normal insanlarda ve asemptomatik hastalarda tespit edilen düşük titredeki otoantikörlerin ileride oluşacak olan hastalıkların habercisi olabileceğine yönelik inanış giderek artmaktadır (53).

Biz bu çalışmada Trabzon ili erişkin yaş gruplarından toplanan 884 kişiye ait serum örneklerini çalışmaya alınmıştır. Toplanan serum örneklerinde ANA seropozitifliğinin prevalansını yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, sigara kullanımı, guatr olma, medeni durum, eğitim düzeyi ve obezite durumlarına göre araştırıldı.

Bu çalışmada ANA seropozitifliğini belirlemek amacıyla IF yöntemi kullanılarak çalışmaya alınan 884 serum örneğinden 132'sinde (%14,93) ANA pozitif bulundu.

ANA prevalansını belirlemek için yapılan çeşitli çalışmalarda değişik oranlarda prevalans değerleri elde edilmiştir. Yapılan çalışmalarda ANA prevalans değerleri 1/5 ile 1/80 dilüsyonlarda % 4 ile %22,6 arasında değişim göstermektedir. (54-61).

Hayashi ve ark. (62) Japonya’da Hyogo bölgesinde 5 yıllık süre içinde 2181 kiři üzerinde yaptıkları alıřmada; 1:40 dilüsyonda ANA prevalansını %26 olarak, 1:160 dilüsyonda ise %9,5 olarak tespit etmiřlerdir.

Marin ve ark. (63) Meksika’da 104 kan donörü, 100 saėlık alıřanı ve 100 romatolojik hastalıėı olan toplam 304 kiři üzerinde yaptıkları alıřmada; 1:80 dilüsyonda ANA prevalansını %13,4 olarak, 1:160 dilüsyonda ise %3,2 olarak tespit etmiřlerdir.

Baig ve Shere (54) Suudi Arabistan’da saėlıklı donörlerden ve herhangi bir otoimmün hastalıėı olmayan hastaların serum örneklerinden yaptıkları alıřmada; 1:5 dilüsyonda ANA prevalansını %4,2 tespit etmiřlerdir. Kullandıkları substrat belirtilmemiřtir.

Vlam ve ark. (53) Belika’da saėlıklı kan donörlerinin serum örneklerinde yaptıkları alıřmada 1:80 dilüsyonda ANA prevalansını %13 olarak tespit etmiřlerdir. Buna benzer bir alıřmada Vazquez-Del Mercado ve ark. (64) Meksika popölasyonunda ANA prevalansını %4,7 olarak bildirmiřlerdir.

Satoh ve ark. (61) Amerika Birleřik Devletleri’nde 12 yař ve üzeri 4754 kiřiden elde edilen serum örneklerinde yaptıkları alıřmada 1:80 dilüsyonda ANA prevalansını %13,8 olarak tespit etmiřlerdir.

ANA seropozitifliėinin farklı alıřmalarda bu kadar farklı oranlarda bulunması, serum örneėi alınan kiřilerin yařadıėı yerlerin coėrafi farklılıklarına, genetik özelliklerine, beslenme alışkanlıklarına, kullanılan testlerin uygulanma biimlerine ve laboratuvarın performanslarına göre deėiřiklik gösterebilmektedir.

alıřmamızda il merkezinde yařayan bireylerden elde edilen 541 örnekten 81’i (%14,9) ilçelerde yařayanlardan alınan 343 örnekten 51’i (%14,8) ANA pozitif bulundu. Bu konuda daha kapsamlı alıřmaların kırsal ve kentsel yerleřim yerlerine göre farklılıkları daha iyi yansıtacaėını düşünmekteyiz.

ANA pozitifliklerinin cinsiyetlere göre daėılımlarının deėerlendirilmesinde 453 kadının serum örneėinin 73’ü (%16,1), 431 erkeėin serum örneėinin 59’u (%13,6) ANA pozitif bulundu. Bu alıřmada ANA seropozitifliėi kadınlarda erkeklere oranla biraz

daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Ancak istatistiksel olarak bu yükseklik anlamlı bulunmamıştır ( $p=0,312$ ).

Satoh ve ark. (61) yaptıkları çalışmada ANA prevalansını kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek (kadınlarda %17,8 erkeklerde %9,6) bulmuşlardır.

Hayashi ve ark. (62) yaptıkları çalışmada kadınlardaki ANA prevalansını erkeklere oranla önemli ölçüde yüksek bulmuşlardır. 1:40 dilüsyonda ANA prevalansını erkeklerde %15, kadınlarda %31,7 olarak tespit etmişlerdir. 1:160 dilüsyonda ANA prevalansını ise erkeklerde %4,3, kadınlarda %12,4 olarak tespit etmişlerdir.

Baig and Shere (54) Suudi Arabistan'da yaptıkları çalışmada ANA pozitifliğini kadınlarda erkeklere oranla 4 kat daha fazla tespit etmişlerdir.

Al-Jabri ve ark. (59) Umman'da yaptıkları çalışmada bizim çalışmamızda olduğu gibi ANA pozitifliğini kadınlarda erkeklere göre çok az yükseklikte tespit etmişlerdir.

Otoimmün hastalıkların neden kadınlarda daha yüksek olduğu tam olarak anlaşılamamıştır. Bu yöndeki en önemli görüşler kadınlardaki hormonal farklılıklar üzerine yoğunlaşmıştır (65, 66). 20 yaş altında görülen ANA prevalansının cinsiyet ayrımından bağımsız olduğuna dair görüşler mevcuttur. Bu görüşler bize ANA'ların kadınlarda daha fazla tespit edilmesinin yaşamlarının ilerleyen yıllarında oluşacak otoimmün hastalıklar için zemin hazırlayan faktörlerden birisi olduğu bildirilmektedir (67).

Bu çalışmada ANA pozitifliklerinde yaşa göre dağılımlara bakıldığında 20-29 yaş grubunda 262 örneğin 37'sinde (%14,12), 50-59 yaş grubunda 122 örneğin 19'unda (%15,5) ve 60-69 yaş grubunda 69 örneğin 11'inde (%15,9) ANA pozitifliği tespit edilmiştir. 20-29, 50-59 ve 60-69 yaş gruplarında giderek artan oranlar tespit edilirken 70 yaş ve üzerindeki 55 örnekten sadece 7'si (%12,72) ANA pozitif saptanmıştır. 70 yaş ve üzeri bireylerde immün sistem baskılanmakta ve, bu nedenle antikor üretiminde bir azalma olabilmektedir.

Satoh ve ark.'nın (61) yaptıkları çalışmada ANA prevalansının 50-59 ve 70 yaş üzerinde anlamlı bir şekilde arttığı belirlenmiştir.

Hayashi ve ark. (62) yaptıęı alıřmada ise 20-30 yař aralıęında ANA prevalansı yksek oranda tespit edilirken, 81-93 yař aralıęında ise ANA prevalansında belirgin dřř tespit edilmiřtir.

Bu alıřmada ANA pozitiflięinin sigara kullanımı ile baęlantısına bakıldıęında sigara kullanan 308 kiřinin serum rneklerinden 35'i (%11,36) ANA pozitif olarak tespit edildi. Sigara kullanmayan 484 kiřinin serum rneklerinden 82'si (%16,84) ANA pozitif olarak bulundu. Sigara kullanmıř bırakmıř 92 kiřinin serum rneklerinden 15'i (%16,3) ANA pozitif olarak bulundu. Sigara kullanmaya devam eden gruptaki ANA seropozitiflięinin dřk grlmesi, sigaranın immn sistem zerindeki olumsuz etkilerinin sonucu olabileceęini aklımıza getirmektedir.

Satoh ve ark. (61) yaptıkları alıřmada sigara kullanımının ve sresinin ANA prevalansıyla herhangi bir iliřkisini tespit edememiřlerdir.

Bu alıřmada gelir durumu ile ANA pozitiflięi arasında istatistiksel bir iliřki bulunamamıřtır. Geliri daha fazla olan grupta daha fazla ANA pozitiflik oranı tespit edilse de bu fazlalıęın dikkate alınamayacak dzeyde olduęunu dřnmekteyiz. Gelir durumuyla ANA pozitiflięi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadıęı tespit edilmiřtir.

Eęitim durumu ve medeni durum deęerlendirmeye alındıęında yine her iki grupta istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadıęı saptanmıřtır.

Beden kitle indeksine (BKİ) gre bir deęerlendirme yapıldıęında; BKİ 25 ve zeri hesaplanan 23 kiřiden 3'nde (%13,04) ANA pozitif tespit edildi. BKİ 25'in altında hesaplanan 861 kiřiden 129'unda (%14,98) ANA pozitif olarak tespit edildi. BKİ 25'in altında hesaplanan kiřilerin serum rneklerinde daha fazla oranda ANA pozitiflięi tespit edilmiřtir. Beklenmeyen bu duruma sebep olarak adipoz dokunun proinflamatuvar sitokin ve strojen salgılanması gsterilebilir (68). Obezitenin bazen immn sistemini baskıladıęı ve ANA'nın bu nedenle dřk tespit edildięi de dřnlebilir (69).



Satoh ve ark. (61) yaptıęı alıřmaya gre BKİ 25-30 arasındaki kiřilerde ANA pozitiflięini %12,8, BKİ 30 ve zeri kiřilerde ANA pozitiflięini %12,6, BKİ 25'in altındaki kiřilerde ise %16,5 olarak bildirmiřlerdir.

ANA pozitif olarak saptanan ve benekli boyanma zellięi gsteren 53 serum rneęi anti-ENA antikorlarını belirlemek amacıyla alıřmaya alındı. Bu amala immnblot testleri uygulanarak anti-ENA antikorları belirlendi. alıřmaya alınan serum rneklerinden  tanesinde herhangi bir anti-ENA antikoru tespit edilemedi, dięer elli rnekte anti-ENA antikorlarına ait spesifik bantlar elde edildi. Homojen ve benekli boyanma paterni gsteren bir rnekte sadece anti-Jo-1 bantında pozitiflik saptandı, dięer tm rneklerde beklendięi gibi nRNP/Sm, Sm, SS-A/Ro, Ro-52, SS-B/La antijenlerine ait antikor bantları tespit edildi. Bu alıřmada en fazla Ro52 antijen bantı tespit edilmiřtir. Bu antijenlere karřı oluřan antikorlar eřitli otoimmn hastalıklarda tespit edilmektedirler. Bunlardan en nemlileri SLE, sjgren sendromu, ilaca baęlı lupus, PM-DM sayılabilir. Burada tespit edilen anti-ENA antikorlarına ait bantlar tespit edilen kiřilerde otoimmn hastalık oluřması ynnden erken uyarı belirteci ynnden yardımcı olabileceęini dřnmekteyiz. Ancak tespit edilen btn antikorlar her zaman hastalık oluřturmayacaęı akıldan ıkarılmamalıdır.

Satoh ve ark. (61) yaptıkları alıřmaya gre ABD toplumunda en yaygın bulunan ENA antikoru Ro52 antijenine ynelik oluřan antikorlar olarak bildirilmektedir.

Marin ve ark. (69) yaptıęı alıřmaya gre; ANA pozitif olarak bulunan rneklerin %50,3' benekli patern boyanmıřtı.

Sonuç olarak blgemizde ANA seropozitiflięi olduka yksek olduęu tespit edilmiřtir. zellikle klinik bulguları olan hastalarda ANA tarama testlerinin yapılması, ANA testinde benekli patern grlen rneklerin anti-ENA antikorları ynnden test edilmesi gerektięi sonucuna varılmıřtır.

## 8. KAYNAKLAR

1. Davidson A, Diamond B (2001). Autoimmune Diseases. New England Journal of Medicine 345(5):340-350.
2. Harrison TR, Fauci AS, Langford CA (2006). Harrison's rheumatology. McGraw-Hill Professional çev. ed. Soy M. (2007) nobel tıp kitabevi 59-66.
3. Silverstein A, Rose N (2000). There is only one immune system. The view from immunopathology. Semin Immunol 12: 173 and 257-178 and 344.
4. Li QZ, Karp DR, Quan J, Branch VK, Zhou J, Chong YLBF, Wakeland EK and Olsen. NJ (2011) Risk factors for ANA positivity in healthy persons. Arthritis Research & Therapy, 13:R38.
5. Braun-Falco O, Plewig G, Wolf H.H, Burgdorf WHC, Landthaler M (2005). Dermatologie und Venerologie. 5. Auflage. Springer, Heidelberg. 1493-1498.
6. Vollmar A, Dingermann T (2005). Immunologie Grundlagen und Wirkstoffe. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH. Stuttgart. ISBN3-8047-2189-3.
7. Rose N (1997). Autoimmune Diseases: tracing the shared threads. Hosp Pract 32: 147.
8. Jacobson D, Gange S, Rose N, Graham N (1997). Epidemiology and estimated population burden of selected autoimmune diseases in the United States. Clin Immunol Immunopathol 84: 223-243.
9. Sinha A, Lopez M, McDevitt H (1990). Autoimmune diseases: The failure of self tolerance. Science 248: 1380-1388.
10. Abdul K Abbas, Andrew H Lichtman (çev. ed.; Y. Camcıoğlu, G. Deniz). Temel İmmünoloji, İstanbul Medikal Yayıncılık 2007.
11. Hörster I, Hirose R, Arbeit J, Clausen BE, Hanahan D (1995). Limited capacity for tolerization of CD4+ T-cells specific for a pancreatic beta cell neo-antigen. Immunity 2: 573-585.
12. Goodnow C, Crosbie J, Adelstein S (1988). Altered immunoglobulin expression and functional silencing of self-reactive B lymphocytes in transgenic mice. Nature 334 (676): 682.
13. Kamradt T, Mitchison N (2001). Tolerance and Autoimmunity. New England Journal of Medicine 344 (9): 655-66.

14. Nemazee D, Burki K (1989). clonal deletion of B lymphocytes in a transgenic mouse bearing anti-MHC class I antibody genes. *Nature* 337: 562-566.
15. Rathmell J, Townsend S, Xu J, Flavell R, Goodnow C (1996). Expansion or elimination of B cells in vivo: dual roles for CD40- and Fas(CD95)-ligands modulated by the B cell antigen receptor. *Cell* 87: 319-329.
16. Kelly W, Harris EJ, Ruddy S, Sledge C (1997). Genetic analysis of rheumatic diseases. *Textbook of Rheumatology* 5th ed. Vol.1. Philadelphia: WB Saunders: 209-227.
17. Kukreja A, Maclaren N (1999). Autoimmunity and Diabetes. *Journal of Clinical Endocrinol Metab* 84: 4371-4378.
18. Ortonne J (1999). Recent developments in the understanding of the pathogenesis of psoriasis. *Br Journal Dermatol* 140: Suppl 54: 1-7.
19. Kumar P, Laloraya M, She J (2002). Population genetics and functions of the autoimmune regulator (AIRE). *Endocrinol Metab Clin North Am* 31: 321-338.
20. Pearce S, Cheetham T, Imrie H (1998). A common and recurrent 13-bd deletion in the autoimmune regulator gene in British kindreds with autoimmune polyendopathy type 1. *Am J Hum Genet* 63: 1675-1684.
21. Scott H, Heino M, Peterson P (1998). Common mutations in autoimmune polyendocrinopathycandiasis-ectodermal dystrophy patients of different origins. *Mol Endocrinol* 12: 1112-1119.
22. Tiwari JL, Terasaki PI (1985). HLA and disease associations. Springer-Verlag, New York. 18-27.
23. Albert LJ, Inman RD (1999). Molecular mimicry and autoimmunity, *N Engl J Med*. Dec 30; 341 (27): 2068-74.
24. Dahlquist G (1998). The aetiology of type I diabetes: an epidemiological perspective. *Acta Paediatr Suppl* 425: 5-10.
25. Noseworthy J, Luccinetti C, Rodriguez M, Weinshenker B (2000). Multiple sclerosis. *New England Journal of Medicine* 343: 938-952.
26. Galvin J, Hemric M, Ward K, Cunningham M (2000). Cytotoxic Ab from rheumatic carditis recognizes heart valves and laminin. *J Clin Invest* 106: 217-224.

27. Guilherme L, Cunha Neto E, Coelho V (1995). Human heart-infiltrating T cell clones from rheumatic heart disease patients recognize both streptococcal and cardiac proteins. *Circulation* 92: 415-420.
28. Malkiel S, Liao L, Cunningham M, Diamond B (2000). T cell dependent antibody response to the dominant epitope of streptococcal polysaccharide, N-acetylglucosamin, is cross-reactive with cardiac myosin. *Infect Immun* 68: 5803-5808.
29. Rocco A, Gargano S, Provenzano A (2001). Incidence of autoimmune thyroiditis in interferon alpha treated and untreated patients with chronic hepatitis C virus infection. *Neuroendocrinol Lett* 22: 39-44.
30. Dieterich W, Ehnis T, Bauer M (1997). Identification of tissue transglutaminase as the autoantigen of celiac disease. *Nat Med* 3: 797-801.
31. Cutolo M, Villaggio B, Foppiana L, Briata M, Sulli A, Pizzorni C (2000). The hypothalamic-pituitary-adrenal and gonadal axes in rheumatoid arthritis. *Ann N Y Acad Sci* 917: 835-843.
32. Fernandez MF, Mattioli M (1976). Antinuclear antibodies: immunologic and clinical significance. *Seminars in arthritis and Rheum* 6 (2), 83-124.
33. Tan EM, Kunke HG (1966). Characteristics of a soluble nuclear antigen precipitating with sera of patients with systemic lupus erythematosus. *J Immunol* 96: 464.
34. Yashwant K, Alka B, Ranjana Walker M (2009). Antinuclear antibodies and their detection methods in diagnosis of connective tissue diseases: a journey revisited. *Diagn Pathol*. 4: 1.
35. Rondeel JM (2002). Immunofluorescence versus elisa for the detection of antinuclear antigens. *Exp Rev Mol Diagn* 2: 226-232.
36. Friou CJ (1957). Clinical application of lupus serum nucleoprotein reaction using fluorescent antibody technique. *J Clin Invest* 36: 890-897.
37. Bigazzi P, Rose N. *Methods in immunodiagnosis*, Center of immunology State University of New York at Buffalo, John Wiley and Sons. 107-108.
38. Sack U, Conrad K, Csernok E, Frank I, Hiepe F, Krieger T, Kromminga A, Von Landenberg P, Messer G, Witte T (2009) Contemporary Challenges in Autoimmunity: *Ann. N.Y. Acad. Sci* 1173: 166–173.

39. Lightfoote MM, Chirmule N, Homburger HA, Kavanaugh A, Nakamura RM, Papisch W, Tetin SY (2006). Quality Assurance of Laboratory Tests for Autoantibodies to Nuclear Antigens: (1) Indirect Fluorescence Assay for Microscopy and (2) Microtiter Enzyme Immunoassay Methods; Approved Guideline-Second Edition. CLSI Volume 26: Number 13.
40. Cook L (1998). New methods for detection of anti-nuclear antibodies. Clin Immunopathol 88: 211-220.
41. Saitta MR, Keene JD (1992). Molecular biology of nuclear antigens. Rheum Dis Clin North Am 18: 283-310.
42. Evans J (1998). Antinuclear antibody testing in systemic autoimmune disease. Clin Chest Med 19: 613-625.
43. Ghosh P, Dwivedi S, Naik S, Agarwal V, Verma A, Aggarwal A, Misra R (2007). Antinuclear antibodies by indirect immunofluorescence: Optimum screening dilution for diagnosis of systemic lupus erythematosus. Indian J Med Res 126: 34-38.
44. Kiuttu J, Hartikainen A, Makitalo R (1994). Occurrence of antinuclear antibodies in an unselected pregnancy population. Gynecol Obstet Invest 37: 160-163.
45. Goldsby RA, Kindt TJ, Osborne BA & Kuby (2003). J. Enzyme Linked Immunosorbent Assay. In: Immunology 5th ed WH Freeman, New York. 148-150
46. Charles PJ, Van Venrooij WJ, Maini RN (1992). and the Consensus Finding Group for Autoantibodies. The consensus workshops for the detection of auto antibodies to intracellular antigens in rheumatic diseases 1989–1992. Clin Exp Rheum 10: 507-511.
47. Siracusano A, Agelli M, Ioppolo S (1985). Detection of antiextractable nuclear antigens in connective tissue diseases: comparison between passive haemagglutination, counter immunoelectrophoresis and double immunodiffusion Ric. Clin Lab 15: 3338.
48. Zampieri S, Ghirardello A, Doria A, Tonello M, Bendo R, Rossini K, Gamberi PF (2000). The use of Tween 20 in immunoblotting assays for the detection of autoantibodies in connective tissue diseases. J Immunol Meth 239: 1–11.
49. Us AD (2006). Serolojik Tanı Yöntemleri. Hacettepe üniversitesi yayınları sayfa 43.

50. Von Mühlen CA, Tan EM (1995). Autoantibodies in the diagnosis of systemic rheumatic diseases. *Semin Arthritis Rheum* 24 (5): 323-58.
51. Sawalha AH, Harley JB (2004). Antinuclear autoantibodies in systemic lupus erythematosus. *Curr Opin Rheumatol* 16: 534-540.
52. James K, Meek G (1992). Evaluation of commercial enzyme immunoassays compared to immunofluorescence and double diffusion for autoantibodies associated with autoimmune diseases. *Am J Clin Pathol* 97: 559-565.
53. De Vlam K, De Keyser F, Verbruggen G (1993). Detection and identification of antinuclear autoantibodies in the serum of normal blood donors. *Clin Exp Rheumatol* 11 (4): 393-7.
54. Baig MM, Shere SJ (1989). Prevalence of autoantibodies in Saudi population. *J Med* 20 (3,4): 286-90.
55. Manoussakis MN, Tzioufas AG, Silis MP (1987). High prevalence of anti cardiolipin and other autoantibodies in a healthy elderly population. *Clin Exp Immunol* 69 (3): 557-65.
56. Goemaere S, Ackerman C, Ghoethals K (1990). Onset of symptoms of rheumatoid arthritis and relation to age, sex and menopausal transition. *J Rheumatol* 17 (12): 1620-2.
57. Azizah MR, Shahnaz M, Zulkifli MN (1955). Anti-nuclear, antimitochondrial, anti-smooth muscle and anti-parietal cell antibodies in the healthy Malaysian population. *Malays J Pathol* 17 (2): 83-6.
58. Fernandez S (2003). Prevalence of antinuclear autoantibodies in the serum of normal blood donors. *Rev Hosp Clín Fac Med S Paulo* 58 (6): 315-319.
59. Al Jabri AA, Al Belushi MS, Nsanze H. Frequency and levels of otoantibodies in healthy adult Omani, *Annals of Saudi Medicine* 234.
60. Smikle MF, James OB (1994). Seroprevalence of autoantibodies in selected and unselected populations in Jamaica. *West Indian Med J* 43: 59-62.
61. Satoh M, Chan EK, Ho LA, Rose KM, Parks CG, Cohn RD, Jusko TA, Walker NJ, Germolec DR, Whitt IZ, Crockett PW, Pauley BA, Chan JY, Ross SJ, Birnbaum LS, Zeldin DC, Miller FW (2012). Prevalence and sociodemographic correlates of antinuclear antibodies in the United States. *Arthritis Rheum.* 64 (7): 2319-27.

62. Hayashi N, Koshiha M, Nishimura K, Sugiyama D, Nakamura T, Morinobu S, Kawano S, Kumagai S (2008). Prevalence of disease-specific antinuclear antibodies in general population: estimates from annual physical examinations of residents of a small town over a 5-year period. *Mod Rheumatol* 18 (2): 153-60. Epub 2008 Feb 19.
63. Marin GG, Cardiel MH, Cornejo H, Viveros ME (2009). Prevalence of antinuclear antibodies in 3 groups of healthy individuals: blood donors, hospital personnel, and relatives of patients with autoimmune diseases. *J Clin Rheumatol* Oct;15(7):325.
64. Vazquez Del Mercado M, Gonzalez Bernaldez M, Garcia De LaTorre I (1995). Prevalence of antinuclear antibodies in a Huichol population of Mexico. *Lupus* 4 (2): 164-5.
65. Grimaldi CM (2006). Sex and systemic lupus erythematosus: the role of the sex hormones estrogen and prolactin on the regulation of autoreactive B cells. *Curr Opin Rheumatol* 18: 456–61.
66. Oliver JE, Silman AJ (2009). Why are women predisposed to autoimmune rheumatic diseases? *Arthritis Res Ther* 11:252.
67. Craig WY, Ledue TB, Johnson AM, Ritchie RF. The distribution of antinuclear antibody titers in “normal” children and adults. *J Rheumatol* 1999;26:914–9.
68. Cleary MP, Grossmann ME (2009). Obesity and breast cancer: the estrogen connection. *Endocrinology* 150: 2537–42.
69. Gonzalez DA, De Leon AC, Rodriguez Perez MC, Coello SD, Gonzalez Hernandez A, Fuentes RC (2008). Inverse association between obesity and antinuclear antibodies in women. *J Rheumatol* 35: 2449–51.