

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ULTRAHİPERBOLİK TÜRDEN KİSMİ TÜREVLİ DENKLEMLER İÇİN
BİR TERS PROBLEM

MATEMATİK ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

BÜŞRA BERİL YILDIRIM

TEMMUZ 2019

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ULTRAHİPERBOLİK TÜRDEN KİSMİ TÜREVLİ DENKLEMLER İÇİN
BİR TERS PROBLEM

MATEMATİK ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Büşra Beril YILDIRIM

DANIŞMAN: Doç. Dr. Fikret GÖLGELEYEN

ZONGULDAK
Temmuz 2019

KABUL:

Büşra Beril YILDIRIM tarafından hazırlanan “Ultrahiperbolik Türden Kısmi Türevli Denklemler İçin Bir Ters Problem” başlıklı bu çalışma jürimiz tarafından değerlendirilerek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak oybirliğiyle kabul edilmiştir. 10/07/2019

Danışman: Doç. Dr. Fikret GÖLGELEYEN

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü



Üye: Prof. Dr. Yüksel SOYKAN

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü



Üye: Doç. Dr. Tufan TURACI

Karabük Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü



ONAY:

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

..../..../2019



Prof. Dr. Ahmet ÖZARSLAN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

“Bu tezdeki tüm bilgilerin akademik kurallara ve etik ilkelere uygun olarak elde edildiğini ve sunulduğunu; ayrıca bu kuralların ve ilkelerin gerektirdiği şekilde, bu çalışmadan kaynaklanmayan bütün atıfları yaptığımı beyan ederim.”

Büşra Betül YILDIRIM

ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

ULTRAHİPERBOLİK TÜRDEN KİSMİ TÜREVLİ DENKLEMLER İÇİN BİR TERS PROBLEM

Büşra Beril YILDIRIM

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Matematik Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fikret GÖLGELEYEN

Temmuz 2019, 63 sayfa

Bu tezde ultrahiperbolik türden bir kısmi türevli denklem Cauchy başlangıç şartları ile birlikte ele alınmıştır. Çözüm hakkında verilen ek bilgi yardımıyla bu denklemdeki bir katsayının bulunması ters probleminin çözümünün tekliği araştırılmıştır. Bu amaçla tezin birinci bölümünde, sonraki bölümler için gerekli temel tanım ve teoremlere yer verilmiştir. İkinci bölüm bazı yardımcı önermelere ayrılmış, son bölümde ise çözümünün tekliği ile ilgili bir teorem sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ultrahiperbolik denklem, ters problem, çözümün tekliği

Bilim Kodu: 403.06.00.



ABSTRACT

M. Sc. Thesis

AN INVERSE PROBLEM FOR ULTRAHYPERBOLIC TYPE PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

Büşra Beril YILDIRIM

**Zonguldak Bülent Ecevit University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Mathematics**

Thesis Advisor: Assoc. Prof. Dr. Fikret GÖLGELEYEN

July 2019, 63 pages

In this thesis, an ultrahyperbolic type partial differential equation is considered with some Cauchy initial data. By using the given additional data on the solution, uniqueness of solution of an inverse problem of determining one of the coefficients in the equation is investigated. For this purpose, in the first section some basic definitions and theorems which are needed in the succeeding sections are given. Section 2 is devoted to some auxiliary lemmata. In the last section, a theorem related to the uniqueness of solution of the problem is presented.

Keywords: Ultrahyperbolic equation, inverse problem, uniqueness of solution.

Science Code: 403.06.00.



TEŞEKKÜR

Tez çalışmam sırasında kıymetli bilgi, birikim ve tecrübeleri ile beni yönlendiren ve destek olan değerli danışman hocam Doç. Dr. Fikret GÖLGELEYEN'e, sonsuz teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Çalışmalarım boyunca maddi manevi destekleriyle her zaman yanımda olan aileme de teşekkürlerimi bir borç bilirim.





İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
KABUL	ii
ÖZET.....	iii
ABSTRACT	v
TEŞEKKÜR.....	vii
İÇİNDEKİLER.....	ix
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.....	xi
BÖLÜM 1 ÖN BİLGİLER	1
1.1 GİRİŞ.....	1
1.2 TEMEL TANIM VE TEOREMLER	4
BÖLÜM 2 BAZI YARDIMCI ÖNERMELER	7
2.1 LEMMA 1	7
2.2 LEMMA 2	34
2.3 LEMMA 3	41
BÖLÜM 3 ULTRAHİPERBOLİK DENKLEM İÇİN BİR TERS PROBLEM	47
3.1 SONUÇ.....	59
KAYNAKLAR.....	61
ÖZGEÇMİŞ	63



SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

SİMGELER

Ω	: Verilen bir bölge
Ω_γ	: Oluşturulan alt bölge
$\bar{\Omega}$	: Ω bölgesinin kapanışı
$\partial\Omega$	: Ω bölgesinin sınırı
$C^k(\Omega)$	: Ω bölgesinde tanımlı k . mertebeye kadar sürekli kısmi türevlere sahip fonksiyonlar uzayı
χ	: Ağırlık fonksiyonu
δ_{ij}	: Kronecker deltası
$sgn(x)$	: İşaret fonksiyonu
$\ u\ _{C^1(\bar{\Omega})}$	: $C^1(\bar{\Omega})$ uzayında norm
λ, ν	: Büyük Parametreler
d_i	: Divergent terimler, $i = 0,1,2,3,4$



BÖLÜM 1

ÖN BİLGİLER

1.1 GİRİŞ

Bu çalışmada bir

$$\Omega \subset \{x, y : x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m, x_1 > 0\}$$

bölgesinde

$$\sum_{i=1}^n u_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{j=1}^m u_{y_j y_j} + \sum_{i=1}^n a_i(x) u_{x_i} + \sum_{j=1}^m b_j(y) u_{y_j} + a_0(x, y') u = f(x, y) \quad (1.1)$$

ultrahiperbolik denklemi $u(0, 'x, y) = u_0$, $u_{x_1}(0, 'x, y) = u_1$ koşulları ile birlikte ele alınacaktır. Verilen bir ek bilgi yardımıyla (1.1) denkleminin bir katsayısının bulunması ters probleminin çözümünün tekliği araştırılmıştır.

Bilindiği üzere ikinci mertebeden iki değişken içeren bir lineer kısmi türevli denklem

$$au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} + du_x + eu_y + fu = g \quad (1.2)$$

formunda yazılabilir. Eğer u_{xx} , u_{xy} , u_{yy} , u_x , u_y fonksiyonları için sırasıyla $\alpha^2, \alpha\beta, \beta^2, \alpha, \beta$ gösterimleri kullanılırsa (1.2) denklemi için α ve β ' ya bağlı ikinci dereceden bir polinom elde edilir:

$$P(\alpha, \beta) = a\alpha^2 + 2b\alpha\beta + c\beta^2 + d\alpha + e\beta + f.$$

(1.2) denkleminin çözümünün matematiksel özellikleri büyük oranda $P(\alpha, \beta)$ polinomu-
nun cebirsel özellikleri tarafından belirlenir. $P(\alpha, \beta)$ ve onunla birlikte (1.2) denklemi
 $b^2 - ac$ diskriminantının pozitif, sıfır veya negatif olmasına göre sırasıyla hiperbolik,
parabolik veya eliptik olarak sınıflandırılır. Dikkat edilirse (1.2) denkleminin tipi onun
esas kısmı yani u 'nun en yüksek mertebeden türevlerini içeren terimler tarafından belir-
lenir ve bu sınıflandırma a , b ve c katsayıları sabit olmadıkça xy düzleminde noktaya bağlı
olarak değişir (Duchateau and Zachmann 1986).

Daha genel olarak ikinci mertebeden n deęişkenli bir lineer kısmi türevli denklem

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n a_i(x)u_{x_i} + a(x)u = f(x) \quad (1.3)$$

şeklinde ifade edilebilir. Eğer $u_{x_i x_j} = u_{x_j x_i}$ ise (1.3) denkleminin esas kısmı $a_{ij} = a_{ji}$ olacak şekilde düzenlenebilir. Bu nedenle $A = [a_{ij}]$ matrisi simetrik olarak kabul edilebilir. Lineer cebirden bilinmektedir ki her reel simetrik $n \times n$ tipindeki matrisin n tane reel özdeęeri vardır. Bu özdeęerler, I ; $n \times n$ tipinde birim matris olmak üzere $\det(A - \lambda I)$ nın yani n .dereceden bir polinomunun kökleridir. Kabul edelim ki x^0 alışılan bölgedeki keyfi bir nokta olsun. Pozitif özdeęerlerin sayısını $n_+ = n_+(x^0)$, negatif özdeęerlerin sayısını $n_- = n_-(x^0)$ ve sıfır özdeęerlerinin sayısını $n_0 = n_0(x^0)$ ile gösterelim. Burada $n = n_+ + n_- + n_0$ olduęu açıktır.

Eğer $n_+ = n$ veya $n_- = n$ ise (1.3) denklemi x^0 noktasında eliptik tiptendir denir. $\mathbb{R}^n$ de eliptik denkleme örnek olarak

$$\Delta u = f$$

Poisson denklemi verilebilir. Burada $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$ şeklinde tanımlı olup Laplace operatörü olarak adlandırılır.

Eğer $n_+ = n - 1$ ve $n_- = 1$, veya eęer $n_+ = 1$ ve $n_- = n - 1$ ise (1.3) denklemi x^0 noktasında hiperbolik tiptendir denir. $\mathbb{R}^n$ de hiperbolik denkleme örnek olarak

$$u_{x_1 x_1} + \dots + u_{x_{n-1} x_{n-1}} - u_{x_n x_n} = f$$

dalga denklemi verilebilir. Daha basit olarak xt düzleminde

$$u_{tt} - u_{xx} = f$$

bir boyutlu dalga denklemi örnek olarak gösterilebilir.

Eğer $n_0 = 0$ ve $1 < n_+ < n - 1$ ise (1.3) denklemi x^0 noktasında ultrahiperbolik tiptendir denir. $\mathbb{R}^4$ de ultrahiperbolik denkleme örnek olarak

$$u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} - u_{x_3 x_3} - u_{x_4 x_4} = f(x)$$

verilebilir.

Eğer $n_0 > 0$ ise (1.3) denklemi x^0 noktasında parabolik tiptendir denir. Bütün $\mathbb{R}^n$ de parabolik olan bir denkleme örnek olarak

$$u_{x_1 x_1} + \dots + u_{x_{n-1} x_{n-1}} - u_{x_n} = f(x)$$

ısı denklemi verilebilir.

Açıktır ki a_{ij} katsayılarından herhangi biri sabit değil ise (1.3) denkleminin tipi noktaya bağlı olarak değişecektir (Mikhailov 1978).

Hiperbolik kısmi türevli denklemler fiziksel olarak bir zaman boyutu içermekte olup doğada cereyan eden bir çok olayın matematiksel modelinin oluşturulmasında kullanılmaktadır. Bu denklemlerin zamansal olarak çok boyut içeren bir teoriye genelleştirilmesi ultrahiperbolik denklemlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Çok boyutlu zaman kavramı günümüze kadar fizikçilerin ve buna bağlı olarak matematikçilerin genel olarak uzak durduğu bir kavram olmuştur. Bunun temel nedeni çok boyutlu zaman kavramının klasik fizikteki bazı temel ilkeleri ihlal etmesidir. Buna örnek olarak belirleyicilik (determinizm) ilkesi verilebilir. Daha açık bir ifade ile zamanın çok boyutlu olması matematiksel olarak düzlemde kapalı bir eğrinin oluşmasına ve böylece zamanda ileri veya geri gidilebilmesine neden olacaktır. Bu durum ise meşhur dede paradoksunda (grandfather paradox) ifade edildiği gibi geçmiş zamanda geleceği etkileyebilecek değişiklikler yapılabilmesine yani neden sonuç zincirinin kırılmasına sebep olacaktır.

Diğer yandan, başta sicim (string) kuramı olmak üzere modern fizik kuramlarında ortaya çıkan gelişmeler klasik mekanik ve kuantum mekaniğini birleştirebilecek ve herşeyin teorisi olabilecek (theory of everything) bir teorinin oluşturulabilmesi için ek boyutlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu ise ultrahiperbolik denklemlere olan ilgiyi arttırmıştır.

Ultrahiperbolik denklemler için bazı direkt problemler zaman ve uzay boyutunun özel durumları için Kostomarov (2002, 2006) tarafından incelenmiştir. Çözümün tekliğine ilişkin önemli sonuçlar Burskii ve Kirichenko (2008), Diaz ve Young (1971), Hörmander (1976), Owens (1947) tarafından elde edilmiştir. Son olarak, Craing ve Weinstein (2009) sınırsız bir bölgede ultrahiperbolik denklem için bir direkt problemin yerel olarak çözülebilir olduğunu göstermiştir. Ancak ters problemlerle ilgili sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Ultrahiperbolik denklem için bazı ters problemlerin çözümlerinin tekliği ve kararlılığı Klivanov ve Bukhgeim (1981), Amirov (2001) ve Gölgeleyen ve Yamamoto (2014) de araştırılmıştır.

1.2 TEMEL TANIM VE TEOREMLER

Tanım 1.1 ($C^m(\Omega)$ Uzayı) $\Omega, \mathbb{R}^n$ uzayında bir bölge olsun. Her negatif olmayan m tamsayısı için $|\alpha| \leq m$ olmak üzere $D^\alpha \varphi$ kısmi türevleri Ω bölgesinde sürekli olacak şekilde tüm φ fonksiyonlarının oluşturduğu vektör uzayı $C^m(\Omega)$ ile gösterilir (Adams and Fournier 2003, s. 10).

Tanım 1.2 (Direkt Problem) Matematiksel fizikte denklem, bölge ve koşullar verildiğinde denklemi ve koşulları sağlayan bir çözümün bulunmasına direkt problem denir (Amirov 2001).

Tanım 1.3 (Ters Problem) Pratikte karşılaşılan öyle problemler vardır ki, bunların çözümleri için ayrıca ek bilgiye gerek duyulur. Verilen bu ek bilgiye göre denklemin bir veya birkaç katsayısının veya sağ tarafının ya da sınır koşullarından bir veya birkaçını denklemin çözümü ile birlikte bulmak gerekir. Böyle problemlere ters problem adı verilir (Amirov 2001).

Tanım 1.4 (Hadamard Anlamında İyi ve Kötü Konulmuş Problemler) Fransız matematikçi J. S. Hadamard "İyi konulmuş problem" tanımını 20. yüzyılın başlarında aşağıdaki şekilde vermiştir.

Kabul edelim ki U ve F metrik uzaylar, ve $A : U \rightarrow F$ bir operatör olsun

$$Au = f. \quad (1.4)$$

(1.4) denkleminin aşağıdaki koşulları sağlayan çözümünün bulunması problemine (U, F) uzay çifti için Hadamard anlamında iyi konulmuş problem adı verilir:

i) **Varlık:** Her $f \in F$ için U uzayında problemin çözümü vardır.

ii) **Teklik:** Problemin çözümü U uzayında tektir.

iii) **Kararlılık:** Problemin koşulları F uzayında az değiştiğinde problemin çözümü de U uzayında az değişir (kararlılık koşulu) (Lavrent'ev et al. 1986). Bu şartlardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda problem, (U, F) uzay çifti için Hadamard anlamında kötü konulmuş problem olarak adlandırılır. Bir (U_1, F_1) uzay çifti için iyi, başka bir (U_2, F_2) uzay çifti için kötü konulmuş probleme (U_2, F_2) uzay çifti için zayıf kötü konulmuş problem denir. Tüm uzay çiftlerinde kötü konulmuş probleme kuvvetli kötü konulmuş problem denir.

Hadamard'a göre kötü konulmuş problemler, reel fiziksel anlamı olan pratik olayların tasvirinde kullanılamaz. Çünkü pratikte elde edilen veriler her zaman belirli bir hata payı içerir. Eğer problemin çözümü kararlı değil ise bu hatalı veriler yardımıyla bulunan çözüm, kesin çözümünden çok farklı olabilir ve bu da yanlış sonuçların elde edilmesine yol açar. Bu nedenle başlangıçta birçok matematikçi sadece Hadamard anlamında iyi konulmuş problemlerle ilgilenmiştir. Ancak sonraki süreçte doğada ortaya çıkan birçok problemin kötü konulmuş problem olduğunun görülmesi matematikçilerin bu problemlerle ilgilenmesine sebep olmuştur. Bu çerçevede Hadamard'ın kendisinin örnek olarak gösterdiği Laplace denklemi için Cauchy problemi de kötü konulmuş bir problem olup elektromanyetik teori de önemli bir model olarak ortaya çıkmaktadır (Petrovskii 1967).

Tanım 1.5 (Tikhonov Anlamında İyi ve Kötü Konulmuş Problemler)

İlk olarak Rus matematikçi A. N. Tikhonov, Hadamard anlamında kötü konulmuş problemlerin gerekliliğini ortaya koymuştur. (1.4) denkleminin aşağıdaki koşulları sağlayan çözümünün bulunması problemine Tikhonov anlamında iyi konulmuş problem adı verilir:

i) *U bir metrik uzay olmak üzere, problemin çözümü var ve belirli bir $M \subset U$ cümlesine aittir.*

ii) *Problemin çözümü M de tektir.*

iii) *Problemin çözümü M de koşullara sürekli bağımlıdır (Lavrent'ev et al. 1986).*

M cümlesine problemin doğruluk cümlesi denir ve M genellikle kompakt bir cümle olarak seçilir.

Ters ve kötü konulmuş problemler teorisi bilim ve teknolojinin birçok alanında sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Bu alanlara örnek olarak, astronomi, kuantum mekaniği, elektrodinamik, tıbbi ve teknik tomografi, ultrason, optimal kontrol teorisi ve finans matematiği verilebilir (Kabanikhin 2008, Ramm 2010).

Uyarı 1.1 Aşağıdaki bölümlerde

$$\Omega_\gamma = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m, x_1 > 0, 0 < \psi < \gamma\},$$

$$\psi(x) = \delta x_1 + \frac{1}{2} \sum_{i=2}^n (x_i - x_i^0)^2 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m (y_j - y_j^0)^2 + \alpha_0; \quad \chi = \exp(\lambda \psi^{-\nu}),$$

$\alpha_0 > 0, \gamma + \alpha_0 = n < 1, \alpha_0 < \psi(x) < n$ tanımlamaları kullanılmıştır.



BÖLÜM 2

BAZI YARDIMCI ÖNERMELER

Bu bölümde, ele alınan ters problemin çözümünün tekliğinin ispatında kullanılacak olan 3 tane lemma verilecektir. (1.1) denkleminin $\tilde{x}_1 = \sqrt{2x_1} - \delta_0$ dönüşümü uygulanır ve basitlik açısından aynı gösterimler kullanılırsa denklem aşağıdaki forma indirgenebilir:

$$\begin{aligned} & (x_1 + \delta_0)^{-1} u_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n u_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{j=1}^m u_{y_j y_j} \right) \\ & + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=1}^n a_i u_{x_i} + \sum_{j=1}^m b_j u_{y_j} + a_0(x, y') u \right) = f(x, y). \end{aligned}$$

Lemma 2.1 *Kabul edelim ki $\forall \xi \in \mathbb{R}$ ve $x \in \Omega$ için*

$$-\sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \xi_{y_k}^2 \geq \alpha_1 |\xi|^2, \quad \alpha_1 > 0 \quad (2.1)$$

eşitsizliği sağlansın. Eğer λ ve δ parametreleri bir pozitif sabitten büyük ve γ sayısı

$$0 < \gamma < \frac{4}{3} (M m \varepsilon_0^{-1} + 3mM) < 1 \quad (2.2)$$

şartını sağlıyor ise her $\varphi(x) \in C^2(\Omega)$ için aşağıdaki eşitsizlik yazılabilir:

$$\begin{aligned} & \psi^{\nu+1} \left((x_1 + \delta_0)^{-1} \varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k y_k} \right) \right)^2 \chi^2 \\ & \geq 2\lambda\nu\delta (x_1 + \delta_0)^{-3} \varphi_{x_1}^2 \chi^2 - 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 G_o(n, m) \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2 \chi^2 \\ & \quad + \lambda\nu\delta\alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 + 2\lambda^3\nu^4\delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \varphi^2 \chi^2 \\ & \quad + G(\lambda, \delta) \varphi^2 \chi^2 + d_0(\varphi\chi) + d_1(\varphi\chi) \end{aligned} \quad (2.3)$$

Burada $0 < \varepsilon_0 < \frac{a_1}{4m}$, $\sqrt{2\gamma} < 1$ şeklinde tanımlıdır ve

$$\begin{aligned} G(\lambda, \delta) = & 2\lambda\nu\delta (x_1 + \delta_0)^{-3} \left(-\lambda^2\nu^2\psi_{x_1}^2 \psi^{-2\nu-2} - \lambda\nu(\nu+1) \psi_{x_1}^2 \psi^{-\nu-2} \right) \\ & + 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 G_o(n, m) \sum_{i=2}^n \left(\lambda^2\nu^2\psi_{x_i}^2 \psi^{-2\nu-2} + \lambda\nu(\nu+1) \psi_{x_i}^2 \psi^{-\nu-2} \right. \\ & \quad \left. - \lambda\nu\psi^{-\nu-1} \psi_{x_i x_i} \right) - \lambda\nu\delta\alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \left(\lambda^2\nu^2\psi_{y_k}^2 \psi^{-2\nu-2} \right. \\ & \quad \left. + \lambda\nu(\nu+1) \psi_{y_k}^2 \psi^{-\nu-2} - \lambda\nu\psi^{-\nu-1} \psi_{y_k y_k} \right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& d_0(\vartheta) \\
= & 2\lambda\nu\delta\left((x_1+\delta_0)^{-2}\vartheta_{x_1}^2\right)_{x_1} + 4\lambda\nu\delta\sum_{i=2}^n(\vartheta_{x_1}\vartheta_{x_i})_{x_i} \\
& -2\lambda\nu\delta\sum_{i=2}^n(\vartheta_{x_i}^2)_{x_1} - 4\lambda\nu\delta\sum_{k=1}^m(c^2\vartheta_{x_1}\vartheta_{y_k})_{y_k} \\
& +2\lambda\nu\delta\sum_{k=1}^m(c^2\vartheta_{y_k}^2)_{x_1} \\
& +2\lambda\nu\delta^3\left((x_1+\delta_0)^{-2}(\lambda^2\nu^2\psi^{-2\nu-2}-\lambda\nu(\nu+1)\psi^{-\nu-2})\vartheta^2\right) \\
& +2\lambda\nu\delta\sum_{i=2}^n\left(\left((\lambda^2\nu^2\psi^{-2\nu-2}\psi_{x_i}^2-\lambda\nu(\nu+1)\psi^{-\nu-2}\psi_{x_i}^2)+\lambda\nu\psi^{-\nu-1}\right)\vartheta^2\right)_{x_1} \\
& -2\lambda\nu\delta\sum_{k=1}^m\psi^{-\nu-1}\left[(\lambda^2\nu^2c^2\psi^{-\nu-1}\psi_{y_k}^2-\lambda\nu(\nu+1)c^2\psi^{-1}\psi_{y_k}^2+\lambda\nu mc^2)\vartheta^2\right]_{x_1} \\
& +4\lambda\nu\sum_{i=2}^n(\psi_{x_i}\vartheta_{x_i}\vartheta_{x_1})_{x_1} - 2\lambda\nu\sum_{i=2}^n(\psi_{x_i}\vartheta_{x_1}^2)_{x_i} \\
& +4\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i,j=2}^n(\psi_{x_i}\vartheta_{x_i}\vartheta_{x_j})_{x_j} - 2\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i,j=2}^n(\psi_{x_i}\vartheta_{x_j}^2)_{x_i} \\
& +2\lambda^2\nu^2\delta^2\sum_{i=2}^n\left((\lambda\nu\psi^{-2\nu-2}\psi_{x_i}-(\nu+1)\psi^{-\nu-2}\psi_{x_i})\vartheta^2\right)_{x_i} \\
& +2\lambda^2\nu^2(x_1+\delta_0)^2\sum_{i,j=2}^n\left[\psi_{x_i}\psi^{-\nu-1}\left((n-1)-(\nu+1)\psi_{x_j}^2\psi^{-1}+\lambda\nu\psi_{x_j}^2\psi^{-\nu-1}\right)\vartheta^2\right]_{x_i} \\
& -2\lambda^2\nu^2(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\left[c^2\psi_{x_i}\psi^{-\nu-1}(m-(\nu+1)\psi_{y_k}^2\psi^{-1}+\lambda\nu\psi_{y_k}^2\psi^{-\nu-1})\vartheta^2\right]_{x_i} \\
& -4\lambda\nu\sum_{k=1}^m(c^2\psi_{y_k}\vartheta_{y_k}\vartheta_{x_1})_{x_1} + 2\lambda\nu\sum_{k=1}^m(c^2\psi_{y_k}\vartheta_{x_1}^2)_{y_k} \\
& -4\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m(c^2\psi_{y_k}\vartheta_{y_k}\vartheta_{x_i})_{x_i} + 2\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m(c^2\psi_{y_k}\vartheta_{x_i}^2)_{y_k} \\
& +4\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{k,s=1}^m(c^4\psi_{y_k}\vartheta_{y_k}\vartheta_{y_s})_{y_s} - 2\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{k,s=1}^m(c^4\psi_{y_k}\vartheta_{y_s}^2)_{y_k} \\
& -2\lambda^2\nu^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\left[c^2\psi_{y_k}(\lambda\nu\psi^{-2\nu-2}-(\nu+1)\psi^{-\nu-2})\vartheta^2\right]_{y_k} \\
& -2\lambda^2\nu^2(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\left[c^2\psi_{y_k}\psi^{-\nu-1}(\psi_{x_ix_i}-(\nu+1)\psi_{x_i}^2\psi^{-2}+\lambda\nu\psi_{x_i}^2\psi^{-\nu-1})\vartheta^2\right]_{y_k} \\
& +2\lambda^2\nu^2(x_1+\delta_0)^2\sum_{k,s=1}^m\left[c^4\psi_{y_k}\psi^{-\nu-1}(\psi_{y_sy_s}-(\nu+1)\psi_{y_s}^2\psi^{-1}+\lambda\nu\psi_{y_s}^2\psi^{-\nu-1})\vartheta^2\right]_{y_k},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
d_1(\chi\varphi) &= -2\lambda\nu\delta(x_1 + \delta_0)^{-3} \lambda\nu (\psi_{x_1} \psi^{-\nu-1} \varphi^2 \chi^2)_{x_1} \\
&\quad + 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 G_o(n, m) \sum_{i=2}^n \lambda\nu (\psi_{x_i} \psi^{-\nu-1} \varphi^2 \chi^2)_{x_i} \\
&\quad - \lambda\nu \delta \alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \lambda\nu (\psi_{y_k} \psi^{-\nu-1} \varphi^2 \chi^2)_{y_k}.
\end{aligned}$$

İspat. İlk olarak

$$\vartheta = \chi\varphi \quad (2.4)$$

şeklinde yeni bir bilinmeyen fonksiyon tanımlayalım. Buna göre;

$$\begin{aligned}
\varphi_{x_1} &= \chi^{-1} (\vartheta_{x_1} + \lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_1} \vartheta), \\
\varphi_{x_1 x_1} &= \chi^{-1} (\vartheta_{x_1 x_1} + 2\lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_1} \vartheta_{x_1} \\
&\quad - \lambda\nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_1}^2 \vartheta + \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_1}^2 \vartheta),
\end{aligned} \quad (2.5)$$

$$\begin{aligned}
\varphi_{x_i} &= \chi^{-1} (\vartheta_{x_i} + \lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} \vartheta), \\
\varphi_{x_i x_i} &= \chi^{-1} (\vartheta_{x_i x_i} + 2\lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} \vartheta_{x_i} + \lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i x_i} \vartheta \\
&\quad - \lambda\nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_i}^2 \vartheta + \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_i}^2 \vartheta),
\end{aligned} \quad (2.6)$$

$$\begin{aligned}
\varphi_{y_k} &= \chi^{-1} (\vartheta_{y_k} + \lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} \vartheta), \\
\varphi_{y_k y_k} &= \chi^{-1} (\vartheta_{y_k y_k} + 2\lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} \vartheta_{y_k} + \lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k y_k} \vartheta \\
&\quad - \lambda\nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{y_k}^2 \vartheta + \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{y_k}^2 \vartheta)
\end{aligned} \quad (2.7)$$

yazılabilir. Burada $\varkappa = e^{\lambda\psi^{-\nu}}$ olarak tanımlıdır.

(2.5)-(2.7) bağıntıları kullanılarak

$$\begin{aligned}
&\psi^{\nu+1} \left((x_1 + \delta_0)^{-1} \varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k y_k} \right) \right)^2 \chi^2 \\
&= \psi^{\nu+1} \left[(x_1 + \delta_0)^{-1} (\vartheta_{x_1 x_1} + 2\lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_1} \vartheta_{x_1} - \lambda\nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_1}^2 \vartheta \right. \\
&\quad \left. + \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_1}^2 \vartheta) \right. \\
&\quad \left. + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n (\vartheta_{x_i x_i} + 2\lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} \vartheta_{x_i} + \lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i x_i} \vartheta \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \lambda\nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_i}^2 \vartheta + \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_i}^2 \vartheta) \right) \right. \\
&\quad \left. - c^2(x, y') \sum_{k=1}^m (\vartheta_{y_k y_k} + 2\lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} \vartheta_{y_k} + \lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k y_k} \vartheta \right. \\
&\quad \left. - \lambda\nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{y_k}^2 \vartheta + \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{y_k}^2 \vartheta) \right)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \psi^{\nu+1} \left[(x_1 + \delta_0)^{-1} (\vartheta_{x_1 x_1} - \lambda \nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_1}^2 \vartheta + \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_1}^2 \vartheta) \right. \\
&\quad (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n (\vartheta_{x_i x_i} + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i x_i} \vartheta - \lambda \nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_i}^2 \vartheta + \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_i}^2 \vartheta) \\
&\quad - c^2 \sum_{k=1}^m (\vartheta_{y_k y_k} + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k y_k} \vartheta - \lambda \nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{y_k}^2 \vartheta + \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{y_k}^2 \vartheta \\
&\quad \left. + 2\lambda \nu \psi^{-\nu-1} \left((x_1 + \delta_0)^{-1} \psi_{x_1} \vartheta_{x_1} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n \psi_{x_i} \vartheta_{x_i} - c^2 (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \psi_{y_k} \vartheta_{y_k} \right) \right]^2 \\
&\geq 4\lambda \nu \left((x_1 + \delta_0)^{-1} \psi_{x_1} \vartheta_{x_1} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n \psi_{x_i} \vartheta_{x_i} - c^2 (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \psi_{y_k} \vartheta_{y_k} \right) \\
&\quad \cdot \left[(x_1 + \delta_0)^{-1} \vartheta_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i x_i} - c^2 \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k y_k} \right) \right. \\
&\quad + (x_1 + \delta_0)^{-1} (\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_1}^2 \vartheta - \lambda \nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_1}^2 \vartheta) \\
&\quad + (x_1 + \delta_0) \left[\sum_{i=2}^n (\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_i}^2 \vartheta - \lambda \nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_i}^2 \vartheta) + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \vartheta \right. \\
&\quad \left. \left. - c^2 \sum_{k=1}^m (\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{y_k}^2 \vartheta - \lambda \nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{y_k}^2 \vartheta) + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \vartheta \right] \right] \quad (2.8)
\end{aligned}$$

eşitsizliği elde edilir. Burada

$$\psi_{x_1} = \delta, \psi_{x_1 x_1} = 0, \psi_{x_i x_i} = 1, \psi_{x_i y_k} = 0 \quad (2.9)$$

olduğu göz önünde bulundurulmuştur. Şimdi son eşitsizlikteki her bir terimi aşağıdaki şekilde değerlendirelim:

Birinci terim:

$$\begin{aligned}
&4\lambda \nu (x_1 + \delta_0)^{-1} \psi_{x_1} \vartheta_{x_1} (x_1 + \delta_0)^{-1} \vartheta_{x_1 x_1} \\
&= 4\lambda \nu (x_1 + \delta_0)^{-2} \delta \vartheta_{x_1} \vartheta_{x_1 x_1} \\
&= 2\lambda \nu \delta \left(2 \left((x_1 + \delta_0)^{-2} \vartheta_{x_1}^2 \right)_{x_1} - \left((x_1 + \delta_0)^{-2} \vartheta_{x_1}^2 \right)_{x_1} + \left((x_1 + \delta_0)^{-2} \right)_{x_1} \vartheta_{x_1}^2 \right. \\
&\quad \left. - 2 \left((x_1 + \delta_0)^{-2} \right)_{x_1} \vartheta_{x_1}^2 \right) \\
&= 2\lambda \nu \delta \left(\left((x_1 + \delta_0)^{-2} \vartheta_{x_1}^2 \right)_{x_1} - \left((x_1 + \delta_0)^{-2} \right)_{x_1} \vartheta_{x_1}^2 \right) \\
&= 2\lambda \nu \delta \left((x_1 + \delta_0)^{-2} \vartheta_{x_1}^2 \right)_{x_1} + 4\lambda \nu \delta (x_1 + \delta_0)^{-3} \vartheta_{x_1}^2 \\
&= d_{01}(\vartheta) + 4\lambda \nu \delta (x_1 + \delta_0)^{-3} \vartheta_{x_1}^2, \quad (2.10)
\end{aligned}$$

ikinci terim :

$$\begin{aligned}
& 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^{-1} \psi_{x_1} \vartheta_{x_1} (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i x_i} \\
&= 2\lambda\nu\delta \sum_{i=2}^n 2\vartheta_{x_1} \vartheta_{x_i x_i} \\
&= 4\lambda\nu\delta \sum_{i=2}^n (\vartheta_{x_1} \vartheta_{x_i})_{x_i} - 2\lambda\nu\delta \sum_{i=2}^n (\vartheta_{x_i}^2)_{x_1} \\
&= d_{02}(\vartheta), \tag{2.11}
\end{aligned}$$

üçüncü terim:

$$\begin{aligned}
& -4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^{-1} \psi_{x_1} \vartheta_{x_1} c^2 (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k y_k} \\
&= -2\lambda\nu\delta \sum_{k=1}^m 2c^2 \vartheta_{x_1} \vartheta_{y_k y_k} \\
&= -2\lambda\nu\delta \sum_{k=1}^m \left((2c^2 \vartheta_{x_1} \vartheta_{y_k})_{y_k} - (c^2 \vartheta_{y_k}^2)_{x_1} + \left(\frac{\partial c^2}{\partial x_1} \vartheta_{y_k}^2 \right) - 2 \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \vartheta_{x_1} \vartheta_{y_k} \right) \\
&= -4\lambda\nu\delta \sum_{k=1}^m (c^2 \vartheta_{x_1} \vartheta_{y_k})_{y_k} + 2\lambda\nu\delta \sum_{k=1}^m (c^2 \vartheta_{y_k}^2)_{x_1} - 2\lambda\nu\delta \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial c^2}{\partial x_1} \vartheta_{y_k}^2 \right) \\
&\quad + 4\lambda\nu\delta \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \vartheta_{x_1} \vartheta_{y_k} \\
&= d_{03}(\vartheta) - 2\lambda\nu\delta \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \vartheta_{y_k}^2 + 4\lambda\nu\delta \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \vartheta_{x_1} \vartheta_{y_k}, \tag{2.12}
\end{aligned}$$

dördüncü terim:

$$\begin{aligned}
& 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^{-1} \psi_{x_1} \vartheta_{x_1} \vartheta (x_1 + \delta_0)^{-1} (\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_1}^2 - \lambda\nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_1}^2) \\
&= 2\lambda\nu\delta^3 (x_1 + \delta_0)^{-2} (\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} - \lambda\nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2}) 2\vartheta \vartheta_{x_1} \\
&= 2\lambda\nu\delta^3 ((x_1 + \delta_0)^{-2} (\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} - \lambda\nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2}) \vartheta^2)_{x_1} \\
&\quad + 4\lambda\nu\delta^3 (x_1 + \delta_0)^{-3} (\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} - \lambda\nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2}) \vartheta^2 \\
&\quad - 2\lambda\nu\delta^3 (x_1 + \delta_0)^{-2} (-2\lambda^2 \nu^2 (\nu + 1) \psi^{-2\nu-3} \psi_{x_1} + \lambda\nu (\nu + 1) (\nu + 2) \psi^{-\nu-3} \psi_{x_1}) \vartheta^2 \\
&= d_{04}(\vartheta) + 4\lambda^3 \nu^3 \delta^3 (x_1 + \delta_0)^{-3} \psi^{-2\nu-2} \vartheta^2 - 4\lambda^2 \nu^2 (\nu + 1) \delta^3 (x_1 + \delta_0)^{-3} \psi^{-\nu-2} \vartheta^2 \\
&\quad + 4\lambda^3 \nu^3 \delta^4 (\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \vartheta^2 \\
&\quad - 2\lambda^2 \nu^2 \delta^4 (\nu + 1) (\nu + 2) (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-\nu-3} \vartheta^2, \tag{2.13}
\end{aligned}$$

beşinci terim:

$$\begin{aligned}
& 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^{-1} \psi_{x_1} \vartheta_{x_1} (x_1 + \delta_0) \vartheta \left(\sum_{i=2}^n (\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_i}^2 - \lambda\nu (\nu+1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_i}^2) \right. \\
& \quad \left. + \lambda\nu \psi^{-\nu-1} \right) \\
&= 2\lambda\nu \delta \sum_{i=2}^n ((\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_i}^2 - \lambda\nu (\nu+1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_i}^2) + \lambda\nu \psi^{-\nu-1}) 2\vartheta \vartheta_{x_1} \\
&= 2\lambda\nu \delta \sum_{i=2}^n (((\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_i}^2 - \lambda\nu (\nu+1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_i}^2) + \lambda\nu \psi^{-\nu-1}) \vartheta^2)_{x_1} \\
& \quad - 2\lambda\nu \delta \sum_{i=2}^n (-2\lambda^2 \nu^2 (\nu+1) \psi^{-2\nu-3} \psi_{x_i}^2 \psi_{x_1} + \lambda\nu (\nu+1) (\nu+2) \psi^{-\nu-3} \psi_{x_i}^2 \psi_{x_1} \\
& \quad - \lambda\nu (\nu+1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_1}) \vartheta^2 \\
&= d_{05}(\vartheta) + 4\lambda^3 \nu^3 \delta^2 (\nu+1) \psi^{-2\nu-3} \vartheta^2 \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 \\
& \quad - 2\lambda^2 \nu^2 \delta^2 (\nu+1) (\nu+2) \psi^{-\nu-3} \vartheta^2 \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 + 2\lambda^2 \nu^2 \delta^2 (\nu+1) \psi^{-\nu-2} \vartheta^2, \tag{2.14}
\end{aligned}$$

altıncı terim:

$$\begin{aligned}
& -4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^{-1} \psi_{x_1} \vartheta_{x_1} (x_1 + \delta_0) c^2 \vartheta \left(\sum_{k=1}^m (\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{y_k}^2 - \lambda\nu (\nu+1) \psi^{-\nu-2} \psi_{y_k}^2) \right. \\
& \quad \left. + \lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k y_k} \right) \\
&= -2\lambda\nu \delta \sum_{k=1}^m ((\lambda^2 \nu^2 c^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{y_k}^2 - \lambda\nu (\nu+1) c^2 \psi^{-\nu-2} \psi_{y_k}^2) + \lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k y_k} c^2) 2\vartheta \vartheta_{x_1} \\
&= -2\lambda\nu \delta \sum_{k=1}^m [(\lambda^2 \nu^2 c^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{y_k}^2 - \lambda\nu (\nu+1) c^2 \psi^{-\nu-2} \psi_{y_k}^2 + \lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k y_k} c^2) \vartheta^2]_{x_1} \\
& \quad + 2\lambda\nu \delta \sum_{k=1}^m (-2\lambda^2 \nu^2 (\nu+1) c^2 \psi^{-2\nu-3} \psi_{y_k}^2 \psi_{x_1} + \lambda\nu (\nu+1) (\nu+2) c^2 \psi^{-\nu-3} \psi_{y_k}^2 \psi_{x_1} \\
& \quad - \lambda\nu \delta (\nu+1) c^2 \psi^{-\nu-2} \psi_{y_k y_k} + \lambda^2 \nu^2 \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \psi^{-2\nu-2} \psi_{y_k}^2 - \lambda\nu (\nu+1) \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \psi^{-\nu-2} \psi_{y_k}^2 \\
& \quad + \lambda\nu \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k y_k}) \vartheta^2 \\
&= d_{06}(\vartheta) - 4\lambda^3 \nu^3 \delta^2 (\nu+1) c^2 \psi^{-2\nu-3} \vartheta^2 \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& \quad + 2\lambda^2 \nu^2 \delta^2 (\nu+1) (\nu+2) c^2 \psi^{-\nu-3} \vartheta^2 \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 - 2\lambda^2 \nu^2 \delta^2 (\nu+1) m c^2 \psi^{-\nu-2} \vartheta^2 \\
& \quad + 2\lambda^3 \nu^3 \delta \psi^{-2\nu-2} \vartheta^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \psi_{y_k}^2 - 2\lambda^2 \nu^2 \delta (\nu+1) \psi^{-\nu-2} \vartheta^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \psi_{y_k}^2 \\
& \quad + 2\lambda^2 \nu^2 \delta m \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \psi^{-\nu-1} \vartheta^2, \tag{2.15}
\end{aligned}$$

yedinci terim:

$$\begin{aligned}
& 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n \psi_{x_i} \vartheta_{x_i} (x_1 + \delta_0)^{-1} \vartheta_{x_1 x_1} \\
= & 2\lambda\nu \sum_{i=2}^n 2\psi_{x_i} \vartheta_{x_i} \vartheta_{x_1 x_1} \\
= & 2\lambda\nu \sum_{i=2}^n \left((2\psi_{x_i} \vartheta_{x_i} \vartheta_{x_1})_{x_1} - (\psi_{x_i} \vartheta_{x_1}^2)_{x_i} + (\psi_{x_i x_i} \vartheta_{x_1}^2) - 2\psi_{x_i x_1} \vartheta_{x_i} \vartheta_{x_1} \right) \\
= & 4\lambda\nu \sum_{i=2}^n (\psi_{x_i} \vartheta_{x_i} \vartheta_{x_1})_{x_1} - 2\lambda\nu \sum_{i=2}^n (\psi_{x_i} \vartheta_{x_1}^2)_{x_i} + 2\lambda\nu \sum_{i=2}^n (\psi_{x_i x_i} \vartheta_{x_1}^2) \\
= & d_{07}(\vartheta) + 2\lambda\nu (n-1) \vartheta_{x_1}^2, \tag{2.16}
\end{aligned}$$

sekizinci terim:

$$\begin{aligned}
& 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n \psi_{x_i} \vartheta_{x_i} (x_1 + \delta_0) \sum_{j=2}^n \vartheta_{x_j x_j} \\
= & 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i,j=2}^n 2\psi_{x_i} \vartheta_{x_i} \vartheta_{x_j x_j} \\
= & 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i,j=2}^n \left((2\psi_{x_i} \vartheta_{x_i} \vartheta_{x_j})_{x_j} - (\psi_{x_i} \vartheta_{x_j}^2)_{x_i} + (\psi_{x_i x_i} \vartheta_{x_j}^2) - 2\psi_{x_i x_j} \vartheta_{x_i} \vartheta_{x_j} \right) \\
= & 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i,j=2}^n (\psi_{x_i} \vartheta_{x_i} \vartheta_{x_j})_{x_j} - 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i,j=2}^n (\psi_{x_i} \vartheta_{x_j}^2)_{x_i} \\
& + 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i,j=2}^n \psi_{x_i x_i} \vartheta_{x_j}^2 - 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i,j=2}^n \psi_{x_i x_j} \vartheta_{x_i} \vartheta_{x_j} \\
= & d_{08}(\vartheta) - 2\lambda\nu (n-1) (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{j=2}^n \vartheta_{x_j}^2, \tag{2.17}
\end{aligned}$$

dokuzuncu terim:

$$\begin{aligned}
& -4\lambda\nu (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n \psi_{x_i} \vartheta_{x_i} c^2 (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k y_k} \\
= & -2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m 2c^2 \psi_{x_i} \vartheta_{x_i} \vartheta_{y_k y_k} \\
= & -2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \left((2c^2 \psi_{x_i} \vartheta_{x_i} \vartheta_{y_k})_{y_k} - (c^2 \psi_{x_i} \vartheta_{y_k}^2)_{x_i} + (c^2 \psi_{x_i})_{x_i} \vartheta_{y_k}^2 \right. \\
& \left. - 2(c^2 \psi_{x_i})_{y_k} \vartheta_{x_i} \vartheta_{y_k} \right) \\
= & d_{09}(\vartheta) - 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_i} \psi_{x_i} \vartheta_{y_k}^2 - 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m c^2 \psi_{x_i x_i} \vartheta_{y_k}^2 \\
& + 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{x_i} \vartheta_{x_i} \vartheta_{y_k} + 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m c^2 \psi_{x_i y_k} \vartheta_{x_i} \vartheta_{y_k}, \tag{2.18}
\end{aligned}$$

onuncu terim:

$$\begin{aligned}
& 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n \psi_{x_i} \vartheta_{x_i} \vartheta (x_1 + \delta_0)^{-1} (\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_1}^2 - \lambda\nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_1}^2) \\
= & 2\lambda\nu \delta^2 \sum_{i=2}^n (\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_i} - \lambda\nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_i}) 2\vartheta \vartheta_{x_i} \\
= & 2\lambda^2 \nu^2 \delta^2 \sum_{i=2}^n ((\lambda\nu \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_i} - (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_i}) \vartheta^2)_{x_i} \\
& - 2\lambda^2 \nu^2 \delta^2 \sum_{i=2}^n (-2\lambda\nu (\nu + 1) \psi^{-2\nu-3} \psi_{x_i}^2 + \lambda\nu \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_i x_i} \\
& + (\nu + 1) (\nu + 2) \psi^{-\nu-3} \psi_{x_i}^2 - (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_i x_i}) \vartheta^2 \\
= & d_{10}(\vartheta) + 4\lambda^3 \nu^3 (\nu + 1) \psi^{-2\nu-3} \delta^2 \vartheta^2 \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 - 2\lambda^3 \nu^3 \delta^2 (n - 1) \psi^{-2\nu-2} \vartheta^2 \\
& - 2\lambda^2 \nu^2 \delta^2 (\nu + 1) (\nu + 2) \psi^{-\nu-3} \vartheta^2 \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 + 2\lambda^2 \nu^2 \delta^2 (\nu + 1) (n - 1) \psi^{-\nu-2} \vartheta^2, \quad (2.19)
\end{aligned}$$

on birinci terim:

$$\begin{aligned}
& 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n \psi_{x_i} \vartheta_{x_i} \vartheta (x_1 + \delta_0) \sum_{j=2}^n (\lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_j x_j} - \lambda\nu \psi^{-\nu-2} (\nu + 1) \psi_{x_j}^2 \\
& + \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_j}^2) \\
= & 2\lambda^2 \nu^2 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i,j=2}^n \left[(\psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} \psi_{x_j x_j} - (\nu + 1) \psi_{x_i} \psi_{x_j}^2 \psi^{-\nu-2} \right. \\
& \left. + \lambda\nu \psi_{x_i} \psi_{x_j}^2 \psi^{-2\nu-2}) 2\vartheta \vartheta_{x_i} \right] \\
= & 2\lambda^2 \nu^2 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i,j=2}^n \left[\psi_{x_i} (\psi_{x_j x_j} \psi^{-\nu-1} - (\nu + 1) \psi_{x_j}^2 \psi^{-\nu-2} + \lambda\nu \psi_{x_j}^2 \psi^{-2\nu-2}) \vartheta^2 \right]_{x_i} \\
& - 2\lambda^2 \nu^2 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i,j=2}^n (\psi_{x_i x_i} \psi_{x_j x_j} \psi^{-\nu-1} - (\nu + 1) \psi_{x_i}^2 \psi_{x_j x_j} \psi^{-\nu-2} \\
& - (\nu + 1) \psi_{x_i x_i} \psi_{x_j}^2 \psi^{-\nu-2} + (\nu + 1) (\nu + 2) \psi_{x_i}^2 \psi_{x_j}^2 \psi^{-\nu-3} \\
& - 2(\nu + 1) \psi_{x_i} \psi_{x_j} \psi_{x_j x_i} \psi^{-\nu-2} + \lambda\nu \psi_{x_i x_i} \psi_{x_j}^2 \psi^{-2\nu-2} \\
& - 2\lambda\nu (\nu + 1) \psi_{x_i}^2 \psi_{x_j}^2 \psi^{-2\nu-3} + 2\lambda\nu \psi_{x_i} \psi_{x_j} \psi_{x_j x_i} \psi^{-2\nu-2}) \vartheta^2 \\
= & d_{11}(\vartheta) + 4\lambda^3 \nu^3 (\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-3} \vartheta^2 \sum_{i,j=2}^n \psi_{x_i}^2 \psi_{x_j}^2 \\
& + 4\lambda^3 \nu^3 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \vartheta^2 \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 - 2\lambda^3 \nu^3 (n - 1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \vartheta^2 \sum_{j=2}^n \psi_{x_j}^2 \\
& - 2\lambda^2 \nu^2 \psi^{-\nu-1} (n - 1)^2 (x_1 + \delta_0)^2 \vartheta^2 + 4\lambda^2 \nu^2 (\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} \vartheta^2 \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +2\lambda^2\nu^2(\nu+1)(n-1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-2}\vartheta^2\sum_{i=2}^n\psi_{x_i}^2 \\
& +2\lambda^2\nu^2(\nu+1)(n-1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-2}\vartheta^2\sum_{j=2}^n\psi_{x_j}^2 \\
& -2\lambda^2\nu^2(\nu+1)(\nu+2)(n-1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-3}\vartheta^2\sum_{i,j=2}^n\psi_{x_i}^2\psi_{x_j}^2, \tag{2.20}
\end{aligned}$$

on ikinci terim:

$$\begin{aligned}
& -4\lambda\nu(x_1+\delta_0)\sum_{i=2}^n\psi_{x_i}\vartheta_{x_i}\cdot c^2\vartheta(x_1+\delta_0)\sum_{k=1}^m(\lambda\nu\psi_{y_k y_k}\psi^{-\nu-1}-\lambda\nu(\nu+1)\psi_{y_k}^2\psi^{-\nu-2} \\
& +\lambda^2\nu^2\psi_{y_k}^2\psi^{-2\nu-2}) \\
= & -2\lambda^2\nu^2(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m(c^2\psi_{x_i}\psi_{y_k y_k}\psi^{-\nu-1}-(\nu+1)c^2\psi_{x_i}\psi_{y_k}^2\psi^{-\nu-2} \\
& +\lambda\nu c^2\psi_{x_i}\psi_{y_k}^2\psi^{-2\nu-2})2\vartheta\vartheta_{x_i} \\
= & -2\lambda^2\nu^2(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m[c^2\psi_{x_i}\psi^{-\nu-1}(m-(\nu+1)\psi_{y_k}^2\psi^{-1}+\lambda\nu\psi_{y_k}^2\psi^{-\nu-1})\vartheta^2]_{x_i} \\
& +2\lambda^2\nu^2(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m(\frac{\partial c^2}{\partial x_i}\psi_{x_i}\psi_{y_k y_k}\psi^{-\nu-1}+c^2\psi_{x_i x_i}\psi_{y_k y_k}\psi^{-\nu-1} \\
& -(\nu+1)c^2\psi_{x_i}^2\psi_{y_k y_k}\psi^{-\nu-2}-(\nu+1)\frac{\partial c^2}{\partial x_i}\psi_{x_i}\psi_{y_k}^2\psi^{-\nu-2} \\
& -(\nu+1)c^2\psi_{x_i x_i}\psi_{y_k}^2\psi^{-\nu-2}+(\nu+1)(\nu+2)c^2\psi_{x_i}^2\psi_{y_k}^2\psi^{-\nu-3} \\
& -2(\nu+1)c^2\psi_{x_i}\psi_{y_k}\psi_{y_k x_i}\psi^{-\nu-2}+\lambda\nu\frac{\partial c^2}{\partial x_i}\psi_{x_i}\psi_{y_k}^2\psi^{-2\nu-2}+\lambda\nu c^2\psi_{x_i x_i}\psi_{y_k}^2\psi^{-2\nu-2} \\
& -2\lambda\nu(\nu+1)c^2\psi_{x_i}^2\psi_{y_k}^2\psi^{-2\nu-3}+2\lambda\nu c^2\psi_{x_i}\psi_{y_k}\psi_{y_k x_i}\psi^{-2\nu-2})\vartheta^2 \\
= & d_{12}(\vartheta)+2\lambda^2\nu^2 m\psi^{-\nu-1}(x_1+\delta_0)^2\vartheta^2\sum_{i=2}^n\frac{\partial c^2}{\partial x_i}\psi_{x_i} \\
& +2\lambda^2\nu^2 c^2 m(n-1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-1}\vartheta^2 \\
& -2\lambda^2\nu^2(\nu+1)m c^2\psi^{-\nu-2}(x_1+\delta_0)^2\vartheta^2\sum_{i=2}^n\psi_{x_i}^2 \\
& -2\lambda^2\nu^2(\nu+1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-2}\vartheta^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\frac{\partial c^2}{\partial x_i}\psi_{x_i}\psi_{y_k}^2 \\
& -2\lambda^2\nu^2(\nu+1)(n-1)(x_1+\delta_0)^2c^2\psi^{-\nu-2}\vartheta^2\sum_{k=1}^m\psi_{y_k}^2 \\
& +2\lambda^2\nu^2(\nu+1)(\nu+2)(x_1+\delta_0)^2c^2\psi^{-\nu-3}\vartheta^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\psi_{x_i}^2\psi_{y_k}^2 \\
& +2\lambda^3\nu^3(x_1+\delta_0)^2\psi^{-2\nu-2}\vartheta^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\frac{\partial c^2}{\partial x_i}\psi_{x_i}\psi_{y_k}^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +2\lambda^3\nu^3(n-1)(x_1+\delta_0)^2 c^2\psi^{-2\nu-2}\vartheta^2 \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& -4\lambda^3\nu^3(\nu+1)(x_1+\delta_0)^2 c^2\psi^{-2\nu-3}\vartheta^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \psi_{x_i}^2 \psi_{y_k}^2,
\end{aligned} \tag{2.21}$$

on üçüncü terim:

$$\begin{aligned}
& -4\lambda\nu(x_1+\delta_0)^{-1}\vartheta_{x_1x_1}c^2(x_1+\delta_0)\sum_{k=1}^m \psi_{y_k}\vartheta_{y_k} \\
= & -2\lambda\nu\sum_{k=1}^m 2c^2\psi_{y_k}\vartheta_{y_k}\vartheta_{x_1x_1} \\
= & -2\lambda\nu\sum_{k=1}^m \left((2c^2\psi_{y_k}\vartheta_{y_k}\vartheta_{x_1})_{x_1} - (c^2\psi_{y_k}\vartheta_{x_1}^2)_{y_k} + (c^2\psi_{y_k})_{y_k}\vartheta_{x_1}^2 - 2(c^2\psi_{y_k})_{x_1}\vartheta_{x_1}\vartheta_{y_k} \right) \\
= & -4\lambda\nu\sum_{k=1}^m (c^2\psi_{y_k}\vartheta_{y_k}\vartheta_{x_1})_{x_1} + 2\lambda\nu\sum_{k=1}^m (c^2\psi_{y_k}\vartheta_{x_1}^2)_{y_k} - 2\lambda\nu\sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k}\psi_{y_k}\vartheta_{x_1}^2 \\
& -2\lambda\nu c^2\sum_{k=1}^m \psi_{y_k y_k}\vartheta_{x_1}^2 + 4\lambda\nu\sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_1}\psi_{y_k}\vartheta_{x_1}\vartheta_{y_k} + 4\lambda\nu c^2\sum_{k=1}^m \psi_{y_k x_1}\vartheta_{x_1}\vartheta_{y_k} \\
= & d_{13}(\vartheta) - 2\lambda\nu\sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k}\psi_{y_k}\vartheta_{x_1}^2 - 2\lambda\nu c^2 m \vartheta_{x_1}^2 + 4\lambda\nu\sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_1}\psi_{y_k}\vartheta_{x_1}\vartheta_{y_k},
\end{aligned} \tag{2.22}$$

on dördüncü terim:

$$\begin{aligned}
& -4\lambda\nu(x_1+\delta_0)c^2\sum_{k=1}^m \psi_{y_k}\vartheta_{y_k}(x_1+\delta_0)\sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i x_i} \\
= & -2\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m 2c^2\psi_{y_k}\vartheta_{y_k}\vartheta_{x_i x_i} \\
= & -4\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m (c^2\psi_{y_k}\vartheta_{y_k}\vartheta_{x_i})_{x_i} + 2\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m (c^2\psi_{y_k}\vartheta_{x_i}^2)_{y_k} \\
& -2\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k}\psi_{y_k}\vartheta_{x_i}^2 - 2\lambda\nu c^2(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \psi_{y_k y_k}\vartheta_{x_i}^2 \\
& +4\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_i}\psi_{y_k}\vartheta_{x_i}\vartheta_{y_k} + 4\lambda\nu c^2(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \psi_{y_k x_i}\vartheta_{x_i}\vartheta_{y_k} \\
= & d_{14}(\vartheta) - 2\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k}\psi_{y_k}\vartheta_{x_i}^2 - 2\lambda\nu c^2 m(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i}^2 \\
& +4\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_i}\psi_{y_k}\vartheta_{x_i}\vartheta_{y_k},
\end{aligned} \tag{2.23}$$

on beşinci terim:

$$\begin{aligned}
& 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0) c^2 \sum_{k=1}^m \psi_{y_k} \vartheta_{y_k} c^2 (x_1 + \delta_0) \sum_{s=1}^m \vartheta_{y_s y_s} \\
= & 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m 2c^4 \psi_{y_k} \vartheta_{y_k} \vartheta_{y_s y_s} \\
= & 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m \left((2c^4 \psi_{y_k} \vartheta_{y_k} \vartheta_{y_s})_{y_s} - (c^4 \psi_{y_k} \vartheta_{y_s}^2)_{y_k} + (c^4 \psi_{y_k})_{y_k} \vartheta_{y_s}^2 \right. \\
& \left. - 2(c^4 \psi_{y_k})_{y_s} \vartheta_{y_k} \vartheta_{y_s} \right) \\
= & 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m (c^4 \psi_{y_k} \vartheta_{y_k} \vartheta_{y_s})_{y_s} - 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m (c^4 \psi_{y_k} \vartheta_{y_s}^2)_{y_k} \\
& + 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m (c^4 \psi_{y_k})_{y_k} \vartheta_{y_s}^2 - 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m (c^4 \psi_{y_k})_{y_s} \vartheta_{y_k} \vartheta_{y_s} \\
= & d_{15}(\vartheta) + 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m \frac{\partial c^4}{\partial y_k} \psi_{y_k} \vartheta_{y_s}^2 + 2\lambda\nu c^4 m (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{s=1}^m \vartheta_{y_s}^2 \\
& - 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m \frac{\partial c^4}{\partial y_s} \psi_{y_k} \vartheta_{y_k} \vartheta_{y_s} - 4\lambda\nu c^4 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2, \tag{2.24}
\end{aligned}$$

on altıncı terim:

$$\begin{aligned}
& -4\lambda\nu c^2 (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \psi_{y_k} \vartheta_{y_k} (x_1 + \delta_0)^{-1} (\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_1}^2 - \lambda\nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_1}^2) \vartheta \\
= & -2\lambda^2 \nu^2 \delta^2 \sum_{k=1}^m [c^2 \psi_{y_k} (\lambda\nu \psi^{-2\nu-2} - (\nu + 1) \psi^{-\nu-2})] 2\vartheta \vartheta_{y_k} \\
= & -2\lambda^2 \nu^2 \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^m [c^2 \psi_{y_k} (\lambda\nu \psi^{-2\nu-2} - (\nu + 1) \psi^{-\nu-2}) \vartheta^2]_{y_k} \\
& + 2\lambda^2 \nu^2 \sum_{k=1}^m \left(\lambda\nu \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \psi^{-2\nu-2} + \lambda\nu c^2 \psi_{y_k y_k} \psi^{-2\nu-2} - 2\lambda\nu (\nu + 1) c^2 \psi_{y_k}^2 \psi^{-2\nu-3} \right. \\
& \left. - (\nu + 1) \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \psi^{-\nu-2} - (\nu + 1) c^2 \psi_{y_k y_k} \psi^{-\nu-2} + (\nu + 1) (\nu + 2) c^2 \psi_{y_k}^2 \psi^{-\nu-3} \right) \vartheta^2 \\
= & d_{16}(\vartheta) + 2\lambda^3 \nu^3 \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \vartheta^2 \\
& + 2\lambda^3 \nu^3 c^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k y_k} \vartheta^2 - 4\lambda^3 \nu^3 (\nu + 1) c^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \vartheta^2 \\
& - 2\lambda^2 \nu^2 (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \vartheta^2 - 2\lambda^2 \nu^2 (\nu + 1) c^2 \psi^{-\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k y_k} \vartheta^2 \\
& + 2\lambda^2 \nu^2 c^2 (\nu + 1) (\nu + 2) \psi^{-\nu-3} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \vartheta^2, \tag{2.25}
\end{aligned}$$

on yedinci terim:

$$\begin{aligned}
& -4\lambda\nu(x_1 + \delta_0) c^2 \sum_{k=1}^m \psi_{y_k} \vartheta_{y_k} (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n (\lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_i x_i} - \lambda\nu(\nu+1)\psi^{-\nu-2}\psi_{x_i}^2 \\
& + \lambda^2\nu^2\psi^{-2\nu-2}\psi_{x_i}^2) \vartheta \\
= & -4\lambda^2\nu^2(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m [c^2\psi_{y_k}\psi^{-\nu-1}(\psi_{x_i x_i} - (\nu+1)\psi^{-1}\psi_{x_i}^2 + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_i}^2)] \vartheta \vartheta_{y_k} \\
= & -2\lambda^2\nu^2(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m [c^2\psi_{y_k}(\psi_{x_i x_i}\psi^{-\nu-1} - (\nu+1)\psi_{x_i}^2\psi^{-\nu-2} + \lambda\nu\psi_{x_i}^2\psi^{-2\nu-2})\vartheta^2]_{y_k} \\
& + 2\lambda^2\nu^2(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{x_i x_i} \psi_{y_k} \psi^{-\nu-1} + c^2 \psi_{y_k y_k} \psi_{x_i x_i} \psi^{-\nu-1} \right. \\
& - (\nu+1)c^2 \psi_{x_i x_i} \psi_{y_k}^2 \psi^{-\nu-2} - (\nu+1) \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{x_i}^2 \psi_{y_k} \psi^{-\nu-2} - (\nu+1)c^2 \psi_{x_i}^2 \psi_{y_k y_k} \psi^{-\nu-2} \\
& + (\nu+1)(\nu+2)c^2 \psi_{x_i}^2 \psi_{y_k}^2 \psi^{-\nu-3} - 2c^2(\nu+1)\psi^{-\nu-2} \psi_{y_k} \psi_{x_i} \psi_{x_i y_k} \\
& + \lambda\nu \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{x_i}^2 \psi_{y_k} \psi^{-2\nu-2} + \lambda\nu c^2 \psi_{y_k y_k} \psi_{x_i}^2 \psi^{-2\nu-2} \\
& \left. - 2\lambda\nu(\nu+1)c^2 \psi_{y_k}^2 \psi_{x_i}^2 \psi^{-2\nu-3} + 2\lambda\nu c^2 \psi_{y_k} \psi_{x_i} \psi_{x_i y_k} \psi^{-2\nu-2} \right) \vartheta^2 \\
= & d_{17}(\vartheta) + 2\lambda^2\nu^2(n-1)(x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-1} \vartheta^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \\
& + 2\lambda^2\nu^2 c^2 (n-1)m(x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-1} \vartheta^2 \\
& - 2\lambda^2\nu^2 c^2 (\nu+1)(n-1)(x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} \vartheta^2 \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& - 2\lambda^2\nu^2 (\nu+1)(x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} \vartheta^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{x_i}^2 \psi_{y_k} \\
& - 2\lambda^2\nu^2 (\nu+1)(x_1 + \delta_0)^2 c^2 m \psi^{-\nu-2} \vartheta^2 \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 \\
& + 2\lambda^2\nu^2 c^2 (x_1 + \delta_0)^2 (\nu+1)(\nu+2) \psi^{-\nu-3} \vartheta^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \psi_{x_i}^2 \psi_{y_k}^2 \\
& + 2\lambda^3\nu^3 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \vartheta^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{x_i}^2 \psi_{y_k} \\
& - 4\lambda^3\nu^3 (\nu+1)(x_1 + \delta_0)^2 c^2 \psi^{-2\nu-3} \vartheta^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \psi_{x_i}^2 \\
& + 2\lambda^3\nu^3 (x_1 + \delta_0)^2 c^2 m \psi^{-2\nu-2} \vartheta^2 \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2, \tag{2.26}
\end{aligned}$$

on sekizinci terim:

$$\begin{aligned}
& 4\lambda\nu c^2 (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \psi_{y_k} \vartheta_{y_k} \lambda\nu \psi^{-\nu-1} \vartheta c^2 (x_1 + \delta_0) \sum_{s=1}^m (\psi_{y_s y_s} - (\nu+1) \psi^{-1} \psi_{y_s}^2 \\
& + \lambda\nu \psi^{-\nu-1} \psi_{y_s}^2) \\
= & 2\lambda^2 \nu^2 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m c^4 \psi_{y_k} (\psi_{y_s y_s} \psi^{-\nu-1} - (\nu+1) \psi_{y_s}^2 \psi^{-\nu-2} + \lambda\nu \psi_{y_s}^2 \psi^{-2\nu-2}) 2\vartheta \vartheta_{y_k} \\
= & 2\lambda^2 \nu^2 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m [c^4 \psi_{y_k} (\psi_{y_s y_s} \psi^{-\nu-1} - (\nu+1) \psi_{y_s}^2 \psi^{-\nu-2} + \lambda\nu \psi_{y_s}^2 \psi^{-2\nu-2}) \vartheta^2]_{y_k} \\
& - 2\lambda^2 \nu^2 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m \left(\frac{\partial c^4}{\partial y_k} \psi_{y_k} \psi_{y_s y_s} \psi^{-\nu-1} + c^4 \psi_{y_k y_k} \psi_{y_s y_s} \psi^{-\nu-1} \right. \\
& - c^4 (\nu+1) \psi_{y_k}^2 \psi_{y_s y_s} \psi^{-\nu-2} - (\nu+1) \frac{\partial c^4}{\partial y_k} \psi_{y_k} \psi_{y_s}^2 \psi^{-\nu-2} - (\nu+1) c^4 \psi_{y_k y_k} \psi_{y_s}^2 \psi^{-\nu-2} \\
& + (\nu+1) (\nu+2) c^4 \psi_{y_k}^2 \psi_{y_s}^2 \psi^{-\nu-3} - (\nu+1) c^4 \psi_{y_k} \frac{\partial \psi_{y_s}^2}{\partial y_k} \psi^{-\nu-2} \\
& + \lambda\nu \frac{\partial c^4}{\partial y_k} \psi_{y_k} \psi_{y_s}^2 \psi^{-2\nu-2} + \lambda\nu c^4 \psi_{y_k y_k} \psi_{y_s}^2 \psi^{-2\nu-2} \\
& \left. - 2\lambda\nu (\nu+1) c^4 \psi_{y_k}^2 \psi_{y_s}^2 \psi^{-2\nu-3} + \lambda\nu c^4 \psi_{y_k} \frac{\partial \psi_{y_s}^2}{\partial y_k} \psi^{-2\nu-2} \right) \vartheta^2 \\
= & d_{18}(\vartheta) - 2\lambda^2 \nu^2 m \psi^{-\nu-1} \vartheta^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^4}{\partial y_k} \psi_{y_k} - 2\lambda^2 \nu^2 c^4 m^2 \psi^{-\nu-1} \vartheta^2 \\
& + 2\lambda^2 \nu^2 c^4 (\nu+1) m \psi^{-\nu-2} \vartheta^2 \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 + 2\lambda^2 \nu^2 (\nu+1) \psi^{-\nu-2} \vartheta^2 \sum_{k,s=1}^m \frac{\partial c^4}{\partial y_k} \psi_{y_k} \psi_{y_s}^2 \\
& + 2\lambda^2 \nu^2 (\nu+1) c^4 m \psi^{-\nu-2} \vartheta^2 \sum_{s=1}^m \psi_{y_s}^2 - 2\lambda^2 \nu^2 (\nu+1) (\nu+2) c^4 \psi^{-\nu-3} \vartheta^2 \sum_{k,s=1}^m \psi_{y_k}^2 \psi_{y_s}^2 \\
& + 4\lambda^2 \nu^2 (\nu+1) c^4 \psi^{-\nu-2} \vartheta^2 \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 - 2\lambda^3 \nu^3 \psi^{-2\nu-2} \vartheta^2 \sum_{k,s=1}^m \frac{\partial c^4}{\partial y_k} \psi_{y_k} \psi_{y_s}^2 \\
& - 4\lambda^3 \nu^3 c^4 \psi^{-2\nu-2} \vartheta^2 \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 - 2\lambda^3 \nu^3 c^4 m \psi^{-2\nu-2} \sum_{s=1}^m \psi_{y_s}^2 \\
& - 4\lambda^3 \nu^3 (\nu+1) c^4 \psi^{-2\nu-3} \sum_{k,s=1}^m \psi_{y_k}^2 \psi_{y_s}^2 \tag{2.27}
\end{aligned}$$

şeklinde bulunur.

O halde (2.10) - (2.27) eşitliklerinden

$$\begin{aligned}
& \psi^{\nu+1} \left((x_1 + \delta_0)^{-1} \varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k y_k} \right) \right)^2 \chi^2 \\
& \geq 4\lambda\nu\delta (x_1 + \delta_0)^{-3} \vartheta_{x_1}^2 - 2\lambda\nu\delta \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \vartheta_{y_k}^2 + 4\lambda\nu\delta \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \vartheta_{x_1} \vartheta_{y_k} \\
& \quad + 2\lambda\nu(n-1) \vartheta_{x_1}^2 - 2\lambda\nu(n-1)(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{j=2}^n \vartheta_{x_j}^2 \\
& \quad - 2\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_i} \psi_{x_i} \vartheta_{y_k}^2 - 2\lambda\nu c^2(n-1)(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 \\
& \quad + 4\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{x_i} \vartheta_{x_i} \vartheta_{y_k} - 2\lambda\nu \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \vartheta_{x_1}^2 - 2\lambda\nu c^2 m \vartheta_{x_1}^2 \\
& \quad + 4\lambda\nu \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \psi_{y_k} \vartheta_{x_1} \vartheta_{y_k} - 2\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \vartheta_{x_i}^2 \\
& \quad - 2\lambda\nu c^2 m (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i}^2 + 4\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_i} \psi_{y_k} \vartheta_{x_i} \vartheta_{y_k} \\
& \quad + 2\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m \frac{\partial c^4}{\partial y_k} \psi_{y_k} \vartheta_{y_s}^2 + 2\lambda\nu c^4 m (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{s=1}^m \vartheta_{y_s}^2 \\
& \quad - 4\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m \frac{\partial c^4}{\partial y_s} \psi_{y_k} \vartheta_{y_k} \vartheta_{y_s} - 4\lambda\nu c^4 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 \\
& \quad + K(\lambda, \nu, \psi) \vartheta^2 + d_0(\vartheta)
\end{aligned} \tag{2.28}$$

elde edilir.

Eğer Ω_γ alt bölgesinde $\|c^2\|_{C^1(\Omega)} \leq M$, $|\psi_{y_k}| \leq \sqrt{2\gamma}$ ve $|\psi_{x_i}| \leq \sqrt{2\gamma}$, ($1 \leq i \leq n$), ($1 \leq j \leq m$) olduğu göz önünde bulundurulursa (2.1) den

$$-2\lambda\nu\delta \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \vartheta_{y_k}^2 \geq 2\lambda\nu\delta \alpha_1 \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 \tag{2.29}$$

elde edilir. Ayrıca

$$\begin{aligned}
4\lambda\nu\delta \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \vartheta_{x_1} \vartheta_{y_k} & \geq -4\lambda\nu\delta \sum_{k=1}^m \left| \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \right| |\vartheta_{x_1} \vartheta_{y_k}| \\
& \geq -2\lambda\nu\delta \left((x_1 + \delta_0) \varepsilon_0 \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 + m \frac{M}{(x_1 + \delta_0) \varepsilon_0} \vartheta_{x_1}^2 \right) \\
& \geq -2\lambda\nu\delta (x_1 + \delta_0) \varepsilon_0 \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 - 2\lambda\nu\delta m \frac{M}{(x_1 + \delta_0) \varepsilon_0} \vartheta_{x_1}^2,
\end{aligned} \tag{2.30}$$

$$\begin{aligned}
-2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_i} \psi_{x_i} \vartheta_{y_k}^2 &\geq -2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \left| \frac{\partial c^2}{\partial x_i} \right| |\psi_{x_i}| |\vartheta_{y_k}^2| \\
&\geq -2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 M \sqrt{2\gamma} (n-1) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2, \quad (2.31)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-2\lambda\nu c^2 (n-1) (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 &\geq -2\lambda\nu (n-1) (x_1 + \delta_0)^2 |c^2| \sum_{k=1}^m |\vartheta_{y_k}^2| \\
&\geq -2\lambda\nu (n-1) M (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2, \quad (2.32)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{x_i} \vartheta_{x_i} \vartheta_{y_k} &\geq -4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \left| \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \right| |\psi_{x_i}| |\vartheta_{x_i} \vartheta_{y_k}| \\
&\geq -2\lambda\nu M \sqrt{2\gamma} (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m (\vartheta_{x_i}^2 + \vartheta_{y_k}^2) \\
&\geq -2\lambda\nu M \sqrt{2\gamma} (x_1 + \delta_0)^2 m \sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i}^2 \\
&\quad -2\lambda\nu M \sqrt{2\gamma} (x_1 + \delta_0)^2 (n-1) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2, \quad (2.33)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-2\lambda\nu \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \vartheta_{x_1}^2 &\geq -2\lambda\nu \sum_{k=1}^m \left| \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \right| |\psi_{y_k}| |\vartheta_{x_1}^2| \\
&\geq -2\lambda\nu M \sqrt{2\gamma} \sum_{k=1}^m \vartheta_{x_1}^2, \quad (2.34)
\end{aligned}$$

$$-2\lambda\nu c^2 m \vartheta_{x_1}^2 \geq -2\lambda\nu |c^2| m \vartheta_{x_1}^2 \geq -2\lambda\nu m M \vartheta_{x_1}^2, \quad (2.35)$$

$$\begin{aligned}
4\lambda\nu \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \psi_{y_k} \vartheta_{x_1} \vartheta_{y_k} &\geq -4\lambda\nu \sum_{k=1}^m \left| \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \right| |\psi_{y_k}| |\vartheta_{x_1} \vartheta_{y_k}| \\
&\geq -2\lambda\nu M \sqrt{2\gamma} \sum_{k=1}^m (\vartheta_{x_1}^2 + \vartheta_{y_k}^2) \\
&\geq -2\lambda\nu M \sqrt{2\gamma} \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 - 2\lambda\nu m M \sqrt{2\gamma} \vartheta_{x_1}^2, \quad (2.36)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \vartheta_{x_i}^2 &\geq -2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \left| \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \right| |\psi_{y_k}| |\vartheta_{x_i}^2| \\
&\geq -2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 M m \sqrt{2\gamma} \sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i}^2, \quad (2.37)
\end{aligned}$$

$$-2\lambda\nu c^2 m (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i}^2 \geq -2\lambda\nu M m (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i}^2, \quad (2.38)$$

$$\begin{aligned} 4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_i} \psi_{y_k} \vartheta_{x_i} \vartheta_{y_k} &\geq -4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \left| \frac{\partial c^2}{\partial x_i} \right| |\psi_{y_k}| |\vartheta_{x_i} \vartheta_{y_k}| \\ &\geq -2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 M \sqrt{2\gamma} \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m (\vartheta_{x_i}^2 + \vartheta_{y_k}^2) \\ &\geq -2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 M \sqrt{2\gamma} m \sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i}^2 \\ &\quad -2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 M \sqrt{2\gamma} (n-1) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2, \end{aligned} \quad (2.39)$$

$$\begin{aligned} 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m \frac{\partial c^4}{\partial y_k} \psi_{y_k} \vartheta_{y_s}^2 &\geq -2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m \left| \frac{\partial c^4}{\partial y_k} \right| |\psi_{y_k}| |\vartheta_{y_s}^2| \\ &\geq -4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 M^2 \sqrt{2\gamma} m \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2, \end{aligned} \quad (2.40)$$

$$2\lambda\nu m c^4 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{s=1}^m \vartheta_{y_s}^2 \geq -2\lambda\nu m M^2 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{s=1}^m \vartheta_{y_s}^2, \quad (2.41)$$

$$\begin{aligned} -4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m \frac{\partial c^4}{\partial y_s} \psi_{y_k} \vartheta_{y_k} \vartheta_{y_s} &\geq -4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k,s=1}^m \left| \frac{\partial c^4}{\partial y_s} \right| |\psi_{y_k}| |\vartheta_{y_k} \vartheta_{y_s}| \\ &\geq -2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 M^2 \sqrt{2\gamma} \sum_{k,s=1}^m (\vartheta_{y_k}^2 + \vartheta_{y_s}^2) \\ &\geq -4\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 M^2 \sqrt{2\gamma} m \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2, \end{aligned} \quad (2.42)$$

$$-4\lambda\nu c^4 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 \geq -4\lambda\nu M^2 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 \quad (2.43)$$

bağıntıları yazılabilir.

(2.28) eşitsizliğinde (2.29)-(2.43) bağıntıları kullanılarak

$$\begin{aligned}
& \psi^{\nu+1} \left((x_1 + \delta_0)^{-1} \varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k y_k} \right) \right)^2 \chi^2 \\
\geq & 2\lambda\nu \left(2\delta(x_1 + \delta_0)^{-3} + (n-1) - \delta M m (x_1 + \delta_0)^{-1} \varepsilon_0^{-1} - 2mM\sqrt{2\gamma} - mM \right) \vartheta_{x_1}^2 \\
& - 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \left((n+1) + M\sqrt{2\gamma}m + Mm\sqrt{2\gamma} + Mm + M\sqrt{2\gamma}m \right) \sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i}^2 \\
& + 2\lambda\nu \left(\delta\alpha_1 - \delta(x_1 + \delta_0) \varepsilon_0 - (x_1 + \delta_0)^2 M\sqrt{2\gamma}(n-1) - (n-1)M(x_1 + \delta_0)^2 \right. \\
& - M\sqrt{2\gamma}(x_1 + \delta_0)^2(n-1) - M\sqrt{2\gamma} - (x_1 + \delta_0)^2 M\sqrt{2\gamma}(n-1) \\
& - 2(x_1 + \delta_0)^2 M^2\sqrt{2\gamma}m - mM^2(x_1 + \delta_0)^2 - 2(x_1 + \delta_0)^2 M^2\sqrt{2\gamma}m \\
& \left. - 2M^2(x_1 + \delta_0)^2 \right) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 + K(\lambda, \nu, \psi) \vartheta^2 + d_{01}(\vartheta)
\end{aligned} \tag{2.44}$$

yazılabilir. Diğer taraftan $0 \leq \varepsilon_0 \leq \frac{\alpha_1}{4}$ olduğundan

$$2\lambda\nu\delta(\alpha_1 - n\varepsilon_0) > 2\lambda\nu\delta\left(\alpha_1 - \frac{\alpha_1}{4}\right) > \frac{3}{2}\lambda\nu\delta\alpha_1 \tag{2.45}$$

bulunur. Eğer

$$\begin{aligned}
l_1 = & 1 + 3(n-1) \left(\frac{3}{4}\gamma \right) + 4M \left(\frac{3}{4}\gamma \right) m \\
& + 2M \frac{3}{4} \left(\frac{\gamma}{2} \right)^{1/2} + (n-1) \frac{3}{4} \left(\frac{\gamma}{2} \right)^{1/2},
\end{aligned} \tag{2.46}$$

$$\delta_1 = \frac{4M\sqrt{2\gamma}}{\alpha_1} l_1, \tag{2.47}$$

alınır ve

$$\left(\sqrt{2\gamma} \right)^{-1} = \left(\frac{\gamma}{2} \right)^{1/2} \tag{2.48}$$

olduğu göz önünde bulundurulursa $\delta \geq \delta_1$ için

$$\begin{aligned}
& 2\lambda\nu \left(\delta\alpha_1 - \delta\varepsilon_0 - (x_1 + \delta_0)^2 M\sqrt{2\gamma}(n-1) - (n-1)M(x_1 + \delta_0)^2 \right. \\
& - M\sqrt{2\gamma}(x_1 + \delta_0)^2(n-1) - M\sqrt{2\gamma} - (x_1 + \delta_0)^2 M\sqrt{2\gamma}(n-1) \\
& - 2(x_1 + \delta_0)^2 M^2\sqrt{2\gamma}m - mM^2(x_1 + \delta_0)^2 - 2(x_1 + \delta_0)^2 M^2\sqrt{2\gamma}m \\
& \left. - 2M^2(x_1 + \delta_0)^2 \right) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2\lambda\nu \left(\delta\alpha_1 - \delta\varepsilon_0 - M\sqrt{2\gamma} \left(1 + (x_1 + \delta_0)(n-1) + (n-1)(x_1 + \delta_0) \left(\sqrt{2\gamma} \right)^{-1} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + 2(x_1 + \delta_0)(n-1) + 2M(x_1 + \delta_0)m + 2M(x_1 + \delta_0) \left(\sqrt{2\gamma} \right)^{-1} \right) (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 \right. \\
&\geq 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0) \left(\delta\alpha_1 - \delta\varepsilon_0 - M\sqrt{2\gamma}l_1 \right) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 \\
&\geq \left(2\lambda\nu(\delta\alpha_1 - n\varepsilon_0\delta) - 2\lambda\nu M\sqrt{2\gamma}l_1 \right) (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 \\
&\geq \left(\frac{3}{2}\lambda\nu\delta\alpha_1 - 2\lambda\nu\delta_1\frac{\alpha_1}{4} \right) (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 \\
&\geq \lambda\nu\delta\alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 \tag{2.49}
\end{aligned}$$

elde edilir. Ayrıca kabulümüzden $\sqrt{2\gamma} < 1$,

$$\gamma < \frac{4}{3} (Mm\varepsilon_0^{-1} + 3mM)^{-1/2} < 1$$

eşitsizliği yazılabilir. Buradan

$$\left(\frac{3}{4}\gamma \right)^2 (Mm\varepsilon_0^{-1} + 3mM) < 1$$

ve

$$\left(\frac{3}{4}\gamma \right)^2 \left(Mm\varepsilon_0^{-1} + \frac{3}{2}\gamma mM\sqrt{2\gamma} + \frac{3}{4}\gamma mM \right) < 1$$

olacağından $2 - \phi_0 > 1$ olur. O halde

$$\phi_0 = \left(\left(\frac{3}{4}\gamma \right)^2 Mm\varepsilon_0^{-1} + 2mM \left(\frac{3}{4}\gamma \right)^3 \sqrt{2\gamma} + mM \left(\frac{3}{4}\gamma \right)^3 \right) < 1$$

ve $x_1 + \delta_0 < \frac{3}{4}\gamma$ ($\delta \geq 4$) için

$$2 - \phi_1 > 2 - \phi_0$$

olduğu görülür.

Burada

$$\phi_1 = \left((x_1 + \delta_0)^2 Mm\varepsilon_0^{-1} + 2mM(x_1 + \delta_0)^3 \sqrt{2\gamma} + mM(x_1 + \delta_0)^3 \right) < 1$$

dır. Bu durumda

$$\begin{aligned}
&2 - Mm(x_1 + \delta_0)^2 \varepsilon_0^{-1} - 2mM(x_1 + \delta_0)^3 \delta^{-1} \sqrt{2\gamma} - mM\delta^{-1}(x_1 + \delta_0)^3 \\
&> 2 - \phi_1 > 2 - \phi_0 > 1
\end{aligned}$$

olduğu görülür. Eğer $\delta \geq 4$ ve

$$\gamma \leq \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{4}{3} (Mm\varepsilon_0^{-1} + 3mM)^{-1/2} \right\}$$

olduğu dikkate alınırsa

$$\begin{aligned} & 2\lambda\nu \left(2\delta (x_1 + \delta_0)^{-3} + (n-1) - \delta Mm (x_1 + \delta_0)^{-1} \varepsilon_0^{-1} - 2mM\sqrt{2\gamma} - mM \right) \vartheta_{x_1}^2 \\ &= 2\lambda\nu\delta (x_1 + \delta_0)^{-3} \vartheta_{x_1}^2 \left(2 - Mm (x_1 + \delta_0)^2 \varepsilon_0^{-1} - 2mM (x_1 + \delta_0)^3 \delta^{-1} \sqrt{2\gamma} \right. \\ & \quad \left. - mM\delta^{-1} (x_1 + \delta_0)^3 \right) \\ &\geq 2\lambda\nu\delta (x_1 + \delta_0)^{-3} \vartheta_{x_1}^2. \end{aligned} \tag{2.50}$$

bulunur.

Böylece

$$\begin{aligned} & \psi^{\nu+1} \left((x_1 + \delta_0)^{-1} \varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2 (x, y') \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k y_k} \right) \right)^2 \chi^2 \\ &= 2\lambda\nu \left(2\delta (x_1 + \delta_0)^{-3} - \delta Mm (x_1 + \delta_0)^{-1} \varepsilon_0^{-1} - 2mM\sqrt{2\gamma} - mM \right) \vartheta_{x_1}^2 \\ & \quad - 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \left(n+1 + M\sqrt{2\gamma}m + Mm\sqrt{2\gamma} + Mm + M\sqrt{2\gamma}m \right) \sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i}^2 \\ & \quad + 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0) \left(\delta\alpha_1 - \delta\varepsilon_0 - (x_1 + \delta_0) M\sqrt{2\gamma} (n-1) - (n-1) M (x_1 + \delta_0) \right. \\ & \quad \left. - M\sqrt{2\gamma} (x_1 + \delta_0) (n-1) - M\sqrt{2\gamma} - (x_1 + \delta_0) M\sqrt{2\gamma} (n-1) \right. \\ & \quad \left. - 2(x_1 + \delta_0) M^2 \sqrt{2\gamma}m - (x_1 + \delta_0) mM^2 - 2(x_1 + \delta_0) M^2 \sqrt{2\gamma}m \right. \\ & \quad \left. - 2M^2 (x_1 + \delta_0) \right) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 + K(\lambda, \nu, \psi) \vartheta^2 + d_0(\vartheta) \\ &\geq 2\lambda\nu\delta (x_1 + \delta_0)^{-3} \vartheta_{x_1}^2 - 2\lambda\nu \left(1 + 2(x_1 + \delta_0)^2 + 3M\sqrt{2\gamma} (x_1 + \delta_0)^2 m \right. \\ & \quad \left. + (x_1 + \delta_0)^2 Mm \right) \sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i}^2 + \lambda\nu\delta\alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 + K(\lambda, \nu, \psi) \vartheta^2 + d_0(\vartheta) \\ &\geq 2\lambda\nu\delta (x_1 + \delta_0)^{-3} \vartheta_{x_1}^2 - 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 G_0(n, m) \sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i}^2 \\ & \quad + \lambda\nu\delta\alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 + K(\lambda, \nu, \psi) \vartheta^2 + d_0(\vartheta) \end{aligned} \tag{2.51}$$

eşitsizliği elde edilir. Burada

$$G_0(n, m) = n + 1 + 3M\sqrt{2\gamma}m + Mm \tag{2.52}$$

dir.

Ayrıca $K(\lambda, \nu, \delta)$ fonksiyonu aşağıdaki şekilde düzenlenebilir:

$$\begin{aligned}
K = & \lambda^3 \nu^3 (4\delta^3 (x_1 + \delta_0)^{-3} \psi^{-2\nu-2} + 4\delta^4 (\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \\
& + 4\delta^2 (\nu + 1) \psi^{-2\nu-3} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 - 4\delta^2 (\nu + 1) c^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& + 2\delta \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \psi_{y_k}^2 + 4(\nu + 1) \psi^{-2\nu-3} \delta^2 \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 - 2\delta^2 (n - 1) \psi^{-2\nu-2} \\
& + 4(\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{i,j=2}^n \psi_{x_i}^2 \psi_{x_j}^2 - 4(x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 \\
& - 2(n - 1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{j=2}^n \psi_{x_j}^2 + 2(x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_i} \psi_{x_i} \psi_{y_k}^2 \\
& + 2(n - 1) (x_1 + \delta_0)^2 c^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& - 4(\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^2 c^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \psi_{x_i}^2 \psi_{y_k}^2 \\
& + 2\psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} + 2c^2 m \psi^{-2\nu-2} - 4(\nu + 1) c^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& + 2\psi^{-2\nu-2} (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{x_i} \psi_{y_k} + 2(x_1 + \delta_0)^2 c^2 m \psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 \\
& - 4(\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^2 c^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \psi_{x_i}^2 - 2\psi^{-2\nu-2} \sum_{k,s=1}^m \frac{\partial c^4}{\partial y_k} \psi_{y_k} \psi_{y_s}^2 \\
& - 2c^4 m \psi^{-2\nu-2} \sum_{s=1}^m \psi_{y_s}^2 - 4(\nu + 1) c^4 \psi^{-2\nu-3} \sum_{k,s=1}^m \psi_{y_k}^2 \psi_{y_s}^2 - 4c^4 \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \Big) \\
& + \lambda^2 \nu^2 \left(-4(\nu + 1) \delta^3 (x_1 + \delta_0)^{-3} \psi^{-\nu-2} - 2\delta^4 (\nu + 1) (\nu + 2) (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-\nu-3} \right. \\
& - 2\delta^2 (\nu + 1) (\nu + 2) \psi^{-\nu-3} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 + 2\delta^2 (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} + 2\delta m \frac{\partial c^2}{\partial x_i} \psi^{-\nu-1} \\
& + 2\delta^2 (\nu + 1) (\nu + 2) c^2 \psi^{-\nu-3} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 - 2\delta^2 (\nu + 1) m c^2 \psi^{-\nu-2} \\
& - 2\delta (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \psi_{y_k}^2 - 2\delta^2 (\nu + 1) (\nu + 2) \psi^{-\nu-3} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 \\
& + 2\delta^2 (\nu + 1) (n - 1) \psi^{-\nu-2} - 2\psi^{-\nu-1} (n - 1)^2 (x_1 + \delta_0)^2 \\
& + 2(\nu + 1) (n - 1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 \\
& + 2(\nu + 1) (n - 1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} \sum_{j=2}^n \psi_{x_j}^2 \\
& \left. - 2(\nu + 1) (\nu + 2) (n - 1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-3} \sum_{i,j=2}^n \psi_{x_i}^2 \psi_{x_j}^2 \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +4(\nu+1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-2}\sum_{i=2}^n\psi_{x_i}^2+2m\psi^{-\nu-1}(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\frac{\partial c^2}{\partial x_i}\psi_{x_i} \\
& +2c^2m(n-1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-1}-2(\nu+1)mc^2\psi^{-\nu-2}(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\psi_{x_i}^2 \\
& -2(\nu+1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-2}\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\frac{\partial c^2}{\partial x_i}\psi_{x_i}\psi_{y_k}^2 \\
& -2(\nu+1)(n-1)(x_1+\delta_0)^2c^2\psi^{-\nu-2}\sum_{k=1}^m\psi_{y_k}^2 \\
& +2(\nu+1)(\nu+2)(x_1+\delta_0)^2c^2\psi^{-\nu-3}\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\psi_{x_i}^2\psi_{y_k}^2 \\
& -2(\nu+1)\psi^{-\nu-2}\sum_{k=1}^m\frac{\partial c^2}{\partial y_k}\psi_{y_k}-2(\nu+1)mc^2\psi^{-\nu-2} \\
& +2c^2(\nu+1)(\nu+2)\psi^{-\nu-3}\sum_{k=1}^m\psi_{y_k}^2+2(n-1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-1}\sum_{k=1}^m\frac{\partial c^2}{\partial y_k}\psi_{y_k} \\
& +2c^2(n-1)(x_1+\delta_0)^2m\psi^{-\nu-1}-2c^2(\nu+1)(n-1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-2}\sum_{k=1}^m\psi_{y_k}^2 \\
& -2(\nu+1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-2}\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\frac{\partial c^2}{\partial y_k}\psi_{x_i}^2\psi_{y_k} \\
& -2(\nu+1)(x_1+\delta_0)^2c^2m\psi^{-\nu-2}\sum_{i=2}^n\psi_{x_i}^2 \\
& +2c^2(\nu+1)(\nu+2)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-3}\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\psi_{x_i}^2\psi_{y_k}^2 \\
& -2m\psi^{-\nu-1}\sum_{k=1}^m\frac{\partial c^4}{\partial y_k}\psi_{y_k}-2c^4m^2\psi^{-\nu-1}+2c^4(\nu+1)m\psi^{-\nu-2}\sum_{k=1}^m\psi_{y_k}^2 \\
& +2(\nu+1)\psi^{-\nu-2}\sum_{k,s=1}^m\frac{\partial c^4}{\partial y_k}\psi_{y_k}\psi_{y_s}^2+2(\nu+1)c^4m\psi^{-\nu-2}\sum_{s=1}^m\psi_{y_s}^2 \\
& -2(\nu+1)(\nu+2)c^4\psi^{-\nu-3}\sum_{k,s=1}^m\psi_{y_k}^2\psi_{y_s}^2 \\
& +4(\nu+1)c^4\psi^{-\nu-2}\sum_{k=1}^m\psi_{y_k}^2\Big)
\end{aligned}$$

Daha açık olarak yukarıda verilen $K(\lambda, \nu, \delta)$ fonksiyonu

$$K(\lambda, \nu, \delta) = \lambda^3\nu^3E_1 + \lambda^2\nu^2E_2 \quad (2.53)$$

formunda yazılabilir.

Burada

$$\begin{aligned}
E_1 = & 4\delta^3 (x_1 + \delta_0)^{-3} \psi^{-2\nu-2} + 4\delta^4 (\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \\
& + 4\delta^2 (\nu + 1) \psi^{-2\nu-3} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 - 4\delta^2 (\nu + 1) c^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& + 2\delta \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \psi_{y_k}^2 + 4(\nu + 1) \psi^{-2\nu-3} \delta^2 \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 - 2\delta^2 (n - 1) \psi^{-2\nu-2} \\
& + 4(\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{i,j=2}^n \psi_{x_i}^2 \psi_{x_j}^2 - 4(x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 \\
& - 2(n - 1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{j=2}^n \psi_{x_j}^2 + 2(x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_i} \psi_{x_i} \psi_{y_k}^2 \\
& + 2(n - 1) (x_1 + \delta_0)^2 c^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& - 4(\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^2 c^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \psi_{x_i}^2 \psi_{y_k}^2 + 2\psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \\
& + 2mc^2 \psi^{-2\nu-2} - 4(\nu + 1) c^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 + 2\psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{x_i}^2 \psi_{y_k} \\
& + 2c^2 m \psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 - 4(\nu + 1) c^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \psi_{x_i}^2 \\
& - 2\psi^{-2\nu-2} \sum_{k,s=1}^m \frac{\partial c^4}{\partial y_k} \psi_{y_k} \psi_{y_s}^2 - 2c^4 m \psi^{-2\nu-2} \sum_{s=1}^m \psi_{y_s}^2 \\
& - 4(\nu + 1) c^4 \psi^{-2\nu-3} \sum_{k,s=1}^m \psi_{y_k}^2 \psi_{y_s}^2 - 4c^4 \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2, \tag{2.54}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E_2 = & -4(\nu + 1) \delta^3 (x_1 + \delta_0)^{-3} \psi^{-\nu-2} - 2\delta^4 (\nu + 1) (\nu + 2) (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-\nu-3} \\
& - 2\delta^2 (\nu + 1) (\nu + 2) \psi^{-\nu-3} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 + 2\delta^2 (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \\
& + 2\delta^2 (\nu + 1) (\nu + 2) c^2 \psi^{-\nu-3} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 - 2\delta^2 (\nu + 1) mc^2 \psi^{-\nu-2} \\
& - 2\delta^2 (\nu + 1) (\nu + 2) \psi^{-\nu-3} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 + 2\delta^2 (\nu + 1) (n - 1) \psi^{-\nu-2} \\
& - 2\delta (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \psi_{y_k}^2 - 2\psi^{-\nu-1} (n - 1)^2 (x_1 + \delta_0)^2 \\
& + 2\delta m \frac{\partial c^2}{\partial x_i} \psi^{-\nu-1} + 2(\nu + 1) (n - 1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 \\
& + 2(\nu + 1) (n - 1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} \sum_{j=2}^n \psi_{x_j}^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -2(\nu+1)(\nu+2)(n-1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-3}\sum_{i,j=2}^n\psi_{x_i}^2\psi_{x_j}^2 \\
& +4(\nu+1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-2}\sum_{i=2}^n\psi_{x_i}^2+2m\psi^{-\nu-1}(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\frac{\partial c^2}{\partial x_i}\psi_{x_i} \\
& +2c^2m(n-1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-1}-2(\nu+1)mc^2\psi^{-\nu-2}(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\psi_{x_i}^2 \\
& -2(\nu+1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-2}\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\frac{\partial c^2}{\partial x_i}\psi_{x_i}\psi_{y_k}^2 \\
& -2(\nu+1)(n-1)(x_1+\delta_0)^2c^2\psi^{-\nu-2}\sum_{k=1}^m\psi_{y_k}^2 \\
& +2(\nu+1)(\nu+2)(x_1+\delta_0)^2c^2\psi^{-\nu-3}\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\psi_{x_i}^2\psi_{y_k}^2 \\
& -2(\nu+1)\psi^{-\nu-2}\sum_{k=1}^m\frac{\partial c^2}{\partial y_k}\psi_{y_k}-2(\nu+1)mc^2\psi^{-\nu-2} \\
& +2c^2(\nu+1)(\nu+2)\psi^{-\nu-3}\sum_{k=1}^m\psi_{y_k}^2+2(n-1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-1}\sum_{k=1}^m\frac{\partial c^2}{\partial y_k}\psi_{y_k} \\
& +2c^2(n-1)m(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-1}-2c^2(\nu+1)(n-1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-2}\sum_{k=1}^m\psi_{y_k}^2 \\
& -2(\nu+1)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-2}\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\frac{\partial c^2}{\partial y_k}\psi_{x_i}^2\psi_{y_k} \\
& -2(x_1+\delta_0)^2(\nu+1)c^2m\psi^{-\nu-2}\sum_{i=2}^n\psi_{x_i}^2 \\
& +2c^2(\nu+1)(\nu+2)(x_1+\delta_0)^2\psi^{-\nu-3}\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\psi_{x_i}^2\psi_{y_k}^2-2m\psi^{-\nu-1}\sum_{k=1}^m\frac{\partial c^4}{\partial y_k}\psi_{y_k} \\
& -2c^4m^2\psi^{-\nu-1}+2c^4(\nu+1)m\psi^{-\nu-2}\sum_{k=1}^m\psi_{y_k}^2+2(\nu+1)\psi^{-\nu-2}\sum_{k,s=1}^m\frac{\partial c^4}{\partial y_k}\psi_{y_k}\psi_{y_s}^2 \\
& +2(\nu+1)c^4m\psi^{-\nu-2}\sum_{s=1}^m\psi_{y_s}^2-2(\nu+1)(\nu+2)c^4\psi^{-\nu-3}\sum_{k,s=1}^m\psi_{y_k}^2\psi_{y_s}^2 \\
& +4(\nu+1)c^4\psi^{-\nu-2}\sum_{k=1}^m\psi_{y_k}^2
\end{aligned} \tag{2.55}$$

olarak verilmiştir.

Şimdi E_1 ve E_2 ifadelerini değerlendirelim:

İlk olarak

$$\begin{aligned}
E_1 &= 4\delta^4 (\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} + 4\delta^3 (x_1 + \delta_0)^{-3} \psi^{-2\nu-2} \\
&\quad + 4(\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{i,j=2}^n \psi_{x_i}^2 \psi_{x_j}^2 + 4\delta^2 (\nu + 1) \psi^{-2\nu-3} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 \\
&\quad + 2(n-1) (x_1 + \delta_0)^2 c^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 + 2mc^2 \psi^{-2\nu-2} \\
&\quad + 2c^2 m \psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 - E_{11}
\end{aligned} \tag{2.56}$$

olmak üzere

$$E_1 > 4\delta^4 (\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} - E_{11} \tag{2.57}$$

yazılabilir.

$$\begin{aligned}
E_{11} &= 4\delta^2 (\nu + 1) c^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{i=2}^n \psi_{y_k}^2 - 2\delta \psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \frac{\partial c^2}{\partial x_1} \psi_{y_k}^2 \\
&\quad + 2\delta^2 (n-1) \psi^{-2\nu-2} + 4(x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 \\
&\quad + 2(n-1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{j=2}^n \psi_{x_j}^2 - 2(x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial x_i} \psi_{x_i} \psi_{y_k}^2 \\
&\quad + 4(\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^2 c^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \psi_{x_i}^2 \psi_{y_k}^2 - 2\psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \\
&\quad + 4(\nu + 1) c^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 - 2\psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{x_i}^2 \psi_{y_k} \\
&\quad + 4(\nu + 1) c^2 \psi^{-2\nu-3} \sum_{i=2}^n \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \psi_{x_i}^2 + 2\psi^{-2\nu-2} \sum_{k,s=1}^m \frac{\partial c^4}{\partial y_k} \psi_{y_k} \psi_{y_s}^2 \\
&\quad + 2c^4 m \psi^{-2\nu-2} \sum_{s=1}^m \psi_{y_s}^2 + 4(\nu + 1) c^4 \psi^{-2\nu-3} \sum_{k,s=1}^m \psi_{y_k}^2 \psi_{y_s}^2 + 4c^4 \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2
\end{aligned} \tag{2.58}$$

olup

$$\begin{aligned}
E_1 &> 4\delta^4 (\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} - E_{11} \\
&= 4\delta^4 (\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \left(1 - \frac{1}{\delta^2} E_{12} \right)
\end{aligned} \tag{2.59}$$

bulunur. Bu eşitsizlikte

$$E_{12} = \frac{1}{4\delta^2 (\nu + 1) (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3}} E_{11} \tag{2.60}$$

şeklinde tanımlıdır.

Diğer yandan $c, \psi, \psi_{x_i}, \psi_{y_k}$ fonksiyonları $C^1(\overline{\Omega})$ uzayında sınırlı olduğundan $x \in \overline{\Omega_\gamma}$ için E_{12} de sınırlıdır. Yani bir $M_1 > 0$ sayısı vardır öyle ki $|E_{12}| \leq M_1$. Eğer

$$\delta \geq \delta_2 = \sqrt{2M_1}, \quad M_1 = \frac{\delta_2^2}{2}$$

ise

$$\left(1 - \frac{1}{\delta^2} E_{12}\right) \geq \frac{1}{2}$$

olacağından

$$\begin{aligned} E_1 &> 4\delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} (\nu + 1) \psi^{-2\nu-3} - E_{11} \\ &= 4\delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} (\nu + 1) \psi^{-2\nu-3} \left(1 - \frac{1}{\delta^2} E_{12}\right) \\ &\geq 2\delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} (\nu + 1) \psi^{-2\nu-3} \end{aligned} \quad (2.61)$$

elde edilir.

İkinci olarak sabitlenmiş $\delta \geq \delta_2, \nu, \gamma$ sayıları için E_2 ifadesinin de $\overline{\Omega_\gamma}$ da sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. $\overline{\Omega_\gamma} : |E_2| \leq M_2, M_2 > 0$. Buna bağlı olarak eğer $\lambda \geq \lambda_0 = M_2$ ise $\nu > 1$ için

$$2\lambda^3 \nu^3 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} (\nu + 1) \psi^{-2\nu-3} - \lambda^2 \nu^2 M_2 \geq 0$$

yazılabilir. Sonuç olarak

$$\begin{aligned} K(\lambda, \nu, \delta) &= \lambda^3 \nu^3 E_1 + \lambda^2 \nu^2 E_2 \\ &\geq 2\lambda^3 \nu^3 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} (\nu + 1) \psi^{-2\nu-3} + \lambda^2 \nu^2 E_2 \\ &= 2\lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} + 2\lambda^3 \nu^3 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} + \lambda^2 \nu^2 E_2 \\ &\geq 2\lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} + (2\lambda^3 \nu^3 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \delta^4 - \lambda^2 \nu^2 M_2) \\ &\geq 2\lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \end{aligned} \quad (2.62)$$

olduğu görülür.

(2.44) eşitsizliği (2.49), (2.50), (2.52), (2.62) bağıntıları dikkate alınarak $\delta \geq \delta_3$,

$\lambda \geq \lambda_0, \nu > 1$ için

$$\begin{aligned} &\psi^{\nu+1} \left((x_1 + \delta_0)^{-1} \varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k y_k} \right) \right)^2 \chi^2 \\ &\geq 2\lambda \nu \delta (x_1 + \delta_0)^{-3} \vartheta_{x_1}^2 - 2\lambda \nu G_o(n, m) \sum_{i=2}^n \vartheta_{x_i}^2 + \lambda \nu \delta \alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \vartheta_{y_k}^2 \\ &\quad + 2\lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \vartheta^2 + d_0(\vartheta) \end{aligned} \quad (2.63)$$

elde edilir.

Lemma 2.1 in ispatını tamamlamak için $\varphi(x)$ fonksiyonuna geri dönmeliyiz. Bunun için

$$\begin{aligned}
\vartheta &= \chi\varphi, \\
\vartheta_{x_1} &= (\varphi_{x_1} - \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_1}\varphi)\chi, \\
\vartheta_{x_1}^2 &= \varphi_{x_1}^2\chi^2 - \lambda^2\nu^2\psi_{x_1}^2\psi^{-2\nu-2}\varphi^2\chi^2 - \lambda\nu(\nu+1)\psi_{x_1}^2\psi^{-\nu-2}\varphi^2\chi^2 \\
&\quad - \lambda\nu(\psi_{x_1}\psi^{-\nu-1}\varphi^2\chi^2)_{x_1}, \\
\vartheta_{x_i} &= (\varphi_{x_i} - \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_i}\varphi)\chi, \\
\vartheta_{x_i}^2 &= \varphi_{x_i}^2\chi^2 - \lambda^2\nu^2\psi_{x_i}^2\psi^{-2\nu-2}\varphi^2\chi^2 - \lambda\nu(\nu+1)\psi_{x_i}^2\psi^{-\nu-2}\varphi^2\chi^2 \\
&\quad + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_ix_i}\varphi^2\chi^2 - \lambda\nu(\psi_{x_i}\psi^{-\nu-1}\varphi^2\chi^2)_{x_i}, \\
\vartheta_{y_k} &= (\varphi_{y_k} - \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{y_k}\varphi)\chi, \\
\vartheta_{y_k}^2 &= \varphi_{y_k}^2\chi^2 - \lambda^2\nu^2\psi_{y_k}^2\psi^{-2\nu-2}\varphi^2\chi^2 - \lambda\nu(\nu+1)\psi_{y_k}^2\psi^{-\nu-2}\varphi^2\chi^2 \\
&\quad + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{y_ky_k}\varphi^2\chi^2 - \lambda\nu(\psi_{y_k}\psi^{-\nu-1}\varphi^2\chi^2)_{y_k}
\end{aligned}$$

eşitlikleri (2.63) eşitsizliğinde yerine yazılırsa

$$\begin{aligned}
&\psi^{\nu+1}\left((x_1 + \delta_0)^{-1}\varphi_{x_1x_1} + (x_1 + \delta_0)\left(\sum_{i=2}^n\varphi_{x_ix_i} - c^2(x, y')\sum_{k=1}^m\varphi_{y_ky_k}\right)\right)^2\chi^2 \\
&\geq 2\lambda\nu\delta(x_1 + \delta_0)^{-3}\vartheta_{x_1}^2 - 2\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2G_o(n, m)\sum_{i=2}^n\vartheta_{x_i}^2 + \lambda\nu\delta\alpha_1(x_1 + \delta_0)\sum_{k=1}^m\vartheta_{y_k}^2 \\
&\quad + 2\lambda^3\nu^4\delta^4(x_1 + \delta_0)^{-2}\psi^{-2\nu-3}\vartheta^2 + d_0(\vartheta) \\
&= 2\lambda\nu\delta(x_1 + \delta_0)^{-3}(\varphi_{x_1}^2\chi^2 - \lambda^2\nu^2\psi_{x_1}^2\psi^{-2\nu-2}\varphi^2\chi^2 - \lambda\nu(\nu+1)\psi_{x_1}^2\psi^{-\nu-2}\varphi^2\chi^2 \\
&\quad - \lambda\nu(\psi_{x_1}\psi^{-\nu-1}\varphi^2\chi^2)_{x_1}) - 2\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2G_o(n, m)\sum_{i=2}^n(\varphi_{x_i}^2\chi^2 - \lambda^2\nu^2\psi_{x_i}^2\psi^{-2\nu-2}\varphi^2\chi^2 \\
&\quad - \lambda\nu(\nu+1)\psi_{x_i}^2\psi^{-\nu-2}\varphi^2\chi^2 + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_ix_i}\varphi^2\chi^2 - \lambda\nu(\psi_{x_i}\psi^{-\nu-1}\varphi^2\chi^2)_{x_i}) \\
&\quad + \lambda\nu\delta\alpha_1(x_1 + \delta_0)\sum_{k=1}^m(\varphi_{y_k}^2\chi^2 - \lambda^2\nu^2\psi_{y_k}^2\psi^{-2\nu-2}\varphi^2\chi^2 - \lambda\nu(\nu+1)\psi_{y_k}^2\psi^{-\nu-2}\varphi^2\chi^2 \\
&\quad + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{y_ky_k}\varphi^2\chi^2 - \lambda\nu(\psi_{y_k}\psi^{-\nu-1}\varphi^2\chi^2)_{y_k}) \\
&\quad + 2\lambda^3\nu^4\delta^4(x_1 + \delta_0)^{-2}\psi^{-2\nu-3}\varphi^2\chi^2 + d_0(\varphi\chi) \\
&= 2\lambda\nu\delta(x_1 + \delta_0)^{-3}\varphi_{x_1}^2\chi^2 - 2\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2G_o(n, m)\sum_{i=1}^n\varphi_{x_i}^2\chi^2 \\
&\quad + \lambda\nu\delta\alpha_1(x_1 + \delta_0)\sum_{k=1}^m\varphi_{y_k}^2\chi^2 + 2\lambda^3\nu^4\delta^4(x_1 + \delta_0)^{-2}\psi^{-2\nu-3}\varphi^2\chi^2 \\
&\quad + G(\lambda, \delta)\varphi^2\chi^2 + d_0(\varphi\chi) + d_{01}(\varphi\chi)
\end{aligned} \tag{2.64}$$

elde edilir.

$$\begin{aligned}
& d_0(\chi\varphi) \\
= & 2\lambda\nu\delta\left((x_1+\delta_0)^{-2}\vartheta_{x_1}^2\right)_{x_1} + 4\lambda\nu\delta\sum_{i=2}^n\left(\vartheta_{x_1}\vartheta_{x_i}\right)_{x_i} - 2\lambda\nu\delta\sum_{i=2}^n\left(\vartheta_{x_i}^2\right)_{x_1} \\
& + 4\lambda\nu\delta\sum_{k=1}^m\left(c^2\vartheta_{x_1}\vartheta_{y_k}\right)_{y_k} + 2\lambda\nu\delta\sum_{k=1}^m\left(c^2\vartheta_{y_k}^2\right)_{x_1} \\
& + 2\lambda\nu\delta^3\left((x_1+\delta_0)^{-2}\left(\lambda^2\nu^2\psi^{-2\nu-2}-\lambda\nu(\nu+1)\psi^{-\nu-2}\right)\vartheta^2\right)_{x_1} \\
& + 2\lambda\nu\delta\sum_{i=2}^n\left(\left(\left(\lambda^2\nu^2\psi^{-2\nu-2}\psi_{x_i}^2-\lambda\nu(\nu+1)\psi^{-\nu-2}\psi_{x_i}^2\right)+\lambda\nu\psi^{-\nu-1}\right)\vartheta^2\right)_{x_1} \\
& - 2\lambda\nu\delta\sum_{k=1}^m\left[\left(\lambda^2\nu^2c^2\psi^{-2\nu-2}\psi_{y_k}^2-\lambda\nu(\nu+1)c^2\psi^{-\nu-2}\psi_{y_k}^2+\lambda\nu\psi^{-\nu-1}mc^2\right)\vartheta^2\right]_{x_1} \\
& + 4\lambda\nu\sum_{i=2}^n\left(\psi_{x_i}\vartheta_{x_i}\vartheta_{x_1}\right)_{x_1} - 2\lambda\nu\sum_{i=2}^n\left(\psi_{x_i}\vartheta_{x_1}^2\right)_{x_i} \\
& + 4\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i,j=2}^n\left(\psi_{x_i}\vartheta_{x_i}\vartheta_{x_j}\right)_{x_j} - 2\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i,j=2}^n\left(\psi_{x_i}\vartheta_{x_j}^2\right)_{x_i} \\
& - 4\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\left(c^2\psi_{x_i}\vartheta_{x_i}\vartheta_{y_k}\right)_{y_k} + 2\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\left(c^2\psi_{x_i}\vartheta_{y_k}^2\right)_{x_i} \\
& + 2\lambda^2\nu^2\delta^2\sum_{i=2}^n\left(\left(\lambda\nu\psi^{-2\nu-2}\psi_{x_i}-\left(\nu+1\right)\psi^{-\nu-2}\psi_{x_i}\right)\vartheta^2\right)_{x_i} \\
& + 2\lambda^2\nu^2(x_1+\delta_0)^2\sum_{i,j=2}^n\left[\psi_{x_i}\psi^{-\nu-1}\left(\left(n-1\right)\psi_{x_i}-\left(\nu+1\right)\psi_{x_j}^2\psi^{-1}+\lambda\nu\psi_{x_j}^2\psi^{-\nu-1}\right)\vartheta^2\right]_{x_i} \\
& - 2\lambda^2\nu^2(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\left[c^2\psi_{x_i}\psi^{-\nu-1}\left(m-\left(\nu+1\right)\psi_{y_k}^2\psi^{-1}+\lambda\nu\psi_{y_k}^2\psi^{-\nu-1}\right)\vartheta^2\right]_{x_i} \\
& - 4\lambda\nu\sum_{k=1}^m\left(c^2\psi_{y_k}\vartheta_{y_k}\vartheta_{x_1}\right)_{x_1} + 2\lambda\nu\sum_{k=1}^m\left(c^2\psi_{y_k}\vartheta_{x_1}^2\right)_{y_k} \\
& - 4\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\left(c^2\psi_{y_k}\vartheta_{y_k}\vartheta_{x_i}\right)_{x_i} + 2\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\left(c^2\psi_{y_k}\vartheta_{x_i}^2\right)_{y_k} \\
& + 4\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{k,s=1}^m\left(c^4\psi_{y_k}\vartheta_{y_k}\vartheta_{y_s}\right)_{y_s} - 2\lambda\nu(x_1+\delta_0)^2\sum_{k,s=1}^m\left(c^4\psi_{y_k}\vartheta_{y_s}^2\right)_{y_k} \\
& - 2\lambda^2\nu^2\sum_{i=1}^n\sum_{k=1}^m\left[c^2\psi_{y_k}\left(\lambda\nu\psi^{-2\nu-2}-\left(\nu+1\right)\psi^{-\nu-2}\right)\vartheta^2\right]_{y_k} \\
& - 2\lambda^2\nu^2(x_1+\delta_0)^2\sum_{i=2}^n\sum_{k=1}^m\left[c^2\psi_{y_k}\psi^{-\nu-1}\left(\left(n-1\right)-\left(\nu+1\right)\psi_{x_i}^2\psi^{-1}+\lambda\nu\psi_{x_i}^2\psi^{-\nu-1}\right)\vartheta^2\right]_{y_k} \\
& + 2\lambda^2\nu^2(x_1+\delta_0)^2\sum_{k,s=1}^m\left[c^4\psi^{-\nu-1}\psi_{y_k}\left(m-\left(\nu+1\right)\psi_{y_s}^2\psi^{-1}+\lambda\nu\psi_{y_s}^2\psi^{-\nu-1}\right)\vartheta^2\right]_{y_k} \quad (2.65)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
G(\lambda, \nu) &= -2\lambda\nu\delta(x_1 + \delta_0)^{-3} (\lambda^2\nu^2\psi_{x_1}^2\psi^{-2\nu-2} + \lambda\nu(\nu+1)\psi_{x_1}^2\psi^{-\nu-2}) \\
&\quad + 2\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2 G_o(n, m) \sum_{i=2}^n ((\lambda^2\nu^2\psi_{x_i}^2\psi^{-2\nu-2} + \lambda\nu(\nu+1)\psi_{x_i}^2\psi^{-\nu-2}) \\
&\quad - \lambda\nu(n-1)\psi^{-\nu-1}) + \lambda\nu\delta\alpha_1(x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m ((-\lambda^2\nu^2\psi_{y_k}^2\psi^{-2\nu-2} \\
&\quad - \lambda\nu(\nu+1)\psi_{y_k}^2\psi^{-\nu-2}) + \lambda\nu m\psi^{-\nu-1}), \tag{2.66}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
d_1(\chi\varphi) &= -2\lambda^2\nu^2\delta(x_1 + \delta_0)^{-3} \left((\psi_{x_1}\psi^{-\nu-1}\varphi^2\chi^2)_{x_1} \right) \\
&\quad + 2\lambda^2\nu^2 G_o(n, m) \sum_{i=2}^n (\psi_{x_i}\psi^{-\nu-1}\varphi^2\chi^2)_{x_i} \\
&\quad - \lambda^2\nu^2\delta\alpha_1(x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m (\psi_{y_k}\psi^{-\nu-1}\varphi^2\chi^2)_{y_k} \tag{2.67}
\end{aligned}$$

şeklinde tanımlıdır. ■

Şimdi Problem 3.1 in çözümünün tekliğini ispatlamak için gerekli olan ikinci bir lemma tanımlayalım.

Lemma 2.2 *Aşağıdaki eşitlik her $\varphi \in C^2(\Omega)$ fonksiyonu için*

$$\begin{aligned}
& -\varphi \left(\varphi_{x_1x_1} + (x_1 + \delta_0)^2 \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k y_k} \right) \right) \chi^2 \\
&= \varphi_{x_1}^2 \chi^2 + (x_1 + \delta_0)^2 \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2 \chi^2 - c^2 \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 \right) + G_2(\lambda, \delta) \varphi^2 \chi^2 + d_{02}(\varphi) \tag{2.68}
\end{aligned}$$

sağlanır. Burada

$$\begin{aligned}
G_2(\lambda, \nu) &= (-\lambda^2\nu^2\psi^{-2\nu-2}\psi_{x_1}^2 + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_1} - \lambda\nu(\nu+1)\psi^{-\nu-2}\psi_{x_1}^2 \\
&\quad - (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n (\lambda\nu(\nu+1)\psi^{-\nu-2} + 2\lambda^2\nu^2\psi^{-2\nu-2}) \psi_{x_i}^2 \\
&\quad + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}(x_1 + \delta_0)^2(n-1) + \frac{1}{2}(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial^2}{\partial y_k^2} c^2 \\
&\quad - \lambda\nu c^2 m \psi^{-\nu-1}(x_1 + \delta_0)^2 \\
&\quad + (2\lambda^2\nu^2 c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} + \lambda\nu(\nu+1) c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2}) \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
&\quad - 2\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-1} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \bigg) \varphi^2 \chi^2,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
d_2(\varphi) &= -(\varphi\varphi_{x_1}\chi^2)_{x_1} - \lambda\nu(\psi^{-\nu-1}\psi_{x_1}\varphi^2\chi^2)_{x_1} + \frac{1}{2}(\varphi^2\chi^2)_{x_1} \\
&\quad - \sum_{i=2}^n ((x_1 + \delta_0)^2 (\varphi\varphi_{x_i}\chi^2 + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_i}\varphi^2\chi^2))_{x_i} \\
&\quad + \sum_{k=1}^m (x_1 + \delta_0)^2 \left(\chi^2 \left(c^2\varphi\varphi_{y_k} - \frac{1}{2}\frac{\partial c^2}{\partial y_k}\varphi^2 + \lambda\nu c^2\psi^{-\nu-1}\psi_{y_k}\varphi^2 \right) \right)_{y_k}
\end{aligned}$$

olarak tanımlıdır.

İspat. (2.68) eşitliğinin sol tarafı için aşağıdaki eşitlikler yazılabilir.

Birinci terim:

$$\begin{aligned}
-\varphi\varphi_{x_1x_1}\chi^2 &= -\left[(\varphi\varphi_{x_1}\chi^2)_{x_1} - (\varphi\chi^2)_{x_1}\varphi_{x_1} \right] \\
&= -(\varphi\varphi_{x_1}\chi^2)_{x_1} + (\varphi\chi^2)_{x_1}\varphi_{x_1}.
\end{aligned} \tag{2.69}$$

(2.69) eşitliğinde

$$\begin{aligned}
(\varphi\chi^2)_{x_1}\varphi_{x_1} &= \varphi_{x_1}^2\chi^2 + \varphi(\chi^2)_{x_1}\varphi_{x_1} \\
&= \varphi_{x_1}^2\chi^2 - 2\lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_1}\varphi\varphi_{x_1}\chi^2 \\
&= \varphi_{x_1}^2\chi^2 - \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_1}(\varphi^2)_{x_1}\chi^2
\end{aligned} \tag{2.70}$$

dir. Ayrıca

$$\begin{aligned}
\lambda\nu(\psi^{-\nu-1}\psi_{x_1}\varphi^2\chi^2)_{x_1} &= \lambda\nu\left[(-\nu-1)\psi^{-\nu-2}\psi_{x_1}^2\varphi^2\chi^2 \right. \\
&\quad \left. + \psi^{-\nu-1}\psi_{x_1}(\varphi^2)_{x_1}\chi^2 + \psi^{-\nu-1}\psi_{x_1x_1}\varphi^2\chi^2 \right. \\
&\quad \left. - 2\lambda\nu\psi^{-2\nu-2}\psi_{x_1}^2\varphi^2\chi^2 \right] \\
&= -\lambda\nu(\nu+1)\psi^{-\nu-2}\psi_{x_1}^2\varphi^2\chi^2 + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_1}(\varphi^2)_{x_1}\chi^2 \\
&\quad + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_1x_1}\varphi^2\chi^2 - 2\lambda^2\nu^2\psi^{-2\nu-2}\psi_{x_1}^2\varphi^2\chi^2
\end{aligned} \tag{2.71}$$

kullanılarak

$$\begin{aligned}
-\lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_1}(\varphi^2)_{x_1}\chi^2 &= -\lambda\nu(\psi^{-\nu-1}\psi_{x_1}\varphi^2\chi^2)_{x_1} - \lambda\nu(\nu+1)\psi^{-\nu-2}\psi_{x_1}^2\varphi^2\chi^2 \\
&\quad + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\varphi^2\chi^2 - 2\lambda^2\nu^2\psi^{-2\nu-2}\psi_{x_1}^2\varphi^2\chi^2
\end{aligned} \tag{2.72}$$

ve sonuç olarak

$$\begin{aligned}
-\varphi\varphi_{x_1x_1}\chi^2 &= -(\varphi\varphi_{x_1}\chi^2)_{x_1} - \lambda\nu(\psi^{-\nu-1}\psi_{x_1}\varphi^2\chi^2)_{x_1} \\
&\quad + \frac{1}{2}(\varphi^2\chi^2)_{x_1} + \lambda^2\nu^2\psi^{-2\nu-2}\psi_{x_1}^2\varphi^2\chi^2 + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_1}\varphi^2\chi^2 \\
&\quad + \varphi_{x_1}^2\chi^2 - \lambda\nu(\nu+1)\psi^{-\nu-2}\psi_{x_1}^2\varphi^2\chi^2 - 2\lambda^2\nu^2\psi^{-2\nu-2}\psi_{x_1}^2\varphi^2\chi^2
\end{aligned} \tag{2.73}$$

bulunur.

İkinci terim:

$$\begin{aligned}
& - \sum_{i=2}^n (x_1 + \delta_0)^2 \varphi \varphi_{x_i x_i} \chi^2 \\
& = - \sum_{i=2}^n \left[((x_1 + \delta_0)^2 \varphi \varphi_{x_i} \chi^2)_{x_i} - ((x_1 + \delta_0)^2 \varphi \chi^2)_{x_i} \varphi_{x_i} \right] \\
& = - \sum_{i=2}^n ((x_1 + \delta_0)^2 \varphi \varphi_{x_i} \chi^2)_{x_i} + (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n (\varphi \chi^2)_{x_i} \varphi_{x_i}.
\end{aligned} \tag{2.74}$$

(2.74) eşitliğinde

$$\begin{aligned}
& (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n (\varphi \chi^2)_{x_i} \varphi_{x_i} \\
& = (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \left(\varphi_{x_i}^2 \chi^2 + \varphi (\chi^2)_{x_i} \varphi_{x_i} \right) \\
& = (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2 \chi^2 - (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n 2\lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} \varphi \varphi_{x_i} \chi^2 \\
& = (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2 \chi^2 - (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} (\varphi^2)_{x_i} \chi^2
\end{aligned} \tag{2.75}$$

dir. Ayrıca

$$\begin{aligned}
& \lambda \nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n (\psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} \varphi^2 \chi^2)_{x_i} \\
& = \lambda \nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \left((-\nu - 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_i}^2 \varphi^2 \chi^2 + \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i x_i} \varphi^2 \chi^2 \right. \\
& \quad \left. + \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} (\varphi^2)_{x_i} \chi^2 - 2\lambda \nu \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_i}^2 \varphi^2 \chi^2 \right) \\
& = (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \left(-\lambda \nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_i}^2 \varphi^2 \chi^2 + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i x_i} \varphi^2 \chi^2 \right. \\
& \quad \left. + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} (\varphi^2)_{x_i} \chi^2 - 2\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_i}^2 \varphi^2 \chi^2 \right)
\end{aligned} \tag{2.76}$$

kullanılarak

$$\begin{aligned}
& - (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} (\varphi^2)_{x_i} \chi^2 \\
& = (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \left(-(\lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} \varphi^2 \chi^2)_{x_i} - \lambda \nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_i}^2 \varphi^2 \chi^2 \right. \\
& \quad \left. + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i x_i} \varphi^2 \chi^2 - 2\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_i}^2 \varphi^2 \chi^2 \right)
\end{aligned} \tag{2.77}$$

bulunur

ve ikinci terim için

$$\begin{aligned}
& - (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \varphi \varphi_{x_i x_i} \chi^2 \\
= & - \sum_{i=2}^n \left((x_1 + \delta_0)^2 \varphi \varphi_{x_i} \chi^2 \right)_{x_i} + (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2 \chi^2 \\
& - \sum_{i=2}^n \left((x_1 + \delta_0)^2 \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} \varphi^2 \chi^2 \right)_{x_i} \\
& + (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \left(\lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i x_i} - \lambda \nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_i}^2 \right. \\
& \quad \left. - 2 \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_i}^2 \right) \varphi^2 \chi^2 \\
= & (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2 \chi^2 \\
& - \sum_{i=2}^n \left((x_1 + \delta_0)^2 \left(\varphi \varphi_{x_i} \chi^2 + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} \varphi^2 \chi^2 \right) \right)_{x_i} \\
& - (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \left(\lambda \nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} + 2 \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \right) \psi_{x_i}^2 \varphi^2 \chi^2 \\
& + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \psi_{x_i x_i} \varphi^2 \chi^2
\end{aligned} \tag{2.78}$$

elde edilir.

Üçüncü terim:

$$\begin{aligned}
& (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m c^2 \varphi \varphi_{y_k y_k} \chi^2 \\
= & (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \left[(c^2 \varphi \varphi_{y_k} \chi^2)_{y_k} - (c^2 \varphi \chi^2)_{y_k} \varphi_{y_k} \right] \\
= & (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m (c^2 \varphi \varphi_{y_k} \chi^2)_{y_k} - (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m (c^2 \varphi \chi^2)_{y_k} \varphi_{y_k}
\end{aligned} \tag{2.79}$$

(2.79) eşitliğinde

$$\begin{aligned}
& - \sum_{k=1}^m (c^2 \varphi \chi^2)_{y_k} \varphi_{y_k} \\
= & - \sum_{k=1}^m \left[\frac{\partial}{\partial y_k} c^2 \varphi \chi^2 \varphi_{y_k} + c^2 \varphi_{y_k} \chi^2 \varphi_{y_k} - 2 \lambda \nu c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} \varphi \varphi_{y_k} \chi^2 \right] \\
= & - \sum_{k=1}^m c^2 \varphi_{y_k}^2 \chi^2 - \sum_{k=1}^m \frac{\partial}{\partial y_k} c^2 \varphi \chi^2 \varphi_{y_k} + \lambda \nu \sum_{k=1}^m c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} 2 \varphi \varphi_{y_k} \chi^2
\end{aligned} \tag{2.80}$$

dir. (2.80) eşitliğinin sağ tarafındaki ikinci terim için

$$- \sum_{k=1}^m \frac{\partial}{\partial y_k} c^2 \varphi \chi^2 \varphi_{y_k} = - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m \frac{\partial}{\partial y_k} c^2 (\varphi^2)_{y_k} \chi^2 \tag{2.81}$$

olup

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial y_k} c^2 \varphi^2 \chi^2 \right)_{y_k} \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2}{\partial y_k^2} c^2 \varphi^2 \chi^2 + \frac{\partial}{\partial y_k} c^2 (\varphi^2)_{y_k} \chi^2 - 2\lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{y_k} \frac{\partial}{\partial y_k} c^2 \varphi^2 \chi^2 \right) \\
&= \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial y_k^2} c^2 \varphi^2 \chi^2 + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial y_k} c^2 (\varphi^2)_{y_k} \chi^2 - \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{y_k} \frac{\partial}{\partial y_k} c^2 \varphi^2 \chi^2
\end{aligned} \tag{2.82}$$

eşitliğinden

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^m \frac{\partial}{\partial y_k} c^2 (\varphi^2)_{y_k} \chi^2 \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m \frac{\partial^2}{\partial y_k^2} c^2 \varphi^2 \chi^2 - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial}{\partial y_k} c^2 \varphi^2 \chi^2 \right)_{y_k} \\
& \quad - \lambda\nu\psi^{-\nu-1} \sum_{k=1}^m \frac{\partial}{\partial y_k} c^2 \varphi^2 \chi^2 \psi_{y_k}
\end{aligned} \tag{2.83}$$

bulunur.

(2.80) eşitliğinin sağ tarafındaki üçüncü terim için

$$\sum_{k=1}^m \lambda\nu c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} 2\varphi\varphi_{y_k} \chi^2 = \sum_{k=1}^m \lambda\nu c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} (\varphi^2)_{y_k} \chi^2 \tag{2.84}$$

olup

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=1}^m (\lambda\nu c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} \varphi^2 \chi^2)_{y_k} \\
&= \sum_{k=1}^m \left(\lambda\nu \frac{\partial}{\partial y_k} c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} \varphi^2 \chi^2 - \lambda\nu (\nu+1) c^2 \psi^{-\nu-2} \psi_{y_k}^2 \varphi^2 \chi^2 \right. \\
& \quad + \lambda\nu c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k y_k} \varphi^2 \chi^2 + \lambda\nu c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} (\varphi^2)_{y_k} \chi^2 \\
& \quad \left. - 2\lambda^2 \nu^2 c^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{y_k}^2 \varphi^2 \chi^2 \right)
\end{aligned} \tag{2.85}$$

eşitliğinden

$$\begin{aligned}
& \sum_{k=1}^m \lambda\nu c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} (\varphi^2)_{y_k} \chi^2 \\
&= \sum_{k=1}^m \left(-\lambda\nu \frac{\partial}{\partial y_k} c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} \varphi^2 \chi^2 \right. \\
& \quad + \lambda\nu (\nu+1) c^2 \psi^{-\nu-2} \psi_{y_k}^2 \varphi^2 \chi^2 - \lambda\nu c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k y_k} \varphi^2 \chi^2 \\
& \quad \left. + (\lambda\nu c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} \varphi^2 \chi^2)_{y_k} + 2\lambda^2 \nu^2 c^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{y_k}^2 \varphi^2 \chi^2 \right)
\end{aligned} \tag{2.86}$$

bulunur.

(2.83) ve (2.86) eşitlikleri yerine yazılırsa;

$$\begin{aligned}
& (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m c^2 \varphi \varphi_{y_k y_k} \chi^2 \\
&= \sum_{k=1}^m \left((x_1 + \delta_0)^2 c^2 \varphi \varphi_{y_k} \chi^2 \right)_{y_k} - (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m c^2 \varphi_{y_k}^2 \chi^2 \\
& \quad + \frac{1}{2} (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial^2 c^2}{\partial y_k^2} \varphi^2 \chi^2 - \frac{1}{2} (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial c^2}{\partial y_k} \varphi^2 \chi^2 \right)_{y_k} \\
& \quad - \lambda \nu \psi^{-\nu-1} (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \varphi^2 \chi^2 - \lambda \nu \psi^{-\nu-1} (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \varphi^2 \chi^2 \\
& \quad + \lambda \nu (\nu + 1) c^2 \psi^{-\nu-2} (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \psi_{y_k} \varphi^2 \chi^2 - \lambda \nu c^2 \psi^{-\nu-1} (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \psi_{y_k y_k} \varphi^2 \chi^2 \\
& \quad + \sum_{k=1}^m \left(\lambda \nu c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} \varphi^2 \chi^2 \right)_{y_k} + 2 \lambda^2 \nu^2 c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \varphi^2 \chi^2 \\
&= \sum_{k=1}^m (x_1 + \delta_0)^2 \left(\chi^2 \left(c^2 \varphi \varphi_{y_k} - \frac{1}{2} \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \varphi^2 + \lambda \nu c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} \varphi^2 \right) \right)_{y_k} \\
& \quad - c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 + \frac{1}{2} (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial^2}{\partial y_k^2} c^2 \varphi^2 \chi^2 \\
& \quad - \lambda \nu c^2 m \psi^{-\nu-1} (x_1 + \delta_0)^2 \varphi^2 \chi^2 + 2 \lambda^2 \nu^2 c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \varphi^2 \chi^2 \\
& \quad + \lambda \nu (\nu + 1) c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \varphi^2 \chi^2 \\
& \quad - 2 \lambda \nu (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-1} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \varphi^2 \chi^2 \tag{2.87}
\end{aligned}$$

olur.

O halde (2.73), (2.78) ve (2.87) eşitlikleri kullanılarak;

$$\begin{aligned}
& -\varphi \left(\varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0)^2 \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2 (x, y') \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k y_k} \right) \right) \chi^2 \\
&= -(\varphi \varphi_{x_1} \chi^2)_{x_1} - \lambda \nu (\psi^{-\nu-1} \psi_{x_1} \varphi^2 \chi^2)_{x_1} + \frac{1}{2} (\varphi^2 \chi^2)_{x_1} + \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_1}^2 \varphi^2 \chi^2 \\
& \quad + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_1} \varphi^2 \chi^2 + \varphi_{x_1}^2 \chi^2 - \lambda \nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_1}^2 \varphi^2 \chi^2 - 2 \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_1}^2 \varphi^2 \chi^2 \\
& \quad + (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2 \chi^2 - \sum_{i=2}^n \left((x_1 + \delta_0)^2 (\varphi \varphi_{x_i} \chi^2 + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} \varphi^2 \chi^2) \right)_{x_i} \\
& \quad - (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \left(\lambda \nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} + 2 \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \right) \psi_{x_i}^2 \varphi^2 \chi^2 \\
& \quad + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \psi_{x_i x_i} \varphi^2 \chi^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_{k=1}^m (x_1 + \delta_0)^2 \left(\chi^2 \left(c^2 \varphi \varphi_{y_k} - \frac{1}{2} \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \varphi^2 + \lambda \nu c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} \varphi^2 \right) \right)_{y_k} \\
& - c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 + \frac{1}{2} (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial^2}{\partial y_k^2} c^2 \varphi^2 \chi^2 \\
& - \lambda \nu c^2 m \psi^{-\nu-1} (x_1 + \delta_0)^2 \varphi^2 \chi^2 + 2 \lambda^2 \nu^2 c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \varphi^2 \chi^2 \\
& + \lambda \nu (\nu + 1) c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \varphi^2 \chi^2 - 2 \lambda \nu (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-1} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \varphi^2 \chi^2 \\
= & \varphi_{x_1}^2 \chi^2 + (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2 \chi^2 - c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 \\
& - (\varphi \varphi_{x_1} \chi^2)_{x_1} - \lambda \nu (\psi^{-\nu-1} \psi_{x_1} \varphi^2 \chi^2)_{x_1} + \frac{1}{2} (\varphi^2 \chi^2)_{x_1} \\
& - \sum_{i=2}^n ((x_1 + \delta_0)^2 (\varphi \varphi_{x_i} \chi^2 + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} \varphi^2 \chi^2))_{x_i} \\
& + \sum_{k=1}^m (x_1 + \delta_0)^2 \left(\chi^2 \left(c^2 \varphi \varphi_{y_k} - \frac{1}{2} \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \varphi^2 + \lambda \nu c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} \varphi^2 \right) \right)_{y_k} \\
& + (\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_1}^2 + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_1} - \lambda \nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_1}^2 - 2 \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_1}^2 \\
& - (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n (\lambda \nu (\nu + 1) \psi^{-\nu-2} + 2 \lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2}) \psi_{x_i}^2 + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} (x_1 + \delta_0)^2 (n - 1) \\
& + \frac{1}{2} (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial^2}{\partial y_k^2} c^2 - \lambda \nu c^2 m \psi^{-\nu-1} (x_1 + \delta_0)^2 \\
& + (2 \lambda^2 \nu^2 c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} + \lambda \nu (\nu + 1) c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2}) \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& - 2 \lambda \nu (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-1} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \varphi^2 \chi^2 \\
= & \varphi_{x_1}^2 \chi^2 + (x_1 + \delta_0)^2 \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2 \chi^2 - c^2 \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 \right) + G_2(\lambda, \delta) \varphi^2 \chi^2 + d_2(\varphi) \quad (2.88)
\end{aligned}$$

elde edilir. Burada

$$\begin{aligned}
d_2(\varphi) = & - (\varphi \varphi_{x_1} \chi^2)_{x_1} - \lambda \nu (\psi^{-\nu-1} \psi_{x_1} \varphi^2 \chi^2)_{x_1} + \frac{1}{2} (\varphi^2 \chi^2)_{x_1} \\
& - \sum_{i=2}^n ((x_1 + \delta_0)^2 (\varphi \varphi_{x_i} \chi^2 + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_i} \varphi^2 \chi^2))_{x_i} \\
& + \sum_{k=1}^m (x_1 + \delta_0)^2 \left(\chi^2 \left(c^2 \varphi \varphi_{y_k} - \frac{1}{2} \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \varphi^2 + \lambda \nu c^2 \psi^{-\nu-1} \psi_{y_k} \varphi^2 \right) \right)_{y_k},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
G_2(\lambda, \nu) = & \left(-\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2} \psi_{x_1}^2 + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} \psi_{x_1} - \lambda \nu (\nu+1) \psi^{-\nu-2} \psi_{x_1}^2 \right. \\
& - (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n (\lambda \nu (\nu+1) \psi^{-\nu-2} + 2\lambda^2 \nu^2 \psi^{-2\nu-2}) \psi_{x_i}^2 \\
& + \lambda \nu \psi^{-\nu-1} (x_1 + \delta_0)^2 (n-1) + \frac{1}{2} (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial^2}{\partial y_k^2} c^2 \\
& - \lambda \nu c^2 m \psi^{-\nu-1} (x_1 + \delta_0)^2 \\
& + (2\lambda^2 \nu^2 c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} + \lambda \nu (\nu+1) c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2}) \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& \left. - 2\lambda \nu (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-1} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \right) \varphi^2 \chi^2
\end{aligned}$$

şeklinde tanımlıdır. ■

Lemma 2.3 *Aşağıdaki eşitsizlik sağlanır:*

$$\begin{aligned}
& \psi^{\nu+1} \left((x_1 + \delta_0)^{-1} \varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k y_k} \right) \right)^2 \chi^2 \\
& - 2\lambda \nu \beta_0 \varphi \left(\varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0)^2 \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k y_k} \right) \right) \chi^2 \\
\geq & 2\lambda \nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2 \chi^2 + 2\lambda \nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 \\
& + \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \varphi^2 \chi^2 + d_3(\chi \varphi)
\end{aligned} \tag{2.89}$$

İspat. (2.68) eşitliği $2\lambda \nu \beta_0$ ile çarpılır ve (2.2) eşitsizliği ile toplanırsa

$$\begin{aligned}
& \psi^{\nu+1} \left((x_1 + \delta_0)^{-1} \varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k y_k} \right) \right)^2 \chi^2 \\
& - 2\lambda \nu \beta_0 \varphi \left(\varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0)^2 \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k y_k} \right) \right) \chi^2 \\
\geq & 2\lambda \nu \delta (x_1 + \delta_0)^{-3} \varphi_{x_1}^2 \chi^2 - 2\lambda \nu (x_1 + \delta_0)^2 G_o(n, m) \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2 \chi^2 \\
& + \lambda \nu \delta \alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 + 2\lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \varphi^2 \chi^2 \\
& + G(\lambda, \delta) \varphi^2 \chi^2 + d_0(\varphi \chi) + d_1(\varphi \chi) \\
& + 2\lambda \nu \beta_0 \left(\varphi_{x_1}^2 \chi^2 + (x_1 + \delta_0)^2 \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2 \chi^2 - c^2 \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 \right) + G_2(\lambda, \delta) \varphi^2 \chi^2 \right) \\
& - 2\lambda \nu \beta_0 d_2(\varphi)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2\lambda\nu\delta(x_1 + \delta_0)^{-3}\varphi_{x_1}^2\chi^2 + 2\lambda\nu\beta_0\varphi_{x_1}^2\chi^2 \\
&\quad - 2\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2 G_o(n, m) \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2\chi^2 + 2\lambda\nu\beta_0(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2\chi^2 \\
&\quad + \lambda\nu\delta\alpha_1(x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2\chi^2 - 2\lambda\nu\beta_0(x_1 + \delta_0)^2 c^2 \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2\chi^2 \\
&\quad + 2\lambda^3\nu^4\delta^4(x_1 + \delta_0)^{-2}\psi^{-2\nu-3}\varphi^2\chi^2 + G(\lambda, \delta)\varphi^2\chi^2 + 2\lambda\nu\beta_0 G_2(\lambda, \delta)\varphi^2\chi^2 \\
&\quad + d_0(\varphi\chi) + d_1(\varphi\chi) + 2\lambda\nu\beta_0 d_2(\varphi) \\
&= (2\lambda\nu\delta(x_1 + \delta_0)^{-3} + 2\lambda\nu\beta_0)\varphi_{x_1}^2\chi^2 \\
&\quad + (-2\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2 G_o(n, m) + 2\lambda\nu\beta_0(x_1 + \delta_0)^2) \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2\chi^2 \\
&\quad + (\lambda\nu\delta\alpha_1(x_1 + \delta_0) - 2\lambda\nu\beta_0(x_1 + \delta_0)^2 c^2) \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2\chi^2 \\
&\quad + (2\lambda^3\nu^4\delta^4(x_1 + \delta_0)^{-2}\psi^{-2\nu-3} + G(\lambda, \delta) + 2\lambda\nu\beta_0 G_2(\lambda, \delta))\varphi^2\chi^2 \\
&\quad + d_0(\varphi\chi) + d_1(\varphi\chi) - 2\lambda\nu\beta_0 d_2(\varphi) \tag{2.90}
\end{aligned}$$

bulunur. Burada

$$\beta_0 = G_0 + 1$$

seçilirse;

$$\begin{aligned}
&(-2\lambda\nu G_o(n, m) + 2\lambda\nu\beta_0)(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2\chi^2 \\
&= (-2\lambda\nu G_0 + 2\lambda\nu(G_0 + 1))(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2\chi^2 \\
&= (-2\lambda\nu G_0 + 2\lambda\nu G_0 + 2\lambda\nu)(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2\chi^2 \\
&= 2\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2\chi^2 \tag{2.91}
\end{aligned}$$

elde edilir. Diğer yandan

$$\delta_4 = \frac{1}{2}(1 + 3\beta_0 M\gamma/\alpha_1)$$

olarak almırsa ve

$$-2\lambda\nu\beta_0 c^2 \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2\chi^2 \geq -\frac{3}{2}\lambda\nu\beta_0 M\gamma \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2\chi^2$$

eşitsizliği göz önünde bulundurulursa $\delta \geq \delta_4$ için

$$\begin{aligned}
& (\lambda\nu\delta(x_1 + \delta_0)\alpha_1 - 2\lambda\nu\beta_0(x_1 + \delta_0)^2c^2) \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 \\
& \geq \left(\lambda\nu\delta\alpha_1 - \frac{3}{2}\lambda\nu\beta_0M\gamma \right) (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 \\
& \geq \left(\lambda\nu\frac{1}{2}(1 + 3\beta_0M\gamma/\alpha_1)\alpha_1 - 2\lambda\nu\beta_0M^2 \right) (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 \\
& = \frac{1}{2}\lambda\nu(x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 + \left(\frac{3}{2}\lambda\nu\beta_0M\gamma - \frac{3}{2}\lambda\nu\beta_0M\gamma \right) (x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 \\
& = \frac{1}{2}\lambda\nu\alpha_1(x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 \tag{2.92}
\end{aligned}$$

yazılabilir. Son olarak

$$[2\lambda^3\nu^4\delta^4(x_1 + \delta_0)^{-2}\psi^{-2\nu-3} + G(\lambda, \delta) + 2\lambda\nu\beta_0G_2(\lambda, \delta)]\varphi^2\chi^2$$

terimi için

$$\begin{aligned}
& G(\lambda, \nu) + 2\lambda\nu\beta_0G_2(\lambda, \nu) \\
& = 2\lambda\nu\delta(x_1 + \delta_0)^{-3}(-\lambda^2\nu^2\psi_{x_1}^2\psi^{-2\nu-2} - \lambda\nu(\nu + 1)\psi_{x_1}^2\psi^{-\nu-2}) \\
& \quad - 2\lambda\nu G_o(n, m) \sum_{i=2}^n (-\lambda^2\nu^2\psi_{x_i}^2\psi^{-2\nu-2} - \lambda\nu(\nu + 1)\psi_{x_i}^2\psi^{-\nu-2} + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_ix_i}) \\
& \quad + \lambda\nu\delta\alpha_1(x_1 + \delta_0) \sum_{k=1}^m (-\lambda^2\nu^2\psi_{y_k}^2\psi^{-2\nu-2} - \lambda\nu(\nu + 1)\psi_{y_k}^2\psi^{-\nu-2} + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{y_ky_k}) \\
& \quad + 2\lambda\nu\beta_0(\lambda^2\nu^2\psi^{-2\nu-2}\psi_{x_1}^2 + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}\psi_{x_1} - \lambda\nu(\nu + 1)\psi^{-\nu-2}\psi_{x_1}^2 \\
& \quad - (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n (\lambda\nu(\nu + 1)\psi^{-\nu-2} + 2\lambda^2\nu^2\psi^{-2\nu-2})\psi_{x_i}^2 \\
& \quad + \lambda\nu\psi^{-\nu-1}(x_1 + \delta_0)^2(n - 1) + \frac{1}{2}(x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial^2}{\partial y_k^2} c^2 - \lambda\nu c^2 m \psi^{-\nu-1}(x_1 + \delta_0)^2 \\
& \quad + (2\lambda^2\nu^2c^2(x_1 + \delta_0)^2\psi^{-2\nu-2} + \lambda\nu(\nu + 1)c^2(x_1 + \delta_0)^2\psi^{-\nu-2}) \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& \quad - 2\lambda\nu(x_1 + \delta_0)^2\psi^{-\nu-1} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \Big)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
= & \lambda^3 \nu^3 \left[-2\delta^3 (x_1 + \delta_0)^{-3} \psi^{-2\nu-2} + 2G_o(n, m) \psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 + 2\delta^2 \beta_0 \psi^{-2\nu-2} \right. \\
& -4\beta_0 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 + 4\beta_0 c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& \left. -\delta\alpha_1 (x_1 + \delta_0) \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \right] \\
& + \lambda^2 \nu^2 \left[-2(\nu+1) \delta^3 (x_1 + \delta_0)^{-3} \psi^{-\nu-2} + 2G_o(n, m) (\nu+1) \psi^{-\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 \right. \\
& -2\psi^{-\nu-1} (n-1) - 2(\nu+1) \delta\alpha_1 (x_1 + \delta_0) \psi^{-\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& + 2\delta\beta_0 \psi^{-\nu-1} - 2\delta^2 \beta_0 (\nu+1) \psi^{-\nu-2} \\
& -2\beta_0 (\nu+1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 + 2\beta_0 (n-1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-1} \\
& -2\beta_0 c^2 m (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} + 2\beta_0 (\nu+1) c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& \left. -4\beta_0 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-1} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} + \delta\alpha_1 m (x_1 + \delta_0) \psi^{-\nu-1} \right] \\
& + \lambda \nu \beta_0 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial^2 c^2}{\partial y_k^2}
\end{aligned}$$

eşitliğini yazabiliriz. Burada

$$\begin{aligned}
E_3 = & -2\delta^3 (x_1 + \delta_0)^{-3} \psi^{-2\nu-2} + 2\delta^2 \beta_0 \psi^{-2\nu-2} + 2G_o(n, m) \psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 \\
& -4\beta_0 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 + 4\beta_0 c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \\
& -\delta\alpha_1 (x_1 + \delta_0) \psi^{-2\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 \Big], \tag{2.93}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E_4 = & -2(\nu+1) \delta^3 (x_1 + \delta_0)^{-3} \psi^{-\nu-2} - 2\psi^{-\nu-1} (n-1) + 2\delta\beta_0 \psi^{-\nu-1} \\
& -2\delta^2 \beta_0 (\nu+1) \psi^{-\nu-2} + 2\beta_0 (n-1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-1} \\
& -2\beta_0 c^2 m (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} + \delta\alpha_1 m (x_1 + \delta_0) \psi^{-\nu-1} \\
& + 2G_o(n, m) (\nu+1) \psi^{-\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 - 2\beta_0 (\nu+1) (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} \sum_{i=2}^n \psi_{x_i}^2 \\
& -2(\nu+1) \delta\alpha_1 (x_1 + \delta_0) \psi^{-\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +2\beta_0 (\nu + 1) c^2 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-2} \sum_{k=1}^m \psi_{y_k}^2 - 4\beta_0 (x_1 + \delta_0)^2 \psi^{-\nu-1} \sum_{k=1}^m \frac{\partial c^2}{\partial y_k} \psi_{y_k} \\
& + \frac{1}{\lambda \nu} \beta_0 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial^2 c^2}{\partial y_k^2}
\end{aligned} \tag{2.94}$$

dir.

Diğer bir ifade ile

$$G(\lambda, \nu) + 2\lambda \nu \beta_0 G_2(\lambda, \nu) = \lambda^3 \nu^3 E_3 + \lambda^2 \nu^2 E_4 \tag{2.95}$$

formundadır.

$c^2, \psi, \psi_{x_i}, \psi_{y_j}$ fonksiyonları $C(\overline{\Omega}_\gamma)$ da sınırlı olduğundan E_{31} ifadesi $x \in \overline{\Omega}_\gamma$ için sınırlı olur: $\delta (\delta \geq 4)$: $|E_{31}| \leq M_3$.

Burada

$$E_3 = \nu \delta^2 \psi^{-2\nu-3} E_{31}$$

şeklinde tanımlıdır. O halde

$$\delta \geq \delta_5 = \sqrt{2M_3}$$

seçilirse;

$$\begin{aligned}
\lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} + \lambda^3 \nu^3 E_3 &= \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \left(1 + \frac{1}{\delta^4 \nu \psi^{-2\nu-3}} E_3 \right) \\
&= \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \left(1 + \frac{1}{\delta^2} E_{31} \right) \\
&\geq \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \left(1 - \frac{1}{\delta^2} |E_{31}| \right) \\
&\geq \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \left(1 - \frac{1}{\delta^2} M_3 \right) \\
&= \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \left(1 - \frac{1}{\delta^2} \frac{\delta_5^2}{2} \right) \\
&\geq \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \left(1 - \frac{1}{\delta^2} \frac{\delta^2}{2} \right) \\
&= \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \left(1 - \frac{1}{2} \right) \\
&= \frac{1}{2} \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3}
\end{aligned} \tag{2.96}$$

olduğu görülür. Benzer düşünce ile sabitlenmiş $\delta \geq \delta_5, \nu > 1$ ve γ sayıları için E_4, Ω_γ da sınırlıdır. Eğer;

$$\Omega_\gamma : |E_4| \leq M_4. \lambda \geq \lambda_1 = M_4.$$

seçilirse;

$$\begin{aligned}
\lambda^3 \nu^4 \delta^4 \psi^{-2\nu-3} + \lambda^3 \nu^3 E_3 + \lambda^2 \nu^2 E_4 &\geq \lambda^3 \nu^4 \delta^4 \psi^{-2\nu-3} + \lambda^3 \nu^3 E_3 - \lambda^2 \nu^2 |E_4| \\
&\geq \frac{1}{2} \lambda^3 \nu^4 \delta^4 \psi^{-2\nu-3} - \lambda^2 \nu^2 |E_4| \\
&\geq \frac{1}{2} \lambda^3 \nu^4 \delta^4 \psi^{-2\nu-3} - \lambda^2 \nu^2 M_4 \geq 0
\end{aligned} \tag{2.97}$$

buradan

$$\begin{aligned}
&2\lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} + G(\lambda, \nu) + 2\lambda\nu\beta_0 G_2(\lambda, \nu) \\
&= \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} + \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} + G(\lambda, \nu) + 2\lambda\nu\beta_0 G_2(\lambda, \nu) \\
&\geq \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3}
\end{aligned} \tag{2.98}$$

eşitliği bulunur. Sonuç olarak, $\delta \geq \delta_6 = \max\{\delta_3, \delta_4, \delta_5\}$ ve $\lambda \geq \lambda_2$ olmak üzere

$$\begin{aligned}
&\psi^{\nu+1} \left((x_1 + \delta_0)^{-1} \varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k y_k} \right) \right)^2 \chi^2 \\
&- 2\lambda\nu\beta_0 \varphi \left(\varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0)^2 \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k y_k} \right) \right) \chi^2 \\
&\geq 2\lambda\nu\delta (x_1 + \delta_0)^{-3} \varphi_{x_1} \chi^2 + 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n \varphi_{x_i}^2 \chi^2 + \frac{1}{2} \lambda\nu\alpha_1 (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{k=1}^m \varphi_{y_k}^2 \chi^2 \\
&+ \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} \varphi^2 \chi^2 + d_3(\chi\varphi)
\end{aligned} \tag{2.99}$$

değerlendirmesi elde edilir. ■

BÖLÜM 3

ULTRAHİPERBOLİK DENKLEM İÇİN BİR TERS PROBLEM

Bu bölümde aşağıdaki ters problem ele alınacaktır.

Problem 3.1 (1.1) denkleminde $a_0(x, y')$ katsayısının $u(x, y', 0) = g(x, y')$ ek bilgisi yardımıyla bulunması problemi.

Teorem 3.1 Kabul edelim ki (1.1) eşitsizliği sağlansın. Ayrıca $g(x, y') \neq 0$ ve $c(x, y')$ katsayısı y_m değişkeninden bağımsız olsun. Bu durumda Problem 1'in bir tek $a_0(x, y') \in C(\Omega)$ çözümüne sahiptir.

$$\begin{aligned} & (x_1 + \delta_0)^{-1} u_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n u_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{j=1}^m u_{y_j y_j} \right) \\ & + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n a_i u_{x_i} + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m b_j u_{y_j} + a_0(x, y') u \\ & = f(x, y') \end{aligned}$$

denklemini

$$u(0, 'x, y) = u_0('x, y) \quad (3.1)$$

$$u_{x_1}(0, 'x, y) = u_{x_1}('x, y) \quad (3.2)$$

koşulları ve

$$u(x, y', 0) = g(x, y') \quad (3.3)$$

ek bilgisi ile birlikte ele alınacaktır. Burada (1.1) denkleminde $a_0(x, y)$ fonksiyonunu bulunması problemi ele alınacaktır.

$f_{x_n+m} \in C(\overline{\Omega})$ fonksiyonuna karşılık gelen iki çözüm $u^{(1)}, u^{(2)} \in C^2(\overline{\Omega})$ ve $a_0^{(1)}, a_0^{(2)}$ olsun.

Ayrıca

$$\tilde{u} = u^{(2)} - u^{(1)},$$

$$\tilde{a}_0 = a_0^{(2)} - a_0^{(1)}$$

olsun. Bu durumda

$$\begin{aligned} & (x_1 + \delta_0)^{-1} u_{x_1 x_1}^{(2)} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n u_{x_i x_i}^{(2)} - c^2(x, y') \sum_{j=1}^m u_{y_j y_j}^{(2)} \right) \\ & + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n a_i u_{x_i}^{(2)} + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m b_j u_{y_j}^{(2)} + a_0(x, y') u^{(2)} \\ & = f(x, y') \end{aligned} \quad (3.4)$$

ve

$$\begin{aligned} & (x_1 + \delta_0)^{-1} u_{x_1 x_1}^{(1)} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n u_{x_i x_i}^{(1)} - c^2(x, y') \sum_{j=1}^m u_{y_j y_j}^{(1)} \right) \\ & + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n a_i u_{x_i}^{(1)} + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m b_j u_{y_j}^{(1)} + a_0(x, y') u^{(1)} \\ & = f(x, y'), \end{aligned} \quad (3.5)$$

olup

$$\begin{aligned} & (x_1 + \delta_0)^{-1} (u_{x_1 x_1}^{(2)} - u_{x_1 x_1}^{(1)}) + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n (u_{x_i x_i}^{(2)} - u_{x_i x_i}^{(1)}) \\ & - c^2(x, y') (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m (u_{y_j y_j}^{(2)} - u_{y_j y_j}^{(1)}) + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n a_i (u_{x_i}^{(2)} - u_{x_i}^{(1)}) \\ & + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m b_j (u_{y_j}^{(2)} - u_{y_j}^{(1)}) + a_0^{(2)} u^{(2)} - a_0^{(1)} u^{(1)} \\ & = 0 \end{aligned} \quad (3.6)$$

yazılabilir. Buradan

$$\begin{aligned} a_0^{(2)} u^{(2)} - a_0^{(1)} u^{(1)} + a_0^{(1)} u^{(2)} - a_0^{(1)} u^{(2)} &= a_0^{(1)} (u^{(2)} - u^{(1)}) + u^{(2)} (a_0^{(2)} - a_0^{(1)}) \\ &= a_0^{(1)} \tilde{u} + u^{(2)} \tilde{a}_0 \end{aligned} \quad (3.7)$$

bağıntısı kullanılarak

$$\begin{aligned} & (x_1 + \delta_0)^{-1} \tilde{u}_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n \tilde{u}_{x_i x_i} - c^2(x, y') (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m \tilde{u}_{y_j y_j} \\ & + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n a_i \tilde{u}_{x_i} + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m b_j \tilde{u}_{y_j} + a_0^{(1)} \tilde{u} \\ & = -\tilde{a}_0 u^{(2)} \end{aligned} \quad (3.8)$$

elde edilir.

Ayrıca $\tilde{u}$ aşağıdaki koşulları sağlar:

$$\tilde{u}(0, 'x, y) = 0, \tilde{u}_{x_1}(0, 'x, y) = 0 \quad (3.9)$$

ve

$$\tilde{u}(x, y', 0) = 0. \quad (3.10)$$

Şimdi Ω_γ de yeni bir bilinmeyen fonksiyon tanımlayalım:

$$\tilde{u} = u^{(2)}w.$$

Buradan

$$\begin{aligned} (u^{(2)}w)_{x_1} &= (u^{(2)})_{x_1} w + u^{(2)}w_{x_1}, \\ (u^{(2)}w)_{x_1 x_1} &= \left((u^{(2)})_{x_1} w + u^{(2)}w_{x_1} \right)_{x_1} \\ &= \left((u^{(2)})_{x_1 x_1} w + (u^{(2)})_{x_1} w_{x_1} + (u^{(2)})_{x_1} w_{x_1} + u^{(2)}w_{x_1 x_1} \right) \\ &= (u^{(2)})_{x_1 x_1} w + u^{(2)}w_{x_1 x_1} + 2(u^{(2)})_{x_1} w_{x_1}, \end{aligned} \quad (3.11)$$

$$(u^{(2)}w)_{x_i} = (u^{(2)})_{x_i} w + u^{(2)}w_{x_i},$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=2}^n (u^{(2)}w)_{x_i x_i} &= \sum_{i=2}^n \left((u^{(2)})_{x_i} w + u^{(2)}w_{x_i} \right)_{x_i} \\ &= \sum_{i=2}^n \left((u^{(2)})_{x_i x_i} w + (u^{(2)})_{x_i} w_{x_i} + (u^{(2)})_{x_i} w_{x_i} + u^{(2)}w_{x_i x_i} \right) \\ &= \sum_{i=2}^n (u^{(2)})_{x_i x_i} w + \sum_{i=2}^n 2(u^{(2)})_{x_i} w_{x_i} + \sum_{i=2}^n u^{(2)}w_{x_i x_i}, \end{aligned} \quad (3.12)$$

$$(u^{(2)}w)_{y_j} = (u^{(2)})_{y_j} w + u^{(2)}w_{y_j},$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m (u^{(2)}w)_{y_j y_j} &= \sum_{j=1}^m \left((u^{(2)})_{y_j} w + u^{(2)}w_{y_j} \right)_{y_j} \\ &= \sum_{j=1}^m \left((u^{(2)})_{y_j y_j} w + (u^{(2)})_{y_j} w_{y_j} + (u^{(2)})_{y_j} w_{y_j} + u^{(2)}w_{y_j y_j} \right) \\ &= \sum_{j=1}^m (u^{(2)})_{y_j y_j} w + \sum_{j=1}^m 2(u^{(2)})_{y_j} w_{y_j} + \sum_{j=1}^m u^{(2)}w_{y_j y_j}. \end{aligned} \quad (3.13)$$

(3.8) denkleminde yerine yazılırsa:

$$\begin{aligned}
& (x_1 + \delta_0)^{-1} (u^{(2)})_{x_1 x_1} w + (x_1 + \delta_0)^{-1} u^{(2)} w_{x_1 x_1} + 2 (x_1 + \delta_0)^{-1} (u^{(2)})_{x_1} w_{x_1} \\
& + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n (u^{(2)})_{x_i x_i} w + 2 (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n (u^{(2)})_{x_i} w_{x_i} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n u^{(2)} w_{x_i x_i} \\
& - (x_1 + \delta_0) c^2 (x, y') \sum_{j=1}^m (u^{(2)})_{y_j y_j} w - 2 (x_1 + \delta_0) c^2 (x, y') \sum_{j=1}^m (u^{(2)})_{y_j} w_{y_j} \\
& - (x_1 + \delta_0) c^2 (x, y') \sum_{j=1}^m u^{(2)} w_{y_j y_j} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n a_i \left((u^{(2)})_{x_i} w + u^{(2)} w_{x_i} \right) \\
& + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m b_j \left((u^{(2)})_{y_j} w + u^{(2)} w_{y_j} \right) + (x_1 + \delta_0) a_0^{(1)} u^{(2)} w \\
& = -\tilde{a}_0 u^{(2)}
\end{aligned}$$

veya daha düzenli olarak

$$\begin{aligned}
& (x_1 + \delta_0)^{-1} u^{(2)} w_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n u^{(2)} w_{x_i x_i} - (x_1 + \delta_0) c^2 (x, y') \sum_{j=1}^m u^{(2)} w_{y_j y_j} \\
& + 2 (x_1 + \delta_0)^{-1} (u^{(2)})_{x_1} w_{x_1} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n \left(a_i u^{(2)} + 2 (u^{(2)})_{x_i} \right) w_{x_i} \\
& + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m \left(b_j u^{(2)} - c^2 (x, y') (u^{(2)})_{y_j} \right) w_{y_j} + (x_1 + \delta_0)^{-1} (u^{(2)})_{x_1 x_1} w \\
& + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n (u^{(2)})_{x_i x_i} - c^2 (x, y') \sum_{j=1}^m (u^{(2)})_{y_j y_j} + \sum_{i=2}^n a_i (u^{(2)})_{x_i} \right. \\
& \left. + \sum_{j=1}^m b_j (u^{(2)})_{y_j} + a_0^{(1)} u^{(2)} \right) w \\
& = - (x_1 + \delta_0) \tilde{a}_0 u^{(2)}
\end{aligned} \tag{3.14}$$

bulunur.

Son eşitlikte $(u^{(2)})^{-1}$ ile çarpılırsa;

$$\begin{aligned}
& (x_1 + \delta_0)^{-1} w_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n w_{x_i x_i} - (x_1 + \delta_0) c^2 (x, y') \sum_{j=1}^m w_{y_j y_j} \\
& + 2 (x_1 + \delta_0)^{-1} (u^{(2)})_{x_1} (u^{(2)})^{-1} w_{x_1} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n \left[\left(a_i u^{(2)} + 2 (u^{(2)})_{x_i} \right) (u^{(2)})^{-1} \right] w_{x_i} \\
& + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m \left[\left(b_j u^{(2)} - 2 c^2 (x, y') (u^{(2)})_{y_j} \right) (u^{(2)})^{-1} \right] w_{y_j}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \left[(x_1 + \delta_0)^{-1} (u^{(2)})_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n (u^{(2)})_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{j=1}^m (u^{(2)})_{y_j y_j} \right. \right. \\
& \left. \left. + \sum_{i=2}^n a_i (u^{(2)})_{x_i} + \sum_{j=1}^m b_j (u^{(2)})_{y_j} + a_0^{(1)} u^{(2)} \right) (u^{(2)})^{-1} \right] w \\
& = - (x_1 + \delta_0) \tilde{a}_0 u^{(2)} (u^{(2)})^{-1}
\end{aligned} \tag{3.15}$$

elde edilir.

Burada

$$\begin{aligned}
\overline{a_0} = & \left[\left((x_1 + \delta_0)^{-1} (u^{(2)})_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n (u^{(2)})_{x_i x_i} \right. \right. \\
& - c^2(x, y') (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m (u^{(2)})_{y_j y_j} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n a_i (u^{(2)})_{x_i} \\
& \left. \left. + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m b_j (u^{(2)})_{y_j} + (x_1 + \delta_0) a_0^{(1)} u^{(2)} \right) (u^{(2)})^{-1} \right]
\end{aligned}$$

$$\overline{a_i} = \left[\left(a_i u^{(2)} + 2 (u^{(2)})_{x_i} \right) (u^{(2)})^{-1} \right],$$

$$\overline{b_j} = \left[\left(b_j u^{(2)} - 2c^2(x, y') (u^{(2)})_{y_j} \right) (u^{(2)})^{-1} \right]$$

olarak alınırsa, (??) denklemi

$$\begin{aligned}
& (x_1 + \delta_0)^{-1} w_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n w_{x_i x_i} - (x_1 + \delta_0) c^2(x, y') \sum_{j=1}^m w_{y_j y_j} \\
& + 2 (x_1 + \delta_0)^{-1} (u^{(2)})_{x_1} (u^{(2)})^{-1} w_{x_1} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n \overline{a_i} w_{x_i} \\
& + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m \overline{b_j} w_{y_j} + \overline{a_0} w = - (x_1 + \delta_0) \tilde{a}_0(x, y')
\end{aligned} \tag{3.16}$$

şeklinde yazılabilir. Diğer yandan

$$u^{(2)} \neq 0,$$

$$\tilde{u}(0, 'x, y) = 0 = u^{(2)} w(0, 'x, y) = 0 \Rightarrow w(0, 'x, y) = 0,$$

$$\tilde{u}_{x_1}(0, 'x, y) = 0 = (u^{(2)} w)_{x_1} = (u^{(2)})_{x_1} w + u^{(2)} w_{x_1} = 0 \Rightarrow w_{x_1}(0, 'x, y) = 0,$$

$$w(x, y', 0) = 0$$

koşulları bulunur.

(3.16) denkleminin y_m değişkenine göre türevi alınır ve

$$\begin{aligned}
& (x_1 + \delta_0)^{-1} (w_{x_1 x_1})_{y_m} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n (w_{x_i x_i})_{y_m} \\
& - (x_1 + \delta_0) c^2(x, y') \sum_{j=1}^m (w_{y_j y_j})_{y_m} \\
& + 2(x_1 + \delta_0)^{-1} \left((u^{(2)})_{x_1} w_{x_1} \right)_{y_m} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n (\bar{a}_i w_{x_i})_{y_m} \\
& + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m (\bar{b}_j w_{y_j})_{y_m} + [\bar{a}_0 w]_{y_m} = - (x_1 + \delta_0) [\tilde{a}_0(x, y')]_{y_m}
\end{aligned}$$

sağ taraf sıfır olacağından

$$\begin{aligned}
& (x_1 + \delta_0)^{-1} (w_{x_1 x_1})_{y_m} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n (w_{x_i x_i})_{y_m} - c^2(x, y') (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m (w_{y_j y_j})_{y_m} \\
& + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n \bar{a}_i (w_{x_i})_{y_m} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial y_m} \bar{a}_i w_{x_i} \\
& + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m \frac{\partial}{\partial y_m} \bar{b}_j w_{y_j} + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m \bar{b}_j (w_{y_j})_{y_m} + \frac{\partial}{\partial y_m} \bar{a}_0 w + \bar{a}_0 w_{y_m} \\
& = 0
\end{aligned}$$

bulunur. Türevlerin yerleri değiştirilirse

$$\begin{aligned}
& (x_1 + \delta_0)^{-1} (w_{y_m})_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n (w_{y_m})_{x_i x_i} - c^2(x, y') (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m (w_{y_m})_{y_j y_j} \\
& + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n \bar{a}_i (w_{y_m})_{x_i} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial y_m} \bar{a}_i w_{x_i} + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m \frac{\partial}{\partial y_m} \bar{b}_j w_{y_j} \\
& + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m \bar{b}_j (w_{y_m})_{y_j} + \frac{\partial}{\partial y_m} \bar{a}_0 w + \bar{a}_0 w_{y_m} \\
& = 0
\end{aligned} \tag{3.17}$$

elde edilir. Burada $z = w_{y_m}$ gösterimi kullanılırsa

$$z = w_{y_m} \Rightarrow w = \operatorname{sgn}(y_m) \int_0^{y_m} z(x, y', \tau) d\tau,$$

$$Iz = \begin{cases} \int_0^{y_m} z(x, y', \tau) d\tau, & y_m \geq 0 \\ \int_{y_m}^0 z(x, y', \tau) d\tau, & y_m < 0 \end{cases},$$

$$I_{x_i} z = \begin{cases} \frac{\partial}{\partial x_i} \int_0^{y_m} z(x, y', \tau) d\tau, & y_m \geq 0 \\ \frac{\partial}{\partial x_i} \int_{y_m}^0 z(x, y', \tau) d\tau, & y_m < 0 \end{cases},$$

$$I_{y_j} z = \begin{cases} \frac{\partial}{\partial y_j} \int_0^{y_m} z(x, y', \tau) d\tau, & y_m \geq 0 \\ \frac{\partial}{\partial y_j} \int_{y_m}^0 z(x, y', \tau) d\tau, & y_m < 0 \end{cases}$$

elde edilir.

(3.17) denkleminde $z = w_{y_m}$ yazılırsa

$$\begin{aligned} & (x_1 + \delta_0)^{-1} z_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n z_{x_i x_i} - c^2(x, y') (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m z_{y_j y_j} \\ & + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n \bar{a}_i z_{x_i} + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m \bar{b}_j z_{y_j} + (x_1 + \delta_0) \bar{a}_0 z \\ & + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial y_m} \bar{a}_i I_{x_i} z + (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m \frac{\partial}{\partial y_m} \bar{b}_j I_{y_j} z \\ & + (x_1 + \delta_0) \frac{\partial}{\partial y_m} \bar{a}_0 I z \\ & = 0 \end{aligned} \tag{3.18}$$

elde edilir ve

$$z(0, 'x, y) = z_{x_1}(0, 'x, y) = 0$$

koşulları bulunur.

Şimdi, eğer $z(x, y)$ fonksiyonu (3.18) denklemini sağlıyor ise Ω_γ da $z(x, y) = 0$ olduğu gösterilecektir. Bu amaçla aşağıdaki bağıntılar kullanılır:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_\gamma} (Iz)^2 \chi^2 d\Omega_\gamma & \leq \gamma \int z^2 \chi^2 d\Omega_\gamma, \\ \int_{\Omega_\gamma} (I_{x_i} z)^2 \chi^2 d\Omega_\gamma & \leq \gamma \int z_{x_i}^2 \chi^2 d\Omega_\gamma, \\ \int_{\Omega_\gamma} (I_{y_j} z)^2 \chi^2 d\Omega_\gamma & \leq \gamma \int z_{y_j}^2 \chi^2 d\Omega_\gamma. \end{aligned}$$

Diğer taraftan (3.18) denkleminde

$$\begin{aligned} & \left((x_1 + \delta_0)^{-1} z_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \sum_{i=2}^n z_{x_i x_i} - c^2(x, y') (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m z_{y_j y_j} \right)^2 \\ & = (x_1 + \delta_0)^2 \left(\sum_{i=1}^n (\bar{a}_i z_{x_i} + \frac{\partial \bar{a}_i}{\partial y_m} I_{x_i} z) + \sum_{j=1}^m (\bar{b}_j z_{y_j} + \frac{\partial \bar{b}_j}{\partial y_m} I_{y_j} z) + \bar{a}_0 z + \frac{\partial \bar{a}_0}{\partial y_m} I z \right)^2 \\ & \leq 3(x_1 + \delta_0)^2 \left(\left(\sum_{i=1}^n (\bar{a}_i z_{x_i} + \frac{\partial \bar{a}_i}{\partial y_m} I_{x_i} z) \right)^2 + \left(\sum_{j=1}^m (\bar{b}_j z_{y_j} + \frac{\partial \bar{b}_j}{\partial y_m} I_{y_j} z) \right)^2 \right. \\ & \quad \left. + \left(\bar{a}_0 z + \frac{\partial \bar{a}_0}{\partial y_m} I z \right)^2 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq 3(x_1 + \delta_0)^2 \left((2n \sum_{i=1}^n ((\bar{a}_i z_{x_i})^2 + (\frac{\partial \bar{a}_i}{\partial y_m} I_{x_i} z)^2) + 2m \sum_{j=1}^m ((\bar{b}_j z_{y_j})^2 + (\frac{\partial}{\partial y_m} \bar{b}_j I_{y_j} z)^2) \right. \\
&\quad \left. + 2(\bar{a}_0 z)^2 + 2(\frac{\partial \bar{a}_0}{\partial y_m} I z)^2 \right) \\
&\leq 3(x_1 + \delta_0)^2 \left(2n \sum_{i=1}^n ((\bar{a}_i z_{x_i})^2 + (\frac{\partial \bar{a}_i}{\partial y_m} I_{x_i} z)^2) + 2m \sum_{j=1}^m ((\bar{b}_j z_{y_j})^2 + (\frac{\partial}{\partial y_m} \bar{b}_j I_{y_j} z)^2 \right. \\
&\quad \left. + 2(\bar{a}_0 z)^2 + 2(\frac{\partial \bar{a}_0}{\partial y_m} I z)^2 \right) \\
&\leq 3M_5 (x_1 + \delta_0)^2 \left(2n \sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 + 2n \sum_{i=1}^n (I_{x_i} z)^2 + 2m \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 + 2m \sum_{j=1}^m (I_{y_j} z)^2 \right. \\
&\quad \left. + 2z^2 + 2(I z)^2 \right) \\
&\leq 6M_5 (x_1 + \delta_0)^2 \left(n \sum_{i=1}^n (z_{x_i}^2 + (I_{x_i} z)^2) + m \sum_{j=1}^m (z_{y_j}^2 + (I_{y_j} z)^2) + z^2 + (I z)^2 \right) \\
&\leq 6M_5 \max \{n, m\} (x_1 + \delta_0)^2 \left(\sum_{i=1}^n (z_{x_i}^2 + (I_{x_i} z)^2) + \sum_{j=1}^m (z_{y_j}^2 + (I_{y_j} z)^2) + z^2 + (I z)^2 \right) \\
&\leq 6M_5 \max \{n, m\} (x_1 + \delta_0)^2 (1 + \gamma) \left(\sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 + \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 + z^2 \right) \tag{3.19}
\end{aligned}$$

eşitsizliği yazılabilir. Ayrıca (3.18) denklemini $(x_1 + \delta_0)$ ile çarpılarak, yukarıdaki benzer düşünce ile

$$\begin{aligned}
&\left(z_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n z_{x_i x_i} - c^2(x, y')(x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m z_{y_j y_j} \right)^2 \\
&= (x_1 + \delta_0)^4 \left(\sum_{i=1}^n (\bar{a}_i z_{x_i} + \frac{\partial \bar{a}_i}{\partial y_m} I_{x_i} z) + \sum_{j=1}^m (\bar{b}_j z_{y_j} + \frac{\partial}{\partial y_m} \bar{b}_j I_{y_j} z) + \bar{a}_0 z + \frac{\partial \bar{a}_0}{\partial y_m} I z \right)^2 \\
&\leq 3(x_1 + \delta_0)^4 \left(\left(\sum_{i=1}^n (\bar{a}_i z_{x_i} + \frac{\partial \bar{a}_i}{\partial y_m} I_{x_i} z) \right)^2 + \left(\sum_{j=1}^m (\bar{b}_j z_{y_j} + \frac{\partial}{\partial y_m} \bar{b}_j I_{y_j} z) \right)^2 \right. \\
&\quad \left. + \left(\bar{a}_0 z + \frac{\partial \bar{a}_0}{\partial y_m} I z \right)^2 \right) \\
&\leq 3(x_1 + \delta_0)^4 \left((2n \sum_{i=1}^n ((\bar{a}_i z_{x_i})^2 + (\frac{\partial \bar{a}_i}{\partial y_m} I_{x_i} z)^2) + 2m \sum_{j=1}^m ((\bar{b}_j z_{y_j})^2 + (\frac{\partial}{\partial y_m} \bar{b}_j I_{y_j} z)^2) \right. \\
&\quad \left. + 2(\bar{a}_0 z)^2 + 2(\frac{\partial \bar{a}_0}{\partial y_m} I z)^2 \right) \\
&\leq 3(x_1 + \delta_0)^4 \left(2n \sum_{i=1}^n ((\bar{a}_i z_{x_i})^2 + (\frac{\partial \bar{a}_i}{\partial y_m} I_{x_i} z)^2) + 2m \sum_{j=1}^m ((\bar{b}_j z_{y_j})^2 + (\frac{\partial}{\partial y_m} \bar{b}_j I_{y_j} z)^2 \right. \\
&\quad \left. + 2(\bar{a}_0 z)^2 + 2(\frac{\partial \bar{a}_0}{\partial y_m} I z)^2 \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq 3M_5 (x_1 + \delta_0)^4 \left(2n \sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 + 2n \sum_{i=1}^n (I_{x_i} z)^2 + 2m \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 + 2m \sum_{j=1}^m (I_{y_j} z)^2 \right. \\
&\quad \left. + 2z^2 + 2(Iz)^2 \right) \\
&\leq 6M_5 (x_1 + \delta_0)^4 \left(n \sum_{i=1}^n (z_{x_i}^2 + (I_{x_i} z)^2) + m \sum_{j=1}^m (z_{y_j}^2 + (I_{y_j} z)^2) + z^2 + (Iz)^2 \right) \\
&\leq 6M_5 \max \{n, m\} (x_1 + \delta_0)^4 \left(\sum_{i=1}^n (z_{x_i}^2 + (I_{x_i} z)^2) + \sum_{j=1}^m (z_{y_j}^2 + (I_{y_j} z)^2) + z^2 + (Iz)^2 \right) \\
&\leq 6M_5 \max \{n, m\} (x_1 + \delta_0)^4 (1 + \gamma) \left(\sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 + \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 + z^2 \right) \tag{3.20}
\end{aligned}$$

yazılabilir. Burada $M_5 > 0$ sabiti, M ve $\|u^2\|_{C^1(\overline{\Omega}_\gamma)}$ büyüklüklerine bağlıdır.

Lemma 2.3 kullanılarak

$$\begin{aligned}
&\left((x_1 + \delta_0)^{-1} \varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{j=1}^m \varphi_{y_j y_j} \right) \right)^2 \chi^2 \\
&+ \lambda^2 \nu^2 \beta_0^2 \varphi^2 \chi^2 + \left(\varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0)^2 \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{j=1}^m \varphi_{y_j y_j} \right) \right)^2 \chi^2 \\
&\geq \psi^{\nu+1} \left((x_1 + \delta_0)^{-1} \varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0) \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{j=1}^m \varphi_{y_j y_j} \right) \right)^2 \chi^2 \\
&\quad - 2\lambda \nu \beta_0 \varphi \left(\varphi_{x_1 x_1} + (x_1 + \delta_0)^2 \left(\sum_{i=2}^n \varphi_{x_i x_i} - c^2(x, y') \sum_{j=1}^m \varphi_{y_j y_j} \right) \right) \chi^2 \\
&\geq 2\lambda \nu \delta (x_1 + \delta_0)^{-3} \varphi_{x_1}^2 \chi^2 + 2\lambda \nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=1}^n \varphi_{x_i}^2 \chi^2 + \frac{1}{2} \lambda \nu \alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m \varphi_{y_j}^2 \chi^2 \\
&\quad + \lambda^3 \nu^4 \delta^4 \psi^{-2\nu-3} (x_1 + \delta_0)^{-2} \varphi^2 \chi^2 + d_4(\varphi) \tag{3.21}
\end{aligned}$$

eşitsizliği elde edilir. Son eşitsizlikte $z \equiv \varphi$ alınır ve (??), (??) bağıntıları kullanılırsa

$$\begin{aligned}
&6M_5 \max \{n, m\} (x_1 + \delta_0)^2 (1 + \gamma) \left(\sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 + \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 + z^2 \right) + \lambda^2 \nu^2 \beta_0^2 \varphi^2 \chi^2 \\
&+ 6M_5 \max \{n, m\} (x_1 + \delta_0)^4 (1 + \gamma) \left(\sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 + \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 + z^2 \right) \\
&= 6M_5 \max \{n, m\} (x_1 + \delta_0)^2 (1 + \gamma) \left((1 + (x_1 + \delta_0)^2) \left(\sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 + \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \right) \right. \\
&\quad \left. + z^2 (1 + \lambda^2 \nu^2 \beta_0^2 (x_1 + \delta_0)^2) \right) \chi^2 \\
&\geq 2\lambda \nu \delta (x_1 + \delta_0)^{-3} z_{x_1}^2 \chi^2 + 2\lambda \nu (x_1 + \delta_0)^2 \chi^2 \sum_{i=2}^n z_{x_i}^2 + \frac{1}{2} \lambda \nu \alpha_1 (x_1 + \delta_0) \chi^2 \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \\
&\quad + \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} z^2 \chi^2 + d_4(z) \tag{3.22}
\end{aligned}$$

bulunur.

O halde

$$\begin{aligned}
&= 6M_5 \max\{n, m\} (x_1 + \delta_0)^2 (1 + \gamma) \left((1 + (x_1 + \delta_0)^2) \left(\sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 + \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \right) \right. \\
&\quad \left. + z^2 (1 + \lambda^2 \nu^2 \beta_0^2 (x_1 + \delta_0)^2) \right) \chi^2 \\
&\geq 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^{-3} z_{x_1}^2 \chi^2 + 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n z_{x_i}^2 \chi^2 + \frac{1}{2} \lambda\nu \alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \chi^2 \\
&\quad + \lambda^3 \nu^4 \delta^4 \psi^{-2\nu-3} (x_1 + \delta_0)^{-2} z^2 \chi^2 + d_4(z)
\end{aligned} \tag{3.23}$$

ve buna bağılı olarak

$$\begin{aligned}
0 \geq & 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^{-3} z_{x_1}^2 \chi^2 + 2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n z_{x_i}^2 \chi^2 + \frac{1}{2} \lambda\nu \alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \chi^2 \\
& + \lambda^3 \nu^4 \delta^4 \psi^{-2\nu-3} (x_1 + \delta_0)^{-2} z^2 \chi^2 + d_4(z) \\
& - 6M_5 \max\{n, m\} (x_1 + \delta_0)^2 (1 + \gamma) \left((1 + (x_1 + \delta_0)^2) \left(\sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 + \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \right) \right. \\
& \left. + z^2 (1 + \lambda^2 \nu^2 \beta_0^2 (x_1 + \delta_0)^2) \right) \chi^2
\end{aligned} \tag{3.24}$$

yazılabilir.

(3.24) eşitsizliğini değerlendirmek için,

$$\lambda \geq \lambda_5 = \max\{\lambda_2, \lambda_3, \lambda_4\},$$

$$\lambda_3 = \max\left\{6M_5 (1 + \gamma) \max\{n, m\}, \frac{1}{4} \alpha_1\right\}$$

ve

$$v_2 = 1 + \beta_0$$

alınırsa

$$\begin{aligned}
&2\lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 \chi^2 \\
&- 6M_5 \max\{n, m\} (x_1 + \delta_0)^2 (1 + \gamma) (1 + (x_1 + \delta_0)^2) \sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 \chi^2 \\
&= [2\lambda\nu - 6M_5 \max\{n, m\} (x_1 + \delta_0)^2 (1 + \gamma) (1 + (x_1 + \delta_0)^2)] (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 \chi^2 \\
&\geq [2\lambda\nu - \lambda\nu] (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 \chi^2 \\
&= \lambda\nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 \chi^2,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \lambda \nu \alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \chi^2 \\
& - 6M_5 \max \{n, m\} (x_1 + \delta_0)^2 (1 + \gamma) (1 + (x_1 + \delta_0)^2) \sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 \chi^2 \\
& = \left[\frac{1}{2} \lambda \nu \alpha_1 - 6M_5 \max \{n, m\} (x_1 + \delta_0) (1 + \gamma) (1 + (x_1 + \delta_0)^2) \right] (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \chi^2 \\
& \geq \left[\frac{1}{2} \lambda \nu \alpha_1 - \frac{1}{4} \lambda_3 \nu \alpha_1 \right] (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \chi^2 \\
& \geq \left[\frac{1}{2} \lambda \nu \alpha_1 - \frac{1}{4} \lambda_3 \nu \alpha_1 \right] (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \chi^2 \\
& = \frac{1}{4} \lambda \nu \alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \chi^2,
\end{aligned}$$

ve

$$\lambda^3 \nu^3 - \lambda^3 \nu^2 - \lambda \nu \geq 0$$

olduğu dikkate alınarak

$$\begin{aligned}
& \lambda^3 \nu^4 \delta^4 (x_1 + \delta_0)^{-2} \psi^{-2\nu-3} z^2 \chi^2 \\
& - (6M_5 \max \{n, m\} (x_1 + \delta_0)^2 (1 + \gamma) (1 + \lambda^2 \nu^2 \beta_0^2 (x_1 + \delta_0)^2)) z^2 \chi^2 \\
& \geq [\lambda^3 \nu^4 \delta^4 \psi^{-2\nu-3} - \lambda \nu - \lambda^3 \nu^2 (v_2 - 1)^2] z^2 \chi^2 \\
& \geq [\lambda^3 \nu^4 \delta^4 \psi^{-2\nu-3} - \lambda \nu - \lambda^3 \nu^2 (v - 1)^2] z^2 \chi^2 \\
& \geq [\lambda^3 \nu^4 \delta^4 \psi^{-2\nu-3} - \lambda^3 \nu^4 \delta^4 \psi^{-2\nu-3} + 2\lambda^3 \nu^3 - \lambda^3 \nu^2 - \lambda \nu] z^2 \chi^2 \\
& \geq \lambda^3 \nu^3 z^2 \chi^2
\end{aligned}$$

eşitsizliği elde edilir.

Bu durumda (3.24) eşitsizliği aşağıdaki şekilde bulunur:

$$\begin{aligned}
0 & \geq 2\lambda \nu (x_1 + \delta_0)^{-3} z_{x_1}^2 \chi^2 + 2\lambda \nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n z_{x_i}^2 \chi^2 + \frac{1}{2} \lambda \nu \alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \chi^2 \\
& + \lambda^3 \nu^4 \delta^4 \psi^{-2\nu-3} z^2 \chi^2 + d_4(z) \\
& - 6M_5 \max \{n, m\} (x_1 + \delta_0)^2 (1 + \gamma) \left((1 + (x_1 + \delta_0)^2) \left(\sum_{i=1}^n z_{x_i}^2 + \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \right) \right. \\
& \left. + z^2 (1 + \lambda^2 \nu^2 \beta_0^2 (x_1 + \delta_0)^2) \right) \chi^2 \\
& \geq \lambda \nu z_1^2 \chi^2 + \lambda \nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n z_{x_i}^2 \chi^2 + \frac{1}{4} \lambda \nu \alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \chi^2 \\
& + \lambda^3 \nu^3 z^2 \chi^2 + d_4(z).
\end{aligned}$$

Buradan

$$\begin{aligned} & \lambda \nu z_1^2 \chi^2 + \lambda \nu (x_1 + \delta_0)^2 \sum_{i=2}^n z_{x_i}^2 \chi^2 + \frac{1}{4} \lambda \nu \alpha_1 (x_1 + \delta_0) \sum_{j=1}^m z_{y_j}^2 \chi^2 \\ & + \lambda^3 \nu^3 z^2 \chi^2 + d_4(z) \leq 0 \end{aligned}$$

ve sonuç olarak

$$\int_{\Omega_\gamma} z^2 d\Omega_\gamma \leq -\frac{1}{\lambda^3 \nu^3} \int_{\Omega_\gamma} d_4(z) d\Omega_\gamma$$

elde edilir.

Son eşitsizlikte $\lambda \rightarrow \infty$ için limit alınırsa

$$\int_{\Omega_\gamma} z^2 d\Omega_\gamma \leq 0$$

bulunur. Böylece Ω_γ da $z = 0$ olduğu görülür. İspat tamamlanmış olur.

3.1 SONUÇ

Bu tezde, ultrahiperbolik denklem için bir ters problem ele alınmış ve verilen bir ek bilgi yardımıyla çözümün tekliği araştırılmıştır. Burada kullanılan temel araç Carleman eşitsizlikleri olup Lavrenti'ev vd (1986), Amirov ve Yamamoto (2006) ve Gölgeleyen ve Yamamoto (2019) çalışmalarında verilen yöntemler kullanılmıştır. Bu denklemler fiziksel olarak çok boyutlu zaman kavramını içerdiğinden modern fizik kuramları açısından önemli bir hale gelmiştir.



KAYNAKLAR

- Adams R A and Fournier J J F** (2003) *Sobolev Spaces*. 2nd edition, ISBN: 0-12-044143-8, Elsevier, Academic Press, Amsterdam, 305 pp.
- Amirov A** (2001) *Integral Geometry and Inverse Problems for Kinetic Equations*. 1st edition, ISBN: 90-6764-352-1, VSP, Utrecht, 201 pp.
- Bukhgeim A L and Klivanov M V** (1981) Global Uniqueness of a Class of Inverse Problems. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 260(2): 269-272.
- Burskii V P and Kirichenko E V** (2008) Unique solvability of the Dirichlet problem for an ultrahyperbolic equation in a ball. *Differential Equations*, 44: 486–498.
- Craig W and Weinstein S** (2009) On determinism and well-posedness in multiple time dimensions. *Proc. Royal Society A*, 465: 3023–3046.
- Diaz J B and Young E C** (1971) Uniqueness of solutions of certain boundary value problems for ultrahyperbolic equations. *Proc. Amer. Math. Soc.*, 29: 569–574.
- DuChateau P and Zachmann D W** (1986) Partial differential equations. Schaum's outline series.
- Gölgeleyen F and Yamamoto M** (2014) Stability of Inverse Problems for Ultrahyperbolic Equations. *Chinese Annals of Mathematics, Series B*, 35 (4): 527-556.
- Hörmander L** (1976) *Linear Partial Differential Operators*. Springer, Berlin, 285 pp.
- Kabanikhin S I** (2008) Definitions and Examples of Inverse and Ill-Posed Problems. *Journal of Inverse and Ill-Posed Problems*, 16: 317–357.
- Kostomarov D P** (2002) A Cauchy problem for an ultrahyperbolic equation. *Differential Equations*, 38:1155–1161.
- Kostomarov D P** (2006) Problems for an ultrahyperbolic equation in the half-space with the boundedness condition for the solution. *Differential Equations*, 42: 261–268.
- Lavrentiev M M, Romanov V G and Shishatskii S P** (1986) *Ill-Posed Problems of Mathematical Physics and Analysis*. 1 st edition. ISBN:0-82180896-6, American Mathematical Society, Providence, 291 pp.
- Mikhailov V P** (1978) *Partial Differential Equations*. Revised from the 1976 Russian edition, Mir Publishers, Moskow, 396 pp.

KAYNAKLAR (devam ediyor)

Owens O G (1947) Uniqueness of solutions of ultrahyperbolic partial differential equations, *Amer. J. Math.*, 69: 184–188.

Petrovskii I (1967) *Partial Differential Equations*. Nauka, Moscow, 410 pp.

Ramm A G (2010) *Inverse Problems Mathematical and Analytical Techniques with Applications to Engineering* Springer-Verlag New York Inc. 442 pp.

Romanov V G (1987) *Inverse Problems of Mathematical Physics*. VSP, Utrecht The Netherlands.

Tikhonov A N and Arsenin V Y (1979) *Methods of Solution of Ill Posed Problems*. Nauka, Moscow.

Yamamoto M (2013) Mathematics for Industry: Principle, Reality and Practice, from the Point of View of a Mathematician, What Mathematics Can Do for You, Springer, 77-99.

ÖZGEÇMİŞ

Büşra Beril YILDIRIM, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldu. 2016 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı.

ADRES BİLGİLERİ:

Adres : Pehlivanlar Mahallesi İrfan Sokak Meltem Sitesi
Çaycuma /ZONGULDAK.

Tel : (538) 547 63 24

E-posta : bberilyildirim@gmail.com